

پیشینه 15-17
گروه 21

مهندسی قالیچه
40311037

عنوان آزمایش: تعیین جرم مولکولی مایعات فشار

هدف آزمایش: بدست آوردن جرم مولی یک ماده فلز با استفاده از فشار آن

تئوری آزمایش: براساس قانون آووگادرو، در شرایط یکسان از یک فشار، حجم ها

مستوی از گازها را شامل مولکول های یکسان می باشند.

بنابراین با استفاده از قانون آووگادرو و داشتن حجم (حجم یک مول از تمام گازها در شرایط

STP ثابت و برابر 22.4 می باشد) و جرم، می توانیم جرم مولکولی ترکیب مورد نظر را بدست

آوریم.

شرح علمی آزمایش: 1- یک ارلن که با استون خشک شده را با یک ورق آلومینیوم کوچک

و کش وزن می کنیم (دقت 0.0001 - 0.0002 تا 0.0005 قطره از نمونه مجهول را به داخل ارلن

ریخته، آن را با فویل پوشانده و با کش می بندیم 3- باید که وزن ورقه آلومینیوم را سوراخ

کرده و ظرف را داخل حمام آب گرم قرار می دهیم و زمانی که تمام مایع بخار می شود را ثبت

می کنیم. 4- ظرف را از حمام آب گرم بیرون آورده و آنرا کاملاً خشک کرده و منتظر می مانیم

۵. با دمای محیط هم شده سپس آنرا دوباره وزن می کنیم. اختلاف وزن ها، وزن مایع

ظرف (وزن بخار) را به ما می دهد ۵. بدین دست آوردن حجم ازلن آنرا از آب برگرفته

و ناقل منور ما بریزیم ۶. حجم را بدست آوریم ۶. حال با استفاده $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_0 V_0}{T_0}$ حجم را

در شرایط STP بدست آوریم سپس با قانون آووگادرو مول را بدست می آوریم و با مول

آن گرم مولی را محاسبه می کنیم.

وسایل و مواد مورد نیاز: ارلن ۱۰۰ cc (البته در آزمایشگاه از ۲۵ cc استفاده می کنیم) ۶ ورقه آلومینیوم ۶ کاغذ ۶

حمام آب گرم ۶ گرم ماده سفید ۶ استوانه مدرج ۶ لیتر ۶ استون ۶ ماده محلول

محاسبات:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_0 V_0}{T_0} \rightarrow \frac{668 \times 39,77}{351} = \frac{760 \times V_0}{273}$$

جمع منور $\downarrow$ دمای جوش $\rightarrow 78^\circ C$

$$\boxed{V_0 = 27,18}$$

$$\frac{1 \text{ (mol)}}{22400 \text{ (mL)}} = \frac{n \text{ (mol)}}{V_0} \rightarrow \frac{1}{22400} = \frac{n}{27,18} \rightarrow \boxed{n = 0,0012 \text{ mol}}$$

$$\alpha = 27,57 - 27,38 = \boxed{0,19 g}$$

$$M.W = \frac{\alpha(g)}{n \text{ (mol)}} \rightarrow M.W = \frac{0,19}{0,0012} = \boxed{158,33 \frac{g}{mol}}$$