

«اسپکتر فووتری»

• هدف آزمایش: تعیین غلظت یون Cu^{2+}

- تئوری آزمایش: هر ماده به طور طبیعی طول موج خاص را جذب می‌کند؛ به این مقدار با ضریب نور به ماده، ضریب خاص از طول موج آن جذب در ماده می‌گویند. طول موج جذبی برای مواد متفاوت، از هم پرتی متفاوت است. بنابراین در صورت حضور این طول موج خاص در ناحیه مرئی، نور را پرتی می‌کند.
- اسپکتر فووتری: آنکه دامنه‌ای برای طول موج دارد از یک منبع انتخاب کرده و از آن عبور می‌دهد.

داده خود عبور دهد. O مقدار λ جذب ماده:

$A \propto c \cdot d$

• ضریب جذب به ازای طول از ماده، از I_0 به I کاهش می‌یابد و در هر صورت:

$$T\% = \frac{I}{I_0} \times 100$$

در ناحیه مرئی، تغییرات ضریب جذب به تغییر λ = خطی است.

$$A = -\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

• قانون بیر لامبرت:

• طرح آزمایش: (۱) دستگاه اسپکتر فووتری را تنظیم کرده و آن را روی 620 nm تنظیم می‌کنیم. (۲) محلول

آهن را آماده می‌کنیم: در حاوی Cu^{2+} به آن محلول HCl می‌زنیم و آب مقطر می‌زنیم.

10 mL

6	5	4	3	2	1	
10	8	6	4	2	0	$\text{CuSO}_4(0.2M)$
0	2	4	6	8	10	—

$C_{Cu^{2+}} \lambda_{max} = 620 \text{ nm}$

③ به ترتیب از نمونه بعد (از صفر تا 10) غلظت‌های مختلف نمونه را در دستگاه قرار داده، رنگ جذب می‌کنیم.

خواسته شد از رابطه $y = a + bx$ ، (4-4) نمودار جذب بر حسب غلظت را با توجه به داده‌های زیر رسم کرده و جذب

نمونه مجهول را بر اساس نمودار خطی به دست آمده پیدا کنیم.

● داده‌های مورد نیاز: دستگاه اسپکتروفتومتر - پیت 10 ml - 6 - 10 mL $\text{CuSO}_4(0.2M)$ - 1 -

$$M_2 = \frac{M_1 V_1}{V_2} = \frac{(0.2)(2)}{10} = 0.04 M$$

● مطابق:

$$M_3 = \frac{M_1 V_1}{V_3} = \frac{(0.2)(4)}{10} = 0.08 M$$

$$M_4 = \frac{M_1 V_1}{V_4} = \frac{(0.2)(6)}{10} = 0.12 M$$

$$M_5 = \frac{M_1 V_1}{V_5} = \frac{(0.2)(8)}{10} = 0.16 M$$

$$M_6 = 0.2$$

	1	2	3	4	5	6	مجهول
غلظت	0	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2	M_{an}
داده شده	0	0.018	0.154	0.232	0.312	0.371	0.243

معادله خط:

$$y = 1.9036x + 0.0018$$

$$\Rightarrow M_{an} = 0.1267 M$$

