

تشریح مسائل

مکانیک کوانتومی

(نورالدین زتیلی)

(ویرایش دوم)

مؤلف:

محمد بہتاج

عادل سپہری

انتشارات نیاز دانش

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	فصل اول / اصول فیزیک کوانتومی
۴۷	فصل دوم / ابزارهای ریاضی مکانیک کوانتومی
۱۱۱	فصل سوم / اصول فیزیک کوانتومی
۱۴۷	فصل چهارم / مسأله‌های یک بعدی
۲۰۷	فصل پنجم / اندازه حرکت زاویه‌ای
۲۵۷	فصل ششم / مسأله‌های سه بعدی
۲۸۹	فصل هفتم / چرخش‌ها و جمع اندازه حرکت‌های زاویه‌ای
۳۲۹	فصل هشتم / ذرات یکسان
۳۵۳	فصل نهم / روش‌های تقریبی برای حالت‌های مانا
۴۴۱	فصل دهم / نظریه‌ی اختلال وابسته به زمان
۴۷۵	فصل یازدهم / نظریه‌ی پراکندگی

فصل اول

اصول فیزیک کوانتومی

تمرین ۱-۱

فلزی را در حال جوش کاری در نظر بگیرید.

- (آ) هنگامی که فلز با بیشترین توان در 490 nm تابش می کند، دمای آن چه قدر است؟
(ب) با فرض این که مانند یک جسم سیاه تابش کند، شدت تابش آن را محاسبه کنید.

حل:

(آ)

از رابطه ی (۱-۱۴) متن کتاب داریم:

$$\lambda_{\max} = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{T}$$

پس:

$$T = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{\lambda_{\max}} = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{490 \times 10^{-9}} \simeq 5916 \text{ K}$$

(ب)

$$E = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (5916)^4 \simeq 6/9 \times 10^7 \text{ W.m}^{-2}$$

تمرین ۲-۱

یک ستاره، یک لامپ روشن و یک تکه ی یخ را در نظر بگیرید. دماهای ترتیبی آنها، 8500 K ،

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

۸۵۰K و ۲۷۳/۱۵K است.

(آ) طول موجی را که در آن انرژی‌های تابیده، قله دارند تخمین بزنید.

(ب) شدت‌های تابش آن‌ها را تخمین بزنید.

حل:

(آ)

$$\lambda_{\max} = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{T}$$

$$\lambda_{\max} (T = 850 \text{ K}) = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{850 \text{ K}} \simeq 0.34 \mu\text{m}$$

$$\lambda_{\max} (T = 850 \text{ K}) = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{850 \text{ K}} \simeq 3.4 \mu\text{m}$$

$$\lambda_{\max} (T = 273/15 \text{ K}) = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m.K}}{273/15 \text{ K}} \simeq 10.6 \mu\text{m}$$

(ب)

$$E = \sigma T^4$$

$$E(T = 850 \text{ K}) = 5.67 \times 10^{-8} \times (850)^4 \simeq 3 \times 10^4 \text{ W.m}^{-2}$$

$$E(T = 850) = 3 \times 10^4 \text{ W.m}^{-2}$$

$$E(T = 273/15) \simeq 320 \text{ W.m}^{-2}$$

تمرین ۳-۱

یک لامپ روشن ۷۵ W و یک اجاق میکروویو ۸۵۰ W را در نظر بگیرید. اگر طول موج‌های تابشی که این دو می‌تابانند، به ترتیب ۵۰۰ nm و ۱۵۰ nm باشد، شمار فوتون‌هایی را که در هر ثانیه گسیل می‌کنند تخمین بزنید. آیا آثار کوانتومی در آن‌ها مهم هستند؟

حل:

انرژی فوتون با طول موج λ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\Delta E = h \frac{c}{\lambda}$$

اگر تعداد فوتون‌های گسیل شده توسط لامپ و اجاق در واحد زمان به ترتیب n_1 و n_2 باشند؛ در این صورت داریم:

$$n_1 = \frac{E_1}{\Delta E_1} = \frac{75}{6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}}} = 1.885 \times 10^{17}$$

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

$$n_r = \frac{E_r}{\Delta E_r} = \frac{850}{6/63 \times 10^{-22} \times \frac{3 \times 10^8}{150 \times 10^{-9}}} = 6417 \times 10^{17}$$

با توجه به اینکه انرژی یک کوانتا در مقایسه با انرژی کل کاملاً قابل اغماض است، بنابراین سطوح انرژی را می‌توان پیوسته در نظر گرفت. اگرچه اثرات کوانتومی همواره وجود دارند اما در اینجا چندان قابل ملاحظه نیستند.

تمرین ۴-۱

با فرض این که یک ستاره‌ی معلوم، مانند یک جسم سیاه تابش کند

(آ) دما در سطح آن و

(ب) طول موج پرتوان‌ترین تابش

هنگامی که شدت کل $575 \text{ MW} \cdot \text{m}^{-2}$ را گسیل می‌کند، تخمین بزنید.

حل:

(آ)

شدت انرژی تابش شده توسط یک جسم سیاه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$E = \sigma T^4$$

پس با دانستن E می‌توان T را به دست آورد؛ بنابراین داریم:

$$T = \left(\frac{E}{\sigma} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{575 \times 10^6}{5/67 \times 10^{-8}} \right)^{\frac{1}{4}} \simeq 10^4 \text{ K}$$

(ب)

$$\lambda_{\max} = \frac{2898/9 \times 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{K}}{T} = 2898/9 \text{ Å}$$

تمرین ۵-۱

شدت وارد شونده بر سطح زمین از طرف خورشید در حدود $1/36 \text{ K W} \cdot \text{m}^{-2}$ است. با فرض این که


خورشید کره‌ای (به شعاع $6/96 \times 10^8 \text{ m}$) باشد که مانند جسم سیاه تابش می‌کند

(آ) دما در سطح آن و طول موج قوی‌ترین تابش آن، و

(ب) توان کل تابش شده به وسیله‌ی خورشید (فاصله‌ی زمین - خورشید $1/5 \times 10^{11} \text{ m}$ است)

را تخمین بزنید.

حل:



(I)

$$E \times 4\pi R^2 = 4\pi d^2 \times \text{شدت انرژی دریافتی توسط زمین}$$

$$E = \text{شدت انرژی دریافتی توسط زمین} \times \left(\frac{d}{R}\right)^2$$

پس:

$$E = 1/36 \times 10^7 \times \left(\frac{1/5 \times 10^{11}}{6/96 \times 10^8}\right)^2 \simeq 6/32 \times 10^7 \text{ W.m}^{-2}$$

از طرفی طبق قانون استفان - بولتزمن داریم:

$$E = \sigma T^4$$

و بنابراین نتیجه می شود که:

$$T = \left(\frac{E}{\sigma}\right)^{1/4} = \left(\frac{6/32 \times 10^7}{5/67 \times 10^{-8}}\right)^{1/4} = 0/58 \times 10^4 = 5800 \text{ K}$$

(ب)

$$\begin{aligned} \text{توان کل تابش شده توسط خورشید} &= E \times 4\pi R^2 = 6/32 \times 10^7 \times 4 \times 3/14 \times (6/96 \times 10^8)^2 \\ &= 3845 \times 10^{22} \text{ W} \end{aligned}$$

تمرین ۱-۶

(آ) (۱) اختلاف انرژی ΔE میان حالت پایه و اولین حالت برانگیخته ی اتم هیدروژن؛ و (۲) نسبت $\Delta E/E_1$ میان اختلاف انرژی و انرژی حالت پایه را حساب کند.

(ب) اکنون یک سیستم ماکروسکوپی را در نظر بگیرید: یک آونگ ساده که از یک جرم ۵ گرمی متصل به یک ریسمان بدون جرم و غیرکششی به طول ۲m تشکیل شده است. (۱) انرژی کل E_1 آونگ را زمانی که ریسمان با حالت قائم زاویه ی 60° می سازد؛ (۲) بسامد نوسان های کوچک آونگ و انرژی ΔE یک کوانتا و (۳) نسبت $\Delta E/E_1$ را محاسبه کنید.

(پ) اندازه های نسبت $\Delta E/E_1$ محاسبه شده در بخش های (آ) و (ب) را امتحان کنید و درباره ی اهمیت آثار کوانتومی برای اتم هیدروژن و آونگ بحث کنید.

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

حل:
(آ)

انرژی تراز n ام اتم هیدروژن بر حسب الکترون - ولت عبارت است از:

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2}$$

پس اگر E_1 و E_2 به ترتیب انرژی حالت پایه و اولین حالت برانگیخته اتم هیدروژن باشند، داریم:

$$E_1 = \frac{-13.6}{(1)^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_2 = \frac{-13.6}{2^2} = -3.4 \text{ eV}$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -3.4 + 13.6 = 10.2 \text{ eV}$$

$$\frac{\Delta E}{E_1} = \frac{10.2 \text{ eV}}{-13.6 \text{ eV}} = -0.75$$

(ب)

اگر زمانیکه نخ پاندول با راستای قائم زاویه 60° می‌سازد انرژی پتانسیل گلوله را صفر در نظر بگیریم، با فرض اینکه سرعت گلوله هنگامی که با راستای قائم زاویه 60° می‌سازد برابر صفر است، داریم:

$$E_1 = mg \frac{l}{2} = 5 \times 10^{-2} \times 10 \times \frac{2}{2} = 0.5 \text{ J}$$

$$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{10}{2}} = 0.35 \text{ Hz}$$

$$\Delta E = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 0.35 = 2.32 \times 10^{-34} \text{ J}$$

$$\frac{\Delta E}{E_1} = \frac{2.32 \times 10^{-34}}{0.5} \simeq 4.6 \times 10^{-35}$$

(پ)

از بررسی نسبت‌های به دست آمده در قسمت‌های (آ) و (ب) نتیجه می‌شود که در نظر گرفتن اثرات کوانتومی در مورد این سیستم ماکروسکوپیکی چندان اهمیت ندارد زیرا انرژی یک کوانتا در مقایسه با انرژی کل بسیار ناچیز و قابل اغماض است.

تمرین ۷-۱

باریکه‌ای از پرتوهای X از یک چشمه‌ی گوگرد ($\lambda = 53.7 \text{ nm}$) و یک باریکه‌ی پرتو γ از یک نمونه ^{137}Cs ($\lambda = 0.19 \text{ nm}$) به یک هدف گرافیتی برخورد می‌کنند. دو آشکارساز در زوایای 30° و 120° از راستای پرتوهای فرودی قرار دارند.

(آ) جابه‌جایی طول موج پرتوهای X و پرتوهای γ ثبت شده در هر دو آشکارساز را تخمین بزنید.

(ب) انرژی جنبشی پس‌زنی الکترون در هر چهار حالت را بیابید.

(پ) چند درصد از انرژی فوتون فرودی در برخورد، در هر چهار حالت تلف می‌شود؟

حل:

(آ)

در اثر کامپتون جابه‌جایی طول موج از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = \frac{4\pi\lambda_c}{2} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

λ_c طول موج کامپتون است که مقداری برابر $3/86 \times 10^{-12} \text{ m}$ دارد و θ زاویه‌ی پراکندگی فوتون می‌باشد.

پس طبق این توضیحات در مورد هر دو پرتو X و γ داریم:

۱) $\theta = 30^\circ$

$$\Delta\lambda = 4\pi \times 3/86 \times 10^{-12} \sin^2 15^\circ = 3/63612 \times 10^{-12} \text{ m}$$

۲) $\theta = 120^\circ$

$$\Delta\lambda = 4\pi \times 3/86 \times 10^{-12} \sin^2 60^\circ = 26/9412 \times 10^{-12} \text{ m}$$

(ب)

انرژی جنبشی الکترون از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:

$$K = E_e - E_\gamma = h(\nu - \nu') = -h\Delta\nu$$

طبق رابطه‌ی $\nu = \frac{c}{\lambda}$ نیز نتیجه می‌شود که:

$$\Delta\nu = -\frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

بنابراین:

$$K = \frac{hc}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

پس داریم:

نوع پرتو	زاویه‌ی پراکندگی	K
X	30°	$0/0250647 \times 10^{-21} \text{ J}$
X	120°	$0/1857125 \times 10^{-21} \text{ J}$
γ	30°	$2002/1825 \times 10^{-21} \text{ J}$
γ	120°	$14000/1825 \times 10^{-21} \text{ J}$

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

(ب)

انرژی فوتون از رابطه $E = h\nu$ به دست می آید پس برای $\frac{\Delta E}{E}$ داریم:

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{h\Delta\nu}{h\nu} = \frac{\Delta\nu}{\nu}$$

بین فرکانس و طول موج فوتون نیز رابطه زیر برقرار است:

$$c = \lambda\nu$$

$$\ln c = \ln \lambda + \ln \nu$$

حال از رابطه اخیر دیفرانسیل می گیریم:

$$0 = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} + \frac{\Delta\nu}{\nu}$$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

پس:

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

بنابراین جدول زیر را خواهیم داشت:

پرتو	زاویه پراکندگی	$\left \frac{\Delta E}{E}\right \%$
X	30°	0.0677117×10^{-2}
X	120°	$0.05016981 \times 10^{-2}$
γ	30°	282.63158×10^{-2}
γ	120°	16.838239×10^{-2}

تمرین ۸-۱

به نظر می رسد که فوتون های پُرانرژی، ممکن است در نتیجه ی اثر کامپتون معکوس، در تابش کیهانی یافت شوند، یعنی یک فوتون نور مرئی توسط پراکندگی از پروتون پُرانرژی، انرژی می گیرد. اگر پروتون اندازه حرکتی برابر $10^6 \text{ eV}/c$ داشته باشد، بیشینه ی انرژی نهایی یک فوتون در ابتدا زردرنگ گسیل شده توسط یک اتم سدیم ($\lambda = 2/1 \text{ eV}$) را پیدا کنید.

حل:

اگر انرژی پروتون را قبل و بعد از برخورد E و E' و فرکانس فوتون را قبل و بعد از برخورد ν و ν' فرض کنیم، طبق قانون بقای انرژی می توان گفت:

$$E + h\nu = E' + h\nu'$$

برای اینکه انرژی فوتون پس از برخورد ماکزیمم باشد و یا به عبارتی ν' ماکزیمم شود چون سمت چپ رابطه‌ی فوق مقداری ثابت است، این اتفاق وقتی می‌افتد که E' کمترین مقدار خود را داشته باشد و چون کمترین مقدار E' ، $m_p c^2$ است لذا داریم:

$$E + h\nu = m_p c^2 + h\nu'_{\max}$$

$$h\nu'_{\max} = E + h\nu - m_p c^2 = \sqrt{m_p^2 c^4 + p^2 c^2} + \frac{hc}{\lambda} - m_p c^2$$

در رابطه‌ی اخیر p تکانه‌ی پروتون قبل از برخورد می‌باشد. با جایگذاری مقادیر عددی معلوم، مقدار بیشینه‌ی انرژی فوتون پراکنده شده به دست می‌آید.

تمرین ۹-۱

شمار فوتون‌های گسیل‌شده در هر ثانیه از یک لامپ روشن 75mW را تخمین بزنید؛ 575nm را به عنوان طول موج میانگین نور (مرئی) گسیل شده به کار ببرید. آیا طبیعت کوانتومی این تابش مهم است؟

حل:

اگر توان لامپ P و تعداد فوتون‌های گسیل شده توسط آن در واحد زمان n باشد از آنجا که انرژی یک فوتون با طول موج λ از رابطه‌ی $E = \frac{hc}{\lambda}$ به دست می‌آید؛ پس می‌توان گفت:

$$P = nE = n \frac{hc}{\lambda}$$

$$n = \frac{P\lambda}{hc} = \frac{75 \times 575 \times 10^{-9}}{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = 144.63226 \times 10^{17}$$

چون در اینجا، کوانتای انرژی در مقابل انرژی کل، کاملاً قابل صرف نظر کردن است و چون تعداد کوانتاهای انرژی بسیار زیاد است؛ پس سطوح انرژی را می‌توان پیوسته در نظر گرفت. چون اندازه گرفتن اختلاف انرژی بین دو سطح متوالی انرژی از نظر کلاسیکی غیرممکن است. لذا، در این مسئله اثرات کوانتومی هرچند که همواره وجود دارند اما چندان قابل اهمیت نیستند.

تمرین ۱۰-۱


یک فوتون 0.7MeV از یک الکترون که ابتدا ساکن است پراکنده می‌شود. اگر فوتون در زاویه‌ی 35° پراکنده شود

(آ) انرژی و طول موج فوتون پراکنده شده

(ب) انرژی جنبشی پس زنی الکترون و

(ب) زاویه‌ای که در آن الکترون پس زده می‌شود را حساب کنید.

حل:



(ا)

در اثر کامپتون طول موج فوتون پراکنده شده (λ') و فوتون فرودی (λ) طبق رابطه‌ی زیر به هم مربوط هستند:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = \lambda_c \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

در رابطه‌ی فوق λ_c طول موج کامپتون است که مقدار آن $3/۸۶ \times 10^{-12} \text{ m}$ می‌باشد بنابراین:

$$E = h \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6/۶۲۶ \times 10^{-۲۴} \times 3 \times 10^8}{0/۷ \times 10^6 \times 1/۶ \times 10^{-19}} = ۱۷/۷۴۸۲۱۴ \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c (1 - \cos\theta) = ۱۷/۷۴۸۲۱۴ \times 10^{-12} + 2 \times 3/۱۴ \times 3/۸۶ \times 10^{-12} (1 - \cos 35^\circ)$$

$$\lambda' = ۲۱/۳۸۴۳۳۴ \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{6/۶۲۶ \times 10^{-۲۴} \times 3 \times 10^8}{۲۱/۳۸۴۳۳۴ \times 10^{-12}} = 0/۹۲۹۵۵۹ \times 10^{-12} \text{ J} = 0/۵۸۰۹۷۴۴ \text{ MeV}$$

(ب)

انرژی الکترون K پس از برخورد از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$E + m_e c^2 = K + m_e c^2 + E'$$

$$K = E - E' = 0/۱۱۹۰۲۵۶ \text{ MeV}$$

(پ)

برای به دست آوردن زاویه‌ای که الکترون پس از برخورد با راستای حرکت فوتون فرودی می‌سازد، از قانون بقای تکانه‌ی خطی استفاده می‌کنیم. طبق شکل واضح است که:

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos 35^\circ + P \cos \phi$$

$$\frac{hv'}{c} \sin 35^\circ = P \sin \phi$$

در این روابط P اندازه حرکت الکترون بعد از برخورد است. با حذف P از روابط بالا داریم:

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{hv' \sin 35^\circ}{hv - hv' \cos 35^\circ} = \frac{E' \sin 35^\circ}{E - E' \cos 35^\circ} \approx \frac{0.15809744 \times 0.15}{0.17 - 0.15809744 \times 0.185} = 1/4.8957$$

$$\phi = \operatorname{tg}^{-1}(1/4.8957)$$

تمرین ۱-۱۱

نوری با طول موج 350 nm روی یک سطح فلزی با تابع کار $1/9 \text{ eV}$ فرود می‌آید.

(آ) انرژی جنبشی الکترون‌های پرتاب شده را محاسبه کنید.

(ب) بسامد قطع فلز را حساب کنید.

حل:
(آ)

$$K = hv - W = \frac{hc}{\lambda} - W = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} - W$$

$$\hbar c = 197/327 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

$$K = \frac{2 \times 3/14 \times 197/327}{350} - 3/9 = 11595/78 \text{ eV}$$

(ب)

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{3/9 \times 1/6.02 \times 10^{-19}}{6/626 \times 10^{-34}} \approx 0.943 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

تمرین ۱-۱۲

طول موج تابشی که بتواند الکترون‌ها را از سطح یک ورقه‌ی روی و با انرژی جنبشی 75 eV به بیرون پرتاب کند بیابید. تابع کار فلز روی $3/7 \text{ eV}$ است. همچنین طول موج قطع فلز را پیدا کنید.

حل:

طبق اثر فوتوالکتریک داریم:

$$hv = W + K$$

$$h \frac{c}{\lambda} = W + K$$

$$\lambda = \frac{hc}{W + K} = \frac{2\pi\hbar c}{W + K} = \frac{2 \times 3.14 \times 197.327 \text{ eV nm}}{(2.74 + 75) \text{ eV}} = 5137.8 \text{ nm}$$

تمرین ۱-۱۳

اگر پتانسیل توقف فلز وقتی که در برابر تابشی با طول موج ۴۸۰ nm قرار می‌گیرد، ۱/۲۷ باشد،

(ا) تابع کار فلز

(ب) طول موج قطع فلز و

(پ) بیشینه انرژی الکترون‌های پرتاب شده

را بیابید.

حل:

(ا)

از رابطه‌ی ۲۲-۱ متن کتاب استفاده می‌کنیم:

$$h\nu - W = eV_s$$

$$W = h\nu - eV_s = \frac{hc}{\lambda} - eV_s = \frac{2 \times 3.14 \times 197.327 \times 327}{480} - 12 \text{ eV}$$

$$W = 830.8 \text{ eV}$$

(ب)

$$\nu = \frac{W}{h} = \frac{830.8 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 2.0087 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

(پ)

$$K = h\nu - W = eV_s = 12 \text{ eV}$$

تمرین ۱-۱۴

تغییر طول موج کامپتون بیشینه‌ی متناظر با برخورد میان یک فوتون و یک پروتون در حال سکون

را بیابید.

حل:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_p c} (1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_p c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$(\Delta\lambda)_{\max} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{2h}{m_p c} \\ \frac{2\pi\hbar c}{m_p c^2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{2 \times 3.14 \times 197.327 \text{ eV nm}}{938.272 \text{ MeV}} = 431.6636 \times 10^{-15} \text{ m}$$

$$(\Delta\lambda)_{\max} = 431/6636 \text{ fm}$$

تمرین ۱-۱۵

اگر پتانسیل توقف یک فلز هنگامی که در برابر تابشی با طول موج 150 nm قرار می‌گیرد، $7/5 \text{ V}$ باشد، پتانسیل توقف آن را زمانی که در معرض تابشی با طول موج 275 nm قرار می‌گیرد محاسبه کنید.

حل:

از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$W = h\nu - eV_s = h\nu' - eV'_s$$

$$eV'_s = h(\nu' - \nu) + eV_s$$

$$V'_s = V_s + \frac{hc}{e} \left(\frac{1}{\lambda'} - \frac{1}{\lambda} \right) = V_s + \frac{2\pi\hbar c}{e} \frac{\lambda - \lambda'}{\lambda\lambda'} = 7/5 + 2 \times 3/14 \times 197/327 \times \frac{150 - 275}{150 \times 275} = 3/745 \text{ V}$$

تمرین ۱-۱۶

یک چشمه‌ی نور با بسامد $9/5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ به سطح فلزی با تابع کار $2/8 \text{ eV}$ می‌تابد و الکترون‌ها را به بیرون پرتاب می‌کند.

(آ) پتانسیل توقف

(ب) بسامد قطع و

(پ) انرژی جنبشی الکترون‌های پرتاب شده

را محاسبه کنید.

حل:

(آ)

از رابطه‌ی $W = h\nu - eV_s$ نتیجه می‌شود:

$$V_s = \frac{h\nu - W}{e} = \frac{3/93 \text{ eV} - 2/8 \text{ eV}}{e} = 1/13 \text{ V}$$

(ب)

$$\nu_c = \frac{W}{h} = \frac{2/8 \times 1/6 \times 10^{-19}}{6/626 \times 10^{-34}} = 6/6612432 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(پ)

از رابطه:

$$h\nu = W + K$$

نتیجه می شود که:

$$K = h\nu - W = 1/13 \text{ eV}$$

تمرین ۱-۱۷

فلزی با بسامد قطع $1/2 \times 10^{14} \text{ Hz}$ را در نظر بگیرید:

(آ) تابع کار فلز را بیابید.

(ب) انرژی جنبشی الکترون های پرتاب شده را، زمانی که فلز در برابر یک تابش با بسامد $7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ قرار می گیرد پیدا کنید.

حل:
(آ)

$$W = h\nu_c = 6/62 \times 10^{-34} \times 1/2 \times 10^{14} = 7/9512 \times 10^{-20} \text{ J} = 0/4963296 \text{ eV}$$

(ب)

$$K = h\nu - W = 6/626 \times 10^{-34} \times 7 \times 10^{14} - 7/9512 \times 10^{-20} = 38/4308 \times 10^{-20} \text{ J} \approx 2/4 \text{ eV}$$

تمرین ۱-۱۸

نوری با بسامد $7/2 \times 10^{14} \text{ Hz}$ روی چهار سطح فلزی گوناگون سزیم، آلومینیم، کبالت و پلاتین که تابع کار آنها به ترتیب $2/4 \text{ eV}$ ، $4/08 \text{ eV}$ ، $3/9 \text{ eV}$ و $6/35 \text{ eV}$ است فرود می آید.

(آ) از میان این فلزات کدام یک اثر فوتوالکتریک را نشان خواهد داد؟

(ب) برای هریک از فلزات تولیدکننده فوتوالکتریک ها، بیشینه انرژی جنبشی الکترون های پرتاب شده را حساب کنید.

حل:
(آ)

ابتدا انرژی فوتون فرودی را محاسبه می کنیم:

$$h\nu = 6/626 \times 10^{-34} \times 7/2 \times 10^{14} = 2/9779776 \text{ eV}$$

چون این مقدار تنها از تابع کار فلز سدیم بیشتر است؛ پس اثر فوتوالکتریک فقط برای این فلز اتفاق می افتد.

(ب)

$$K = h\nu - W = 2/9779776 - 2/14 = 0/8379776 \text{ eV}$$

تمرین ۱-۱۹

یک فلز با پتانسیل‌های توقف ۹V و ۴V را هنگامی که در برابر تابش دو چشمه با بسامدهای $17 \times 10^{14} \text{ Hz}$ و $8 \times 10^{14} \text{ Hz}$ قرار می‌گیرد، در نظر بگیرید:

(آ) از این داده‌ها برای یافتن مقداری عددی برای ثابت پلانک استفاده کنید.

(ب) تابع کار و بسامد قطع فلز را پیدا کنید.

(پ) بیشینه انرژی جنبشی الکترون‌های پرتاب شده را زمانی که فلز در معرض تابشی با بسامد $12 \times 10^{14} \text{ Hz}$ قرار می‌گیرد، بیابید.

حل:

(آ)

$$eV_s = h\nu - W$$

$$e\Delta V_s = h\Delta\nu$$

(ب)

$$h = \frac{e\Delta V_s}{\Delta\nu} = \frac{1/6.2 \times 10^{-19} \times (9-4)}{17 \times 10^{14} - 8 \times 10^{14}} = 6.89 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$W = h\nu - eV_s = 8/9 \times 10^{-34} \times 17 \times 10^{14} - 1/6.2 \times 10^{-19} \times 9 = 0.972 \times 10^{-19} \text{ J} = 0.6075 \text{ eV}$$


$$\nu = \frac{W}{h} = 1.092135 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(پ)

$$K = h\nu - W = 8/9 \times 10^{-34} \times 12 \times 10^{14} - 0.972 \times 10^{-19} = 9.708 \times 10^{-19} \text{ J} = 6.0599251 \text{ eV}$$

تمرین ۱-۲۰

با به‌کارگیری الزامات پایستگی انرژی و اندازه حرکت، نشان دهید که یک الکترون آزاد نمی‌تواند همه‌ی انرژی یک فوتون را جذب کند.



حل:

(آ)

پایستگی تکانه ایجاب می‌کند که تکانه‌های فوتون فرودی و الکترون پس‌زده شده هم‌جهت باشند؛

پس:

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

$$\frac{h\nu}{c} = p$$

$$pc = h\nu$$

$$h\nu + m_e c^2 = \sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2}$$

پس نتیجه می شود که:

$$h\nu + m_e c^2 = \sqrt{m_e^2 c^4 + h^2 \nu^2}$$

$$h^2 \nu^2 + m_e^2 c^4 + 2h\nu m_e c^2 = m_e^2 c^4 + h^2 \nu^2$$

$$2h\nu m_e c^2 = 0$$

نتیجه ای اخیر غیرممکن است و لذا امکان برقراری همزمان بقای انرژی و بقای تکانه ای خطی وجود ندارد و الکترون نمی تواند تمام انرژی فوتون را جذب کند.

تمرین ۱-۲۱


فوتون هایی با طول موج 5 nm از الکترون هایی که در حال سکون هستند، پراکنده می شوند. اگر فوتون ها تحت زاویه 60° نسبت به فوتون های فرودی پراکنده شوند مطلوب است:

(آ) جابه جایی طول موج کامپتون

(ب) انرژی جنبشی منتقل شده به الکترون های پس زده، و

(پ) زاویه ای که تحت آن الکترون پس زده می شود.

حل:



(آ)

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{4 \times 3.14 \times 3.14 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19}} \sin^2 30^\circ = 1.21 \times 10^{-12} \text{ m}$$

(ب)

از بایستگی انرژی استفاده می کنیم:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + m_e c^2 + K$$

$$K = h(\nu - \nu') = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda(\lambda + \Delta\lambda)}$$

$$K = 2 \times 3/14 \times 197/327 \text{ eV nm} \times \frac{0.00121204}{5(5 + 0.00121204) \text{ nm}} = 0.0600625 \text{ eV}$$

$$\frac{hv}{c} = \frac{hv'}{c} \cos \theta + P_e \cos \phi \quad (\text{ب})$$

$$\frac{hv'}{c} \sin \theta = P_e \sin \phi$$

با حذف P_e از روابط فوق داریم:

$$\tan \phi = \frac{v' \sin \theta}{v - v' \cos \theta} = \frac{\frac{c}{\lambda'} \sin \theta}{\frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda'} \cos \theta} = \frac{\lambda \sin \theta}{\lambda' - \lambda \cos \theta}$$

$$\tan \phi = \frac{\Delta \sin 6^\circ}{\Delta / 0.00121204 - \Delta \cos 6^\circ} = 1/6991762$$

$$\phi = 6^\circ$$

تمرین ۱-۲۲

پرتوهای X با طول موج 0.0008 nm با الکترون‌های ساکن برخورد می‌کنند. اگر طول موج فوتون‌های پراکنده شده 0.0017 nm باشد، مطلوب‌ست:

(آ) انرژی جنبشی الکترون‌های پس زده

(ب) زاویه‌ای که تحت آن فوتون‌ها پراکنده می‌شوند و

(پ) زاویه‌ای در آن الکترون‌ها پس‌زده می‌شوند.

حل:

(آ)

$$K = hv - hv' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = 2\pi\hbar \frac{1}{\lambda} = 2 \times 3/14 \times 197/327 \text{ eV nm} \left(\frac{10000}{8} - \frac{10000}{17} \right) \frac{1}{\text{nm}}$$

$$= 738.0610/4 \text{ eV} \simeq 7/38 \text{ MeV}$$

(ب)

طبق رابطه‌ی (۱-۳۶) داریم:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

$$\sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{\Delta\lambda}{2\lambda_c} = \frac{(17-8) \times 10^{-12}}{2 \times 2/426 \times 10^{-12}} = 0.11854905$$

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \approx 0.431$$

$$\frac{\theta}{2} = 25.5^\circ$$

$$\theta = 51^\circ$$

(ب)

طبق رابطه‌ی (۱-۱۸۱) داریم:

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sin \theta}{\frac{\lambda'}{\lambda} - \cos \theta} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\sin 51^\circ}{\frac{17}{\lambda} - \cos 51^\circ} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{0.7771}{\frac{17}{\lambda} - 0.6293} \right) = 37.5^\circ$$

تمرین ۱-۲۲

فوتون‌هایی با انرژی 7 MeV از الکترون‌های ساکن پراکنده می‌شوند. اگر انرژی فوتون‌های پراکنده شده 5 MeV باشد، پیدا کنید:

(ا) جابه‌جایی طول موج

(ب) زاویه‌ای که در آن فوتون‌ها پراکنده می‌شوند

(پ) زاویه‌ای که در آن الکترون‌ها پس‌زده می‌شوند، و

(ت) انرژی جنبشی الکترون‌های پس‌زده شده.

حله:
(ا)

$$\begin{aligned} \Delta\lambda &= \lambda' - \lambda = \frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{h\nu'} - \frac{hc}{h\nu} = 2\pi\hbar c \left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} \right) \\ &= 2 \times 3.14 \times 1.97 / 227 \text{ eV} \cdot \text{nm} \left(\frac{1}{5/2} - \frac{1}{7/2} \right) \frac{1}{\text{MeV}} = 7.8 \times 10^{-15} \text{ m} \end{aligned}$$

(ب)

$$\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\Delta\lambda}{2\lambda_c} = \frac{7.8 \times 10^{-15}}{2 \times 2.426 \times 10^{-12}} \approx 0.166$$

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \approx 0.407$$

$$\frac{\theta}{2} = 24.5^\circ$$

$$\theta = 49^\circ$$

(پ)

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sin \theta}{\frac{\lambda'}{\lambda} - \cos \theta} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\sin 45^\circ}{\frac{7}{5} - \cos 45^\circ} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{0.7071}{\frac{7}{5} - 0.7071} \right) = 45.5^\circ$$

(ت)

$$K = E - E' = 0.7 - 0.5 = 0.2 \text{ MeV}$$

تمرین ۱-۲۴

در یک پراکندگی کامپتون فوتون‌ها از الکترون‌های ساکن، اگر فوتون‌ها تحت زاویه‌ی 45° پراکنده شوند و طول موج فوتون‌های پراکنده شده، $9 \times 10^{-12} \text{ m}$ باشد،

(آ) طول موج و انرژی فوتون‌های فرودی را بیابید.

(ب) انرژی الکترون‌های پس زده و زاویه‌ای که تحت آن پس زده می‌شوند را پیدا کنید.

حل:

(آ)

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = 2\pi \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda = \lambda' - 2\pi \lambda_c (\cos \theta) = 9 \times 10^{-12} - 2 \times 3.14 \times 2.48 \times 10^{-12} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\lambda = 1.72776 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.72776 \times 10^{-12}} = 1.150507 \times 10^{-13} \text{ J} = 7.191 \text{ MeV}$$

(ب)

$$K = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = \frac{hc(\lambda' - \lambda)}{\lambda \lambda'}$$

$$K = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times (9 - 1.72776) \times 10^{-12}}{9 \times 10^{-12} \times 1.72776 \times 10^{-12}} = 1.278341 \times 10^{-13} \text{ J} \simeq 0.8 \text{ MeV}$$

$$E_e = K + m_e c^2 = 0.8 + 0.511 = 1.311 \text{ MeV}$$

از مسئله‌ی (۱-۲۳) داریم:

$$\tan \phi = \frac{\lambda \sin \theta}{\lambda' - \lambda \cos \theta} = \frac{\lambda}{\frac{\lambda'}{\sin \theta} - \lambda \tan \theta} = \frac{1.72776}{9\sqrt{2} - 1.72776}$$

$$\phi = \tan^{-1}(0.1589148) \simeq 9^\circ$$

تمرین ۱-۲۵

هنگام پراکندگی فوتون‌ها از الکترون‌های ساکن، اگر فوتون‌های پراکنده شده در زاویه 90° آشکارسازی شوند و طول موج آن‌ها دو برابر طول موج فوتون‌های فرودی باشد، موارد زیر را پیدا کنید:

- (ا) طول موج فوتون‌های فرودی
(ب) انرژی الکترون‌های پس زده و زاویه‌ای که تحت آن پراکنده می‌شوند، و
(پ) انرژی فوتون‌های فرودی و پراکنده شده.

حل:

(ا)

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda' = 2\lambda$$

(ب)

رابطه‌ی اخیر را در رابطه‌ی ماقبل جایگذاری می‌کنیم:

$$2\lambda - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda = 2\pi\lambda_c (1 - \cos \theta) = 2 \times 3/14 \times 3/86 \times 10^{-12} (1 - 0)$$

$$\lambda = 24/24.8 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$K = h\nu - h\nu' = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} \right) = \frac{2\pi\hbar c}{2\lambda} = \frac{3/14 \times 197/227 \text{ eV nm}}{0.002424.8 \text{ nm}} = 2556.3 \text{ eV}$$

$$E_e = K + m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV} + 0.2556.3 \text{ MeV} = 0.7552397 \text{ MeV}$$

$$\tan \phi = \frac{\lambda \sin \theta}{\lambda' - \lambda \cos \theta} = \frac{\lambda \times 1}{\lambda' - \lambda \times 0} = \frac{\lambda}{2\lambda} = \frac{1}{2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$$

(پ)


$$E = \frac{hc}{\lambda} = 2 \times 2556.3 \text{ eV} = 0.5112.6 \text{ MeV}$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc}{2\lambda} = \frac{1}{2} E = 0.2556.3 \text{ MeV}$$

تمرین ۱-۲۶

در پراکندگی الکترون‌ها از یک بلور، نخستین بیشینه در زاویه 60° مشاهده شد. انرژی الکترون‌ها چقدر باید باشد تا بتوانیم در عمق 19 nm درون بلور کاوش کنیم؟

حل:



در پراکندگی امواج از ساختارهای تناوبی، بین امواجی که از صفحات پراکندگی مجاور هم می‌آیند اختلاف فازی به اندازه‌ی $\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) 2d \sin \phi$ وجود دارد. تداخل سازنده وقتی رخ می‌دهد که این اختلاف فاز برابر با $2\pi n$ باشد که در آن n عدد درستی است، یعنی وقتی که داشته باشیم:

$$\lambda = \frac{2d \sin \phi}{n}$$

برای اولین ماکزیمم $n=1$ می‌باشد پس:

$$\lambda = 2d \sin \phi = 2 \times 19 \times \sin 6^\circ = 32/3 \text{ nm}$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$K = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e \lambda^2} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.109 \times 10^{-31} \times (32/3)^2 \times 10^{-18}} = 0.0023099 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$K = 0.0014419 \text{ eV}$$

تمرین ۱-۲۷

قدرت تفکیک میکروسکوپی که با الکترون‌هایی با انرژی 175 eV کار می‌کند را تخمین بزنید.

حل:

$$K_e = \frac{p^2}{2m_e}$$

$$p = \sqrt{2m_e K}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e K}} = \sqrt{\frac{h^2}{2m_e K}} = \sqrt{\frac{2\pi^2 \hbar^2 c^2}{m_e c^2 K}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^6 \times (197/3 \times 10^{-15})^2 (\text{MeV} \cdot \text{m})^2}{0.511 \text{ MeV} \times 175 \text{ eV}}}$$

$$\approx 93 \times 10^{-12} \text{ m}$$

قدرت تفکیک این میکروسکوپ مقداری برابر با طول موج دوبروی الکترون‌های آن خواهد بود.

تمرین ۱-۲۸

بلندترین و کوتاه‌ترین طول موج‌ها در سری‌های بالمر و پاشن برای اتم هیدروژن کدام هستند؟

حل:

$$E_n = -\frac{R}{n^2}$$

$$h\nu_B = E_n - E_r = R\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad ; \quad n > r$$

ν_B در واقع فرکانس فوتون گسیل شده توسط الکترون است وقتی از تراز n به تراز دوم می‌رود.

$$h\frac{c}{\lambda_B} = R\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad ; \quad n > r$$

$$\lambda_B = \frac{hc}{R\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{n^2}\right)} \quad ; \quad n > r$$

$$\frac{hc}{R} = \frac{\pi\hbar c}{R} = \frac{2 \times 3.14 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3 \times 10^8 \text{ J} \cdot \text{m}}{13.6 \text{ eV}} \simeq 89.3 \text{ nm}$$

$$\lambda_{B-\min} = \lambda_B(n \rightarrow \infty) = \frac{4hc}{R} = 364.3 \text{ nm}$$

$$\lambda_{B-\max} = \lambda_B(n=2) = \frac{5hc}{R} \simeq 656.3 \text{ nm}$$

$$h\nu_P = E_n - E_r = R\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad ; \quad n > r$$

ν_P فرکانس فوتون گسیل شده توسط الکترون است وقتی از تراز n به تراز سوم می‌رود.

$$\lambda_P = \frac{hc}{R\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{n^2}\right)}$$

$$\lambda_{P-\max} = \lambda_P(n=4) = \frac{hc}{R\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{16}\right)} = \frac{16 \times 9hc}{(16-9)R} = 1875.1 \text{ nm}$$

$$\lambda_{P-\min} = \frac{5hc}{R} = 364.3 \text{ nm}$$

تمرین ۱-۲۹

(آ) انرژی حالت پایه یون لیتیم دوبار یونیزه، Li^{2+} ، که با برداشتن دو الکترون از اتم هیدروژن به دست می‌آید را حساب کنید.

(ب) اگر یون لیتیوم Li^{2+} با یک فوتون بمباران شود و در نتیجه آن را جذب کند، انرژی و طول موج لازم فوتون برای برانگیختن یون Li^{2+} به سومین حالت برانگیخته را محاسبه کنید.

حل:

(آ)

Li^{2+} در واقع یک یون هیدروژن گونه است. انرژی تراز n ام یون های هیدروژن گونه از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$E_n = -\frac{Z^2}{1 + \frac{m_e}{M}} \frac{R}{n^2}$$

که در این رابطه، Z تعداد پروتون های هسته و M جرم نوکلئون هاست. در اینجا می توان از $\frac{m_e}{M}$ صرف نظر کرد. پس:

$$E_n = -\frac{Z^2 R}{n^2}$$

برای Li^{2+} ، $Z=3$ می باشد. انرژی حالت پایه به ازای $n=1$ حاصل می شود؛ پس:

$$E_1 = -\frac{3^2 R}{1^2} = -9R = -9 \times 13.6 = -122.4 \text{ eV}$$

(ب)

انرژی سومین حالت برانگیخته به ازای $n=4$ به دست می آید. برای اینکه فوتونی بتواند یون Li^{2+} را به حالت برانگیخته ی سوم آن برده، باید انرژی آن برابر با اختلاف انرژی تراز $n=4$ و تراز $n=1$ باشد؛ یعنی:

$$E_{ph} = h\nu = E_4 - E_1 = 9R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 9R \left(\frac{15}{16} \right) = 114.75 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{c}{\frac{E_{ph}}{h}} = \frac{hc}{E_{ph}} = \frac{2 \times 3.14 \times 197.327 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{114.75 \text{ eV}} \approx 10.8 \text{ nm}$$

تمرین ۱-۳۰

یک یون سدیم ده بار یونیزه، Na^{10+} ، که با برداشتن ده الکترون از یک اتم Na حاصل می شود را در نظر بگیرید.

(آ) سرعت چرخش و اندازه حرکت زاویه ای مداری الکترون را (برحسب چشمه ی یون) هنگامی که یون در چهارمین حالت برانگیخته است، محاسبه کنید.

(ب) بسامد تابش گسیل شده را برای یون از چهارمین حالت برانگیخته خود به اولین حالت

برانگیخته برمی گردد، حساب کنید.

حل:
(ا)

$$L_n = n\hbar = m_e r_n v_n$$

$$r_n = \frac{a \cdot n^2}{Z}$$

$$v_n = \frac{n\hbar}{m_e r_n} = \frac{n\hbar}{m_e} \frac{Z}{a \cdot n^2} = \frac{\hbar Z}{m_e a \cdot n}$$

در اینجا $Z=11$ و $n=5$ می باشد.

$$L_5 = 5\hbar = 5 \times 1.055 \times 10^{-34} \text{ J.s} = 5.275 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$v_5 = \frac{11\hbar}{5m_e a} = \frac{11}{5} \frac{1.055 \times 10^{-34}}{9.109 \times 10^{-31} \times 5/3 \times 10^{-9}} = 0.48076 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 480.76 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(ب)

انرژی فوتون گسیل شده وقتی الکترون از تراز n به تراز m سقوط می کند از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$E = h\nu = E_n - E_m = \frac{-Z^2 R}{n^2} + \frac{Z^2 R}{m^2} = Z^2 R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\nu = \frac{Z^2 R}{h} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

در اینجا $m=2$ و $n=5$ می باشد. پس:

$$\nu = \frac{121 \times 13.6 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{25} \right) = 83.55 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

تمرین ۱-۳۱

طول موج تابش لازم را برای برانگیختن اتم بریلیم سه بار یونیزه، Be^{3+} ، از حالت پایه به سومین حالت برانگیخته، محاسبه کنید.

حل:

$$h \frac{c}{\lambda} = E_f - E_i = Z^2 R \left(\frac{1}{i^2} - \frac{1}{f^2} \right) = \frac{15}{16} Z^2 R$$

$$\lambda = \frac{16hc}{15Z^2 R} = \frac{16 \times 2 \times 3.14 \times 197/327 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{15 \times 4^2 \times 13.6 \text{ eV}} \simeq 3.04 \text{ nm}$$

تمرین ۱-۳۲

براساس مدل کلاسیک اتم هیدروژن، یک الکترون در حال حرکت در یک مدار دایره‌ای با شعاع 0.053 nm به دور پروتونی ثابت در مرکز، ناپایدار است و الکترون باید سرانجام روی پروتون فرویفتد. تخمین بزنید چه مدت زمانی طول می‌کشد تا الکترون بر روی پروتون فرویفتد. (راهنمایی: با عبارت کلاسیک برای تابش از یک بار شتاب‌دار آغاز کنید.)

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} \frac{e^2 a^2}{4\pi\epsilon_0 c^3}, \quad E = \frac{p^2}{2m} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

که در آن a شتاب الکترون و E انرژی کل است.

حل:

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{m^2 v^2}{m^2 r} = \frac{p^2}{m^2 r} = \frac{p^2}{2m} \frac{2}{mr} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{2}{mr} = \frac{e^2}{2\pi\epsilon_0 m r^2}$$

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 c^3} \left(\frac{e^2}{2\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{m^2 r^4} = -\frac{2}{3} \frac{e^6}{(4\pi\epsilon_0)^2 m^2 c^3 r^4} \quad (1)$$

رابطه‌ی اخیر را با جایگذاری مقدار a از رابطه‌ی ماقبل نوشتیم.

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE}{dr} \frac{dr}{dt} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{dr}{dt} \quad (2)$$

روابط (۱) و (۲) را با هم مساوی قرار می‌دهیم:

$$-\frac{2}{3} \frac{e^6}{(4\pi\epsilon_0)^2 m^2 c^3 r^4} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{dr}{dt}$$

$$dt = -\frac{2}{3} \frac{(4\pi\epsilon_0)^2 m^2 c^3 r^4}{e^6} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = -\frac{2}{3} \frac{(4\pi\epsilon_0)^2 m^2 c^3}{e^4} r^2 dr$$

$$[t]^t = -\frac{2}{3} \frac{(4\pi\epsilon_0)^2 m^2 c^3}{e^4} \left[\frac{r^3}{3} \right]_a$$

$$t = \frac{(4\pi\epsilon_0)^2 m^2 c^3 a^3}{6e^4}$$

در رابطه‌ی زیر $a = 5/3 \text{ nm}$ می‌باشد.

تمرین ۱-۳۳

طول موج دوبروی را در موارد زیر حساب کنید:

(آ) الکترونی با انرژی جنبشی

@Quark_ARAKU
@Quark_Book

(ب) پروتونی با انرژی جنبشی 70 MeV

(پ) یک گلوله‌ی 100 گرمی در حال حرکت با سرعت 1200 ms^{-1}

داده‌های مفید: $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ ، $m_p c^2 = 938.3 \text{ MeV}$ و $hc \approx 197.3 \text{ eV} \cdot \text{nm}$

حل:

در این مسئله داده‌ها طوری است که می‌توان از روابط کلاسیکی استفاده کرد.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{\sqrt{2}hc}{\sqrt{2mc^2K}} = \frac{\sqrt{2}hc}{\sqrt{mc^2K}}$$

(آ)

$$\lambda = \frac{1/4 \times 3/14 \times 19732/8 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{10^3 \sqrt{0.511 \times 54 \text{ eV}}} = 17/8 \text{ nm}$$

(ب)

$$\lambda = \frac{1/4 \times 3/14 \times 19732/8 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\sqrt{70 \times 938.3 \text{ MeV}}} = 339 \times 10^{-15} \text{ m} = 339 \text{ fm}$$

(پ)

$$\lambda = \frac{6/626 \times 10^{-27} \text{ J} \cdot \text{s}}{0.1 \times 1200} = 0.55 \times 10^{-27} \text{ m}$$

تمرین ۱-۳۴

یک نوسانگر یک‌بعدی ساده، ذره‌ای است که یک نیروی خطی بازگرداننده $F(x) = -m\omega^2 x$ بر آن اعمال می‌شود. از دیدگاه کلاسیک، کمینه انرژی نوسانگر صفر است، زیرا می‌توانیم آن را در حالی که سرعت اولیه‌اش صفر می‌باشد، به‌طور دقیق در $x=0$ یعنی در، وضعیت تعادلش قرار دهیم. از دیدگاه کوانتوم مکانیکی، اصل عدم قطعیت به ما اجازه نمی‌دهد که ذره را دقیقاً جایگزیده کنیم و در همان زمان، آن را ساکن نگه داریم. با استفاده از اصل عدم قطعیت، کمینه انرژی نوسانگر کوانتوم مکانیکی را تخمین بزنید.

حل:

برای حل چنین مسائلی عدم قطعیت در مکان را از مرتبه‌ی مکان و عدم قطعیت در اندازه‌ی حرکت را از مرتبه‌ی اندازه‌ی حرکت در نظر می‌گیریم و رابطه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ را به‌صورت حالت تساوی آن به‌کار می‌بریم؛ یعنی به‌طور خلاصه:

$$\Delta x \simeq x$$

$$\Delta p \simeq p$$

$$\Delta x \Delta p = \hbar$$

برای یافتن انرژی حالت پایه، انرژی کل را مینیمم می‌کنیم:

$$F(x) = -m\omega^2 x = -\frac{dV}{dx}$$

$$V(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$E = K + V = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 = \frac{\hbar^2}{2mx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{-2}{x^3} + \frac{1}{2} m\omega^2 (2x) = -\frac{\hbar^2}{mx^3} + m\omega^2 x$$

فرض کنیم که انرژی در $x = x_0$ ، مینیمم شود؛ پس باید داشته باشیم:

$$\left. \frac{dE}{dx} \right|_{x=x_0} = 0$$

$$-\frac{\hbar^2}{mx_0^3} + m\omega^2 x_0 = 0$$

$$x_0^4 = \frac{\hbar^2}{m^2 \omega^2}$$

$$x_0 = \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$E_{\text{پایه}} = E(x = x_0) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{m\omega}{\hbar} \right) + \frac{1}{2} m\omega^2 \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right) = +\frac{1}{2} \hbar\omega + \frac{1}{2} \hbar\omega = \hbar\omega$$

تمرین ۱-۳۵

یک آزمایش دو شکافی را در نظر بگیرید که در آن امواج گسیل شده از شکاف‌ها بر روی پرده‌ی قائم موازی با محور x بر هم نهی می‌کنند. هنگامی که فقط یک شکاف باز است، دامنه‌ی موجی که ایجاد می‌شود $\psi_1(y, t) = e^{-y^2/2r^2} e^{i(\omega t - ay)}$ است و زمانی که تنها شکاف دیگر باز باشد، دامنه $\psi_2(y, t) = e^{-y^2/2r^2} e^{i(\omega t - ay - \pi y)}$ است.

(آ) الگوی تداخلی در راستای محور x با دو شکاف باز کدام است؟ شدت موج را برحسب تابعی از y رسم کنید.

(ب) اگر چشمه‌ی نوری را پشت پرده قرار دهیم تا اندازه بگیرد که نور از میان کدام شکاف گذشته است، شدت موج چه مقدار می‌شود؟

حل:

(ا)

از بهنجار کردن ψ_1 و ψ_2 نتیجه می شود که:


$$\psi_1(y, t) = \left(\frac{1}{16\pi} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{y^2}{16}} e^{i(ut - ay)}$$

$$\psi_2(y, t) = \left(\frac{1}{16\pi} \right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{y^2}{16}} e^{i(ut - ay - \pi y)}$$

و لذا:

$$I(y) = |\psi_1(y, t) + \psi_2(y, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{16\pi}} \left| e^{-\frac{y^2}{16}} e^{i(ut - ay)} + e^{-\frac{y^2}{16}} e^{-i(ut - ay - \pi y)} \right|^2 = \frac{1}{\sqrt{16\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}} |1 + e^{-i2\pi y}|^2$$


$$= \frac{e^{-\frac{y^2}{8}} \cos^2\left(\frac{\pi y}{2}\right)}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}} \cos^2\left(\frac{\pi y}{2}\right)$$



(ب)

در این حالت شدت از رابطی زیر به دست می آید:

$$I(y) = |\psi_1(y, t)|^2 + |\psi_2(y, t)|^2 = \frac{e^{-\frac{y^2}{8}}}{\sqrt{16\pi}} + \frac{e^{-\frac{y^2}{8}}}{\sqrt{16\pi}} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{8}}$$



تمرین ۱-۳۶

سه تابع موج زیر را در نظر بگیرید:

$$\psi_r(y) = A_r \left(e^{-y^r} + y e^{-y^r/r} \right) \quad \text{و} \quad \psi_r(y) = A_r e^{-y^r/r} \quad \text{و} \quad \psi_1(y) = A_1 e^{-y^r}$$

که در آن A_1 ، A_r و A_r ثابت‌های بهنجارش هستند.

(آ) A_1 ، A_r و A_r را طوری بیابید که ψ_1 ، ψ_r و ψ_r بهنجار باشند.

(ب) احتمال آن که هر کدام از حالت‌ها در بازه $-1 < y < 1$ باشند را پیدا کنید.

حل:
(آ)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_1|^r dy = |A_1|^r \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ry^r} dy = |A_1|^r \sqrt{\frac{\pi}{r}}$$

شرط بهنجارش آن است که: $\int |\psi|^r dy = 1$ ؛ پس:

$$A_1 = \left(\frac{r}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$A_r = \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$\int |\psi_r|^r dy = |A_r|^r \int_{-\infty}^{+\infty} \left(e^{-ry^r} + ry e^{-\frac{r}{r}y^r} + y^r e^{-y^r} \right) dy$$

قبل از محاسبه انتگرال فوق ذکر نکات زیر مفید است:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha y^r} dy = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

حال از طرفین رابطه‌ی فوق نسبت به α مشتق می‌گیریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y^r e^{-\alpha y^r} dy = -\frac{d}{d\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$$

پس با توجه به اینکه $\int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-\frac{r}{2} y^r} dy = 0$ داریم:

$$\int |\psi_r|^r dy = |A_r|^r \left(\sqrt{\frac{\pi}{r}} + \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\pi}{(1)^r}} \right) = \frac{\sqrt{\pi}}{r} (1 + \sqrt{r}) |A_r|^r = 1$$

پس:

$$A_r = \left(\frac{r}{\sqrt{\pi}(1 + \sqrt{r})} \right)^{\frac{1}{r}}$$

(ب)

$$P_1 = \int_{-1}^{+1} |\psi_1|^r dy = \left(\frac{r}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}} \int_{-1}^{+1} e^{-r y^r} dy = r \left(\frac{r}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}} \int_0^1 e^{-r y^r} dy = r \left(\frac{r}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}} \times 0.5801 = 0.926$$

$$P_r = \int_{-1}^{+1} |\psi_r|^r dy = \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}} \int_{-1}^{+1} e^{-y^r} dy = r \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}} \int_0^1 e^{-y^r} dy = r \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{1}{r}} \times 0.6978 = 0.787$$

$$\begin{aligned} P_r &= \int_{-1}^{+1} |\psi_r|^r dy = \frac{r}{\sqrt{\pi}(1 + \sqrt{r})} \int_{-1}^{+1} \left(e^{-r y^r} + y^r e^{-y^r} + r y e^{-\frac{r}{2} y^r} \right) dy \\ &= \frac{r}{\sqrt{\pi}(1 + \sqrt{r})} \left[\int_0^1 y^r e^{-r y^r} dy + \int_0^1 y^r e^{-y^r} dy \right] = \frac{r}{\sqrt{\pi}(1 + \sqrt{r})} (0.1098 + 0.1857) = 0.276 \end{aligned}$$

تمرین ۱-۳۷

تبدیل فوریه $\phi(p)$ تابع زیر را پیدا کرده و آن را رسم کنید:

$$\psi(x) = \begin{cases} 1 - |x| & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}$$

حل:

$$\begin{aligned} \phi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-1}^{+1} (1 - |x|) e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx \\ &= \frac{r}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left[\int_0^1 \cos \frac{px}{\hbar} dx - \int_0^1 x \cos \frac{px}{\hbar} dx \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{r}{\sqrt{r\pi\hbar}} \left\{ \frac{\hbar}{p} \left[\sin \frac{px}{\hbar} \right]' - \frac{\hbar}{p} \left[x \sin \frac{px}{\hbar} \right]' - \frac{\hbar^r}{p^r} \left[\cos \frac{px}{\hbar} \right]' \right\} \\
 &= \frac{r}{\sqrt{r\pi\hbar}} \frac{\hbar^r}{p^r} \left(1 - \cos \frac{p}{\hbar} \right) = \frac{r\hbar^r}{\sqrt{r\pi\hbar} p^r} \sin^r \left(\frac{p}{r\hbar} \right)
 \end{aligned}$$

تمرین ۱-۳۸

(آ) تبدیل فوری $\phi(k) = A e^{-a|k| - ibk}$ را بیابید که در آن a و b اعداد حقیقی اند و a مثبت است.
 (ب) A را طوری بیابید که $\psi(x)$ بهنجار باشد.
 (پ) عدم قطعیت‌های x و k را محاسبه کنید و حاصل ضرب عدم قطعیت $\Delta x \Delta p$ را به دست آورید. آیا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ برقرار است؟

حل:
(آ)

$$\begin{aligned}
 \phi(p) &= \frac{1}{\sqrt{r\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx = \frac{1}{\sqrt{r\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - |x|) e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx \\
 \psi(x) &= \frac{1}{\sqrt{r\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{ikx} dk = \frac{1}{\sqrt{r\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{-a|k| - ibk} e^{ikx} dk \\
 &= \frac{A}{\sqrt{r\pi}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|k|} (\cos kx + i \sin kx) dk + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik(x-b)} dk \right] \\
 &= \frac{A}{\sqrt{r\pi}} \left[r \int_0^{+\infty} e^{-ak} \cos kx dk + r\pi \delta(x-b) \right] \\
 &= \frac{rA}{\sqrt{r\pi}} \left[\frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} \right] \left\{ -\frac{1}{a} \left[\cos(kx) e^{-ak} \right]_0^{+\infty} + \frac{x}{a^2} \left[e^{-ak} \sin kx \right]_0^{+\infty} \right\} + \pi \delta(x-b) \\
 &= \frac{rA}{\sqrt{r\pi}} \left[\frac{a}{x^2 + a^2} + \pi \delta(x-b) \right]
 \end{aligned}$$

(ب)

اگر $\psi(x)$ بهنجار باشد $\phi(k)$ نیز بهنجار خواهد بود و بالعکس. پس برای یافتن A کافیست که $\phi(k)$ را بهنجار کنیم.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k)^r dk &= |A|^r \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ra|k|} dk = r|A|^r \int_0^{+\infty} e^{-rak} dk = \frac{-r|A|^r}{ra} \left[e^{-rak} \right]_0^{+\infty} \\
 \int |\phi(k)|^r dk &= \frac{|A|^r}{a} = 1
 \end{aligned}$$

$$A = \sqrt{a}$$

(ب)

برای محاسبه Δk ، k هایی را که به ازای آنها، $\frac{1}{c} |\phi(k)|^2$ مقدار ماکزیمم خود را دارد، می‌یابیم (این نقاط مطلوب را k_+ می‌نامیم):

$$|\phi(k_+)|^2 = |A|^2 e^{-\tau a |k_+|} = |A|^2 e^{-1}$$

$$|k_+| = \frac{1}{\tau a}$$

$$k_+ = \pm \frac{1}{\tau a}$$

$$\Delta k = k_+ - k_- = \frac{1}{a}$$

برای به دست آوردن Δx ، از تعریف زیر استفاده می‌کنیم:

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\langle x^2 \rangle = \int x^2 |\psi(x)|^2 dx$$

$$\langle x \rangle = \int x |\psi(x)|^2 dx$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\tau a}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{-\frac{1}{\tau a}} \frac{a^2 x^2 dx}{(x^2 + a^2)^2} + \int_{-\frac{1}{\tau a}}^{+\infty} \frac{\tau a \pi \delta(x-b) x^2 dx}{x^2 + a^2} + \int_{-\infty}^{+\infty} \pi^2 \delta^2(x-b) x^2 dx \right]$$

$$= \frac{\tau a}{\pi} \left[\int_{-\infty}^{-\frac{1}{\tau a}} \frac{a^2 x^2 dx}{(x^2 + a^2)^2} + \frac{\tau a \pi b^2}{b^2 + a^2} + \pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \delta^2(x-b) x^2 dx \right]$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{\tau a}{\pi} \left(\frac{\tau a \pi b^2}{a^2 + b^2} + \pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \delta^2(x-b) x^2 dx \right)$$

برای محاسبه انتگرال‌های $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^2(x-b) x^2 dx$ و $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^2(x-b) x dx$ ، تابع دلتای دیراک را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\delta(x-b) = \begin{cases} \frac{1}{\tau \varepsilon}, & b - \varepsilon < x < b + \varepsilon \\ 0, & \text{بقیه جاها} \end{cases}$$

که در اینجا ε مقدار مثبت بسیار کوچکی است.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^2(x-b) x dx = \int_{b-\varepsilon}^{b+\varepsilon} \frac{x dx}{\tau \varepsilon^2} = \left(\frac{x^2}{2\tau \varepsilon^2} \right)_{b-\varepsilon}^{b+\varepsilon} = \frac{\tau b \varepsilon}{2\tau \varepsilon^2} = \frac{b}{2\varepsilon}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^r(x-b)x^r dx = \int_{b-\varepsilon}^{b+\varepsilon} \frac{x^r dx}{\varepsilon^r} = \left(\frac{x^r}{\varepsilon^r} \right)_{b-\varepsilon}^{b+\varepsilon} = \frac{\varepsilon^r + 2b^r}{\varepsilon^r} = \frac{\varepsilon^r + 2b^r}{\varepsilon^r}$$

حال $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^r dx}{(x^r + a^r)^r}$ را حساب می‌کنیم.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^r dx}{(x^r + a^r)^r} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{[(x^r + a^r) - a^r] dx}{(x^r + a^r)^r} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^r + a^r} - a^r \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^r + a^r)^r} \\ &= \frac{1}{a} \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - a^r I \end{aligned}$$

که در آن

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^r + a^r)^r}$$

برای یافتن این انتگرال از تغییر متغیر $x = a \operatorname{tg} \theta$ استفاده می‌کنیم.

$$dx = a(1 + \operatorname{tg}^2 \theta) d\theta$$

$$I = \int_{x=-\infty}^{x=+\infty} \frac{a(1 + \operatorname{tg}^2 \theta) d\theta}{a^r (1 + \operatorname{tg}^2 \theta)^r} = \int_{-\infty}^{+\infty} a^{-r} \cos^r \theta d\theta = \frac{a^{-r}}{r} \int_{x=-\infty}^{x=+\infty} (1 + \cos^2 \theta) d\theta =$$

$$= \frac{a^{-r}}{r} \left(\theta + \frac{1}{r} \sin^r \theta \right) \Big|_{x=-\infty}^{x=+\infty}$$

$$I = \frac{a^{-r}}{r} \left[\operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + \frac{1}{r} \frac{\frac{rx}{a}}{1 + \frac{x^r}{a^r}} \right]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^r dx}{(x^r + a^r)^r} = \left[\frac{1}{ra} \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) - \frac{x}{x^r + a^r} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{ra}$$

$$\langle x^r \rangle - \langle x \rangle^r = \frac{ra}{\pi} \left[\frac{a^r \pi}{ra} + \frac{ra \pi b^r}{a^r + b^r} + \frac{\pi^r (\varepsilon^r + 2b^r)}{r\varepsilon} \right] - \frac{ra^r}{\pi^r} \left(\frac{ra \pi b}{a^r + b^r} + \frac{\pi^r b}{r\varepsilon} \right)$$

$$= \frac{ra}{\pi} \left[\frac{a^r \pi}{ra} + \frac{ra \pi b^r}{a^r + b^r} + \frac{\pi (\varepsilon^r + 2b^r)}{r\varepsilon} \right] - \frac{ra^r}{\pi^r} \left[\frac{ra^r \pi^r b^r}{(a^r + b^r)^r} + \frac{\pi^r b^r}{r\varepsilon^r} + \frac{\pi^r a b^r}{\varepsilon (a^r + b^r)} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= a^r + \frac{2a^r b^r}{a^r + b^r} + \frac{2a\pi\epsilon^r + 2\pi ab^r}{2\epsilon} - \frac{16a^r b^r}{(a^r + b^r)^2} - \frac{\pi^2 a^r b^r}{\epsilon^2} - \frac{16\pi^2 a^r b^r}{\epsilon(a^r + b^r)} \\
&= \frac{2a^r(a^r + b^r)^2 \epsilon^r + 12a^r b^r(a^r + b^r)\epsilon^r + \epsilon(a^r + b^r)^2(2a\pi\epsilon^r + 2\pi ab^r)}{2\epsilon^r(a^r + b^r)^2} \\
&\quad + \frac{-4\lambda a^r b^r \epsilon^r - 2(a^r + b^r)^2 a^r b^r \pi^2 - 4\lambda \pi^2 a^r b^r(a^r + b^r)\epsilon}{2\epsilon^r(a^r + b^r)^2}
\end{aligned}$$

بنابراین $-\infty \rightarrow (\Delta x)^2$ ؛ یعنی امکان تعریف Δx وجود ندارد و این به دلیل آنست که اصولاً $\psi(x)$ شرایط یک تابع موج فیزیکی را ندارد و در نقاط $x=b$ ، مقدار آن به سمت $+\infty$ میل می‌کند. در ضمن باید تأکید کرد که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تنها برای توابع موج واقعی صادق است.

تمرین ۱-۳۹

(آ) تبدیل فوریه ی $\psi(x)$ تابع

$$\phi(p) = \begin{cases} 0, & p < -p. \\ A, & -p. < p < p. \\ 0, & p. < p \end{cases}$$

را بیابید که در آن A یک ثابت حقیقی است.

(ب) A را طوری بیابید که $\psi(x)$ بهنجار باشد و $\phi(p)$ و $\psi(x)$ را بیابید. (راهنمایی: انتگرال زیر ممکن است لازم باشد:

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} dx (\sin^r(ax)) \right) / x^r = \pi a$$

(پ) عدم قطعیت‌های Δx و Δp را تخمین بزنید و آنگاه ثابت کنید که $\Delta x \Delta p$ رابطه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ را برآورده می‌کند.

حل:

(آ)

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \phi(p) dp$$

$$\psi(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-p.}^{p.} e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp = \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\hbar}{ix} \left(e^{\frac{ip. x}{\hbar}} - e^{-\frac{ip. x}{\hbar}} \right)$$

$$\psi(x) = \frac{2A\hbar}{x\sqrt{2\pi\hbar}} \sin\left(\frac{p. x}{\hbar}\right)$$

(ب)

برای به دست آوردن A ، از شرط بهنجارش استفاده می‌کنیم.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(P)|^2 dP = 1 = \int_{-P_0}^{P_0} |A|^2 dp = |A|^2 2P_0$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{2P_0}}$$

(پ)

به نظر می‌رسد تعاریف ارائه شده برای Δx و ΔP به لحاظ ابعادی دارای اشکال است. تعاریف دقیق عبارتند از:

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\Delta P = \sqrt{\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2}$$

که در این روابط:

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx = \frac{4A^2 \hbar^2}{2\pi \hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 \frac{Px}{\hbar} dx \rightarrow +\infty$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx = 0$$

$$\langle P^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P^2 |\phi(P)|^2 dP = \int_{-P_0}^{P_0} P^2 A^2 dp = \frac{2A^2}{3} P_0^3$$

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} P |\phi(P)|^2 dP = 0$$

$$\Delta x \Delta P \rightarrow +\infty$$

پس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ برقرار می‌باشد.

تمرین ۱-۴۰

طول عمر حالت برانگیخته‌ی یک اتم را که پهنای طبیعی آن $3 \times 10^{-4} \text{ eV}$ است تخمین بزنید. ممکن است به مقدار $J.s = 4/14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$ و $\hbar = 6/626 \times 10^{-27}$ نیاز داشته باشید.

حل:

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t \geq \frac{\hbar}{2\Delta E} = \frac{4/14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}}{2 \times 3 \times 10^{-4} \text{ eV}} = 0/69 \times 10^{-11} \text{ s}$$

بنابراین طول عمر حالت برانگیخته‌ی اتم از مرتبه‌ای است که در بالا به دست آمده است.

@Quark_ARAKU

@Quark_Book

تمرین ۱-۴۱

پهنای طبیعی بسته‌ی موج متناظر با یک گلوله‌ی ۸۰ گرمی را پس از ۲۰s محاسبه کنید. اندازه‌ی گلوله ۲cm است.

حل:

$\Delta x(t)$ یعنی پهنای بسته موج در لحظه‌ی t از طریق رابطه‌ی زیر به پهنای بسته موج در لحظه‌ی صفر یعنی Δx_0 مربوط می‌شود:

$$\Delta x(t) = \Delta x_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\delta x}{\Delta x_0} \right)^2}$$

در رابطه‌ی فوق داریم:

$$\frac{\delta x}{\Delta x_0} = \frac{\hbar t}{ma^2} = \frac{\hbar t}{2m \left(\frac{a}{2} \right)^2} = \frac{\hbar t}{2m (\Delta x_0)^2}$$

$$\Delta x(t=20s) = 2\text{cm} \sqrt{1 + \left(\frac{6.626 \times 10^{-34} \times 20}{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (2 \times 10^{-2})^2} \right)^2} \simeq 2\text{cm}$$

تمرین ۱-۴۲

یک پیکان ۱۰۰ گرمی با سرعت 30ms^{-1} مسافت 50m را می‌پیماید. اگر اندازه‌ی اولیه‌ی بسته‌ی موج 5cm باشد، اندازه‌ی نهایی آن چه مقدار خواهد بود؟

حل:

$$t = \frac{l}{v}$$

$$\Delta x(t) = \Delta x_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar l}{2mv(\Delta x_0)^2} \right)^2} = 5\text{cm} \sqrt{1 + \left(\frac{6.626 \times 10^{-34} \times 50}{2 \times 10^{-1} \times 30 \times (5 \times 10^{-2})^2} \right)^2} \simeq 5\text{cm}$$

تمرین ۱-۴۳

یک باریکه‌ی 50MeV از پروتون‌ها به فاصله‌ی 10 کیلومتری شلیک می‌شود. اگر اندازه اولیه‌ی بسته‌ی موج $1/5 \times 10^{-6}\text{m}$ باشد، اندازه‌ی نهایی هنگام رسیدن چقدر خواهد بود؟

حل:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \left(\frac{2K}{m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$l = \frac{h}{v} = h \left(\frac{m}{2K} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\left(\frac{\delta x}{\Delta x} \right)^2 = \frac{h^2}{4m^2 (\Delta x)^2} \frac{l^2 m}{2K} = \frac{h^2 l^2}{4mK (\Delta x)^2} = \frac{\left[\frac{6.626 \times 10^{-34} \times 1.0 \times 10^{-2}}{(1.5 \times 10^{-6})^2} \right]^2 \times \frac{1}{4\pi^2}}{4 \times 1.673 \times 10^{-27} \times 5.0 \times 10^{-6} \times 1.602 \times 10^{-19}}$$

$$\left(\frac{\delta x}{\Delta x} \right)^2 = 0.0202237$$

$$\Delta x = 1.5 \times 10^{-6} \sqrt{0.0202237} \approx 1.5 \times 10^{-6}$$

تمرین ۱-۴۴

یک باریکه‌ی ۲۵۰ GeV به فاصله‌ی ۱ کیلومتری پرتاب می‌شود. اگر اندازه‌ی اولیه‌ی بسته موج ۱mm باشد، اندازه‌ی نهایی آن را پیدا کنید.

حل:

$$K = E - E_0 = E_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

$$v = c \sqrt{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{K}{E_0} \right)^2}} = c \sqrt{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{250 \times 10^3 \text{ MeV}}{938.27 \text{ MeV}} \right)^2}} = \sqrt{0.999993}c$$

$$\left(\frac{\delta x}{\Delta x} \right)^2 = \left[\frac{hl}{2m(\Delta x)^2} \right]^2 \frac{1}{v^2} = \left[\frac{1.055 \times 10^{-34} \times 1.0^{-2}}{2 \times 1.673 \times 10^{-27} \times (1.0^{-2})^2} \right]^2 \times \frac{1}{0.999993 \times (3 \times 10^8)^2}$$

$$\left(\frac{\delta x}{\Delta x} \right)^2 = 0.0110462 \times 10^{-12}$$

$$\Delta x \approx \Delta x_0$$

تمرین ۱-۴۵

یک ریسمان غیرکششی با چگالی خطی μ (جرم در واحد طول) را در نظر بگیرید. اگر ریسمان تحت کشش T قرار بگیرد، بسامد زاویه‌ای امواج ریسمان بر حسب عدد موج k با $\omega = k\sqrt{T/\mu}$ داده می‌شود. سرعت‌های فاز و گروه را بیابید.

حل:

$$w = k\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$v_{ph} = \frac{w}{k} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$v_g = \frac{dw}{dk} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

تمرین ۱-۴۶

بسامد زاویه‌ای یک موج در حال انتشار درون یک موجبر بر حسب عدد موج k و پهنای b موجبر با $\omega = kc \left[1 - \pi^2 / (b^2 k^2) \right]^{\frac{1}{2}}$ داده می‌شود. سرعت‌های فاز و گروه موج را بیابید.

حل:

$$v_{ph} = \frac{w}{k} = c \left[1 - \frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right]^{\frac{-1}{2}}$$

$$v_g = \frac{dw}{dk} = c \left[1 - \frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right]^{\frac{-1}{2}} + kc \left[1 - \frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right]^{\frac{-3}{2}} \left(\frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right) = v_{ph} + v_{ph}^2 \left(\frac{2\pi^2 c^{\frac{5}{2}}}{b^2 k^2} \right)$$

تمرین ۱-۴۷

نشان دهید برای آن امواجی که بسامد زاویه‌ای ω و عدد موج k آن‌ها از رابطه پاشندگی $\omega^2 = k^2 c^2 + \text{constant}$ پیروی می‌کند، حاصل ضرب سرعت‌های فاز و گروه برابر با $v_g v_{ph} = c^2$ است که در آن c سرعت نور است.

حل:

$$k^2 c^2 = \omega^2 + cte$$

$$v_{ph}^2 = \frac{w^2}{k^2} = c^2 - \frac{cte}{k^2}$$

تمرین ۱-۴۵

یک ریسمان غیرکششی با چگالی خطی μ (جرم در واحد طول) را در نظر بگیرید. اگر ریسمان تحت کشش T قرار بگیرد، بسامد زاویه‌ای امواج ریسمان بر حسب عدد موج k با $\omega = k\sqrt{T/\mu}$ داده می‌شود. سرعت‌های فاز و گروه را بیابید.

حل:

$$w = k\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$v_{ph} = \frac{w}{k} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$v_g = \frac{dw}{dk} = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

تمرین ۱-۴۶

بسامد زاویه‌ای یک موج در حال انتشار درون یک موجبر بر حسب عدد موج k و پهنای b موجبر با $\omega = kc \left[1 - \pi^2 / (b^2 k^2) \right]^{1/2}$ داده می‌شود. سرعت‌های فاز و گروه موج را بیابید.

حل:

$$v_{ph} = \frac{w}{k} = c \left[1 - \frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right]^{-1/2}$$

$$v_g = \frac{dw}{dk} = c \left[1 - \frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right]^{-1/2} + kc \left[1 - \frac{\pi^2}{b^2 k^2} \right]^{-3/2} \left(\frac{\pi^2}{b^2 k^3} \right) = v_{ph} + v_{ph}^2 \left(\frac{\pi^2 c^2}{b^2 k^3} \right)$$

تمرین ۱-۴۷

نشان دهید برای آن امواجی که بسامد زاویه‌ای ω و عدد موج k آن‌ها از رابطه پاشندگی $\omega^2 = k^2 c^2 + \text{constant}$ پیروی می‌کند، حاصل ضرب سرعت‌های فاز و گروه برابر با $v_g v_{ph} = c^2$ است که در آن c سرعت نور است.

حل:

$$k^2 c^2 = \omega^2 + \text{cte}$$

$$v_{ph}^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = c^2 - \frac{\text{cte}}{k^2}$$

$$v_{ph} = \sqrt{c^2 - \frac{cte}{k^2}}$$

$$v_g = v_{ph} + k \frac{dv_{ph}}{dk} = v_{ph} + k \frac{\frac{-cte}{k^3}}{\frac{-2cte}{k^3 \sqrt{c^2 - \frac{cte}{k^2}}}} = v_{ph} + \frac{cte}{k^2 v_{ph}} = \frac{k^2 v_{ph} + cte}{k^2 v_{ph}}$$

پس:

$$v_g v_{ph} = v_{ph} \times \frac{k^2 \left(c^2 - \frac{cte}{k^2} \right) + cte}{k^2 v_{ph}} = \frac{k^2 c^2}{k^2} = c^2$$

تمرین ۴۸-۱

چقدر طول می‌کشد تا اندازه‌ی بسته موج یک جسم ۱۰ گرمی، که در ابتدا در بازه‌ی ۱mm محدود است، چهار برابر شود؟

حل:

$$\Delta x(t) = \Delta x_0 \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 (\Delta x_0)^2}}$$

$$t = \frac{2m\Delta x_0}{\hbar} \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta x_0} \right)^2 - 1}$$

$$t = \frac{2 \times 10 \times 10^{-3} \times (10^{-2})^2}{1.055 \times 10^{-27}} \sqrt{4^2 - 1} = 7/1 \times 10^{26} s \approx 225 \times 10^{17} \text{ سال}$$

تمرین ۴۹-۱

چقدر طول خواهد کشید تا یک بسته موج از پروتون‌های محدود در 10^{-15} m به اندازه‌ای برابر با فاصله‌ی بین زمین و خورشید رشد کند؟ این فاصله برابر با $1/5 \times 10^8 \text{ km}$ برابر است.

حل:

$$t = \frac{2 \times 1/673 \times 10^{27} (10^{-15})^2}{1.055 \times 10^{-27}} \sqrt{\left(\frac{1/5 \times 10^8 \times 10^3}{10^{-15}} \right)^2 - 1}$$

$$t = \frac{2 \times 1/673 \times 10^{27} (10^{-15})^2}{1.055} \times 10^3 s \approx 47575$$

تمرین ۵-۱

با فرض این که بستی موج نشان‌دهنده‌ی ماه به ۱m محدود شود، چه مدت طول خواهد کشید تا اندازه‌ی آن به سه برابر اندازه‌ی [بسته] خورشید برسد؟ شعاع خورشید $6/96 \times 10^5$ km است.

حل:

$$t = \frac{2 \times 73/6 \times 10^{22} \times 1}{1/0.55 \times 10^{-24}} \times 6 \times 6/96 \times 10^5 \times 10^3 = 5/83 \times 10^{64} \text{ s}$$

اندازه‌ی بستی موج خورشید درواقع برابر با قطر آن منظور شده است.

فصل دوم

ابزارهای ریاضی مکانیک کوانتومی

تمرین ۱-۲

دو حالت $|\psi\rangle = i|\phi_1\rangle + 3i|\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle$ و $|\chi\rangle = |\phi_1\rangle - i|\phi_2\rangle + 5i|\phi_3\rangle$ را در نظر بگیرید، که در آن $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ متعامد-بهنجار هستند.

(آ) $\langle\psi|\psi\rangle, \langle\chi|\chi\rangle, \langle\psi|\chi\rangle$ و $\langle\chi|\psi\rangle$ را محاسبه کنید و $\langle\psi+\chi|\psi+\chi\rangle$ را نتیجه بگیرید. آیا ضرب‌های نرده‌ای $\langle\chi|\psi\rangle, \langle\psi|\chi\rangle$ با هم برابرند؟

(ب) $|\chi\rangle\langle\psi|$ و $|\psi\rangle\langle\chi|$ را حساب کنید. آیا با هم برابرند؟ رد آن‌ها را محاسبه و با هم مقایسه کنید.

(پ) مزدوج‌های هرمیتی $|\psi\rangle, |\chi\rangle, |\chi\rangle\langle\psi|$ و $|\psi\rangle\langle\chi|$ را بیابید.

حل:

(آ)

$$\langle\psi|\psi\rangle = (-i\langle\phi_1| - 3i\langle\phi_2| - \langle\phi_3|)(i|\phi_1\rangle + 3i|\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle) = -ii - 3i(3i) - (-1) = 1 + 9 + 1 = 11$$

$$\langle\chi|\chi\rangle = 1^2 + |-i|^2 + |5i|^2 = 1 + 1 + 25 = 27$$

$$\langle\psi|\chi\rangle = (-i\langle\phi_1| - 3i\langle\phi_2| - \langle\phi_3|)(|\phi_1\rangle - i|\phi_2\rangle + 5i|\phi_3\rangle) = -i \times 1 - 3i(-i) - 5i(-1) = -3 - 6i$$

$$\langle\chi|\psi\rangle = (\langle\phi_1| + i\langle\phi_2| - 5i\langle\phi_3|)(i|\phi_1\rangle + 3i|\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle) = i + i(3i) - 5i(-1) = -3 + 6i$$

$$\begin{aligned} \langle\psi+\chi|\psi+\chi\rangle &= [(-i+1)\langle\phi_1| - 2i\langle\phi_2| + (-1-5i)\langle\phi_3|][i(i+1)|\phi_1\rangle + 2i|\phi_2\rangle + (-1+5i)|\phi_3\rangle] \\ &= (-i+1)(i+1) - 2i(2i) + (-1-5i)(-1+5i) = 25 - 15i \end{aligned}$$

ملاحظه می شود که:

$$\langle \psi | \chi \rangle = \langle \chi | \psi \rangle^*$$

(ب)

$$\begin{aligned} |\psi\rangle\langle\chi| &= (i|\phi_1\rangle + 3i|\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle)(\langle\phi_1| + i\langle\phi_2| - 5i\langle\phi_3|) = i|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_1\rangle\langle\phi_2| + 5|\phi_1\rangle\langle\phi_3| \\ &\quad + 3i|\phi_2\rangle\langle\phi_1| - 3|\phi_2\rangle\langle\phi_2| + 15|\phi_2\rangle\langle\phi_3| - |\phi_3\rangle\langle\phi_1| - i|\phi_3\rangle\langle\phi_2| + 5i|\phi_3\rangle\langle\phi_3| \\ |\chi\rangle\langle\psi| &= (|\phi_1\rangle - i|\phi_2\rangle + 5i|\phi_3\rangle)(-i\langle\phi_1| - 3i\langle\phi_2| - \langle\phi_3|) \\ &= -i|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - 3i|\phi_1\rangle\langle\phi_2| - |\phi_1\rangle\langle\phi_3| - |\phi_2\rangle\langle\phi_1| - 3|\phi_2\rangle\langle\phi_2| + i|\phi_2\rangle\langle\phi_3| + 5|\phi_3\rangle\langle\phi_1| \\ &\quad + 15|\phi_3\rangle\langle\phi_2| - 5i|\phi_3\rangle\langle\phi_3| \end{aligned}$$

ملاحظه می شود که:

$$|\psi\rangle\langle\chi| \neq |\chi\rangle\langle\psi|$$

$$Tr(|\psi\rangle\langle\chi|) = \sum_n \langle\phi_n|\psi\rangle\langle\chi|\phi_n\rangle = \langle\phi_1|\psi\rangle\langle\chi|\phi_1\rangle + \langle\phi_2|\psi\rangle\langle\chi|\phi_2\rangle + \langle\phi_3|\psi\rangle\langle\chi|\phi_3\rangle$$

برای ادامدی کار از خاصیت راست هنجار بودن $|\phi_n\rangle$ ها استفاده می کنیم؛ یعنی:

$$\langle\phi_n|\phi_m\rangle = \delta_{mn}$$

با توجه به این رابطه داریم:

$$Tr(|\psi\rangle\langle\chi|) = i\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle - 3\langle\phi_2|\phi_2\rangle\langle\phi_2|\phi_2\rangle + 5i\langle\phi_3|\phi_3\rangle\langle\phi_3|\phi_3\rangle = -3 + 5i$$

$$\begin{aligned} Tr(|\chi\rangle\langle\psi|) &= \langle\phi_1|\chi\rangle\langle\psi|\phi_1\rangle + \langle\phi_2|\chi\rangle\langle\psi|\phi_2\rangle + \langle\phi_3|\chi\rangle\langle\psi|\phi_3\rangle = -i\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle \\ &\quad - 3\langle\phi_2|\phi_2\rangle\langle\phi_2|\phi_2\rangle - 5i\langle\phi_3|\phi_3\rangle\langle\phi_3|\phi_3\rangle = -3 - 5i \end{aligned}$$

(پ)

برای بدست آوردن مزدوج هرمیتی، کت ها را با براها و براها را با کت ها جایگزین می کنیم:

$$|\psi\rangle^\dagger = \langle\psi| = -i\langle\phi_1| - 3i\langle\phi_2| - \langle\phi_3|$$

$$|\chi\rangle^\dagger = \langle\chi| = \langle\phi_1| + i\langle\phi_2| - 5i\langle\phi_3|$$

$$\begin{aligned} (|\psi\rangle\langle\chi|)^\dagger &= |\chi\rangle\langle\psi| = -i|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - 3i|\phi_1\rangle\langle\phi_2| - |\phi_1\rangle\langle\phi_3| - |\phi_2\rangle\langle\phi_1| - 3|\phi_2\rangle\langle\phi_2| + i|\phi_2\rangle\langle\phi_3| \\ &\quad + 5|\phi_3\rangle\langle\phi_1| + 15|\phi_3\rangle\langle\phi_2| - 5i|\phi_3\rangle\langle\phi_3| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (|\chi\rangle\langle\psi|)^\dagger &= |\psi\rangle\langle\chi| = i|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_1\rangle\langle\phi_2| + 5|\phi_1\rangle\langle\phi_3| + 3i|\phi_2\rangle\langle\phi_1| - 3|\phi_2\rangle\langle\phi_2| + 15|\phi_2\rangle\langle\phi_3| \\ &\quad - |\phi_3\rangle\langle\phi_1| - i|\phi_3\rangle\langle\phi_2| + 5i|\phi_3\rangle\langle\phi_3| \end{aligned}$$

تمرین ۲-۲

دو حالت $|\psi_1\rangle = |\phi_1\rangle + 4i|\phi_2\rangle + 5|\phi_3\rangle$ و $|\psi_2\rangle = b|\phi_1\rangle + 4|\phi_2\rangle + 3i|\phi_3\rangle$ را در نظر بگیرید که در آن $|\psi_1\rangle$ و $|\psi_2\rangle$ کت‌های متعامد - بهنجار هستند و b یک ثابت است. مقدار b را تعیین کنید.

حل:

شرط متعامد بودن $|\psi_1\rangle$ و $|\psi_2\rangle$ آن است که:

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = 0.$$

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = b(1) + 4(-4i) - 3i(5) = b - 31i = 0.$$

که نتیجه می‌دهد:

$$b = 31i$$

تمرین ۳-۲

اگر $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle$ و $|\phi_3\rangle$ متعامد بهنجار باشند، نشان دهید که حالت‌های $|\psi\rangle = i|\phi_1\rangle + 3i|\phi_2\rangle - |\phi_3\rangle$ و $|\chi\rangle = |\phi_1\rangle - i|\phi_2\rangle + 5i|\phi_3\rangle$ موارد زیر را برآورد می‌کنند:

(آ) نامساوی مثلثاتی

(ب) نامساوی شوارتز

حل:

(آ)

$$|\psi + \chi\rangle = (i+1)|\phi_1\rangle + 3i|\phi_2\rangle + (-1+5i)|\phi_3\rangle$$

$$\langle \psi + \chi | \psi + \chi \rangle = |i+1|^2 + |3i|^2 + |-1+5i|^2 = (1^2 + 1^2) + 3^2 + ((-1)^2 + 5^2) = 32$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = |i|^2 + |3i|^2 + |-1|^2 = 1 + 9 + 1 = 11$$

$$\langle \chi | \chi \rangle = |1|^2 + |-i|^2 + |5i|^2 = 1 + 1 + 25 = 27$$

$$\sqrt{\langle \psi + \chi | \psi + \chi \rangle} = \sqrt{32} \leq \sqrt{11} + \sqrt{27} = \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} + \sqrt{\langle \chi | \chi \rangle}$$

پس نامساوی مثلثی برقرار است.

(ب)

$$\langle \psi | \chi \rangle = (-i\langle \phi_1 | - 3i\langle \phi_2 | - \langle \phi_3 |)(|\phi_1\rangle - i|\phi_2\rangle + 5i|\phi_3\rangle) = -(i)(1) + (-3i)(-i) + (-1)(5i)$$

$$= -3 - 8i$$

$$|\langle \psi | \chi \rangle|^2 = (-2)^2 + (-1)^2 = 5 < 11 \times 27 = \langle \psi | \psi \rangle \langle \chi | \chi \rangle$$

بنابراین نامساوی شوارتز نیز برقرار است.

تمرین ۲-۴

ثابت α را طوری بیابید که حالت‌های $|\psi\rangle = \alpha|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle$ و $|x\rangle = 3\alpha|\phi_1\rangle - 4|\phi_2\rangle$ متعامد باشند.

$|\phi_1\rangle$ و $|\phi_2\rangle$ را متعامد - بهنجار در نظر بگیرید.

حل:

شرط تعامد آن است که:

$$\langle x | \psi \rangle = 0$$

حال باید مقدار α را طوری بیابیم که این الزام برقرار شود. پس:

$$\langle x | \psi \rangle = (3\alpha^* \langle \phi_1 | - 4 \langle \phi_2 |)(\alpha |\phi_1\rangle + 5 |\phi_2\rangle) = 3\alpha^* \alpha - 4 \times 5 = 3|\alpha|^2 - 20 = 0$$

$$|\alpha|^2 = \frac{20}{3}$$

$$\alpha = |\alpha| e^{i\delta} = \sqrt{\frac{20}{3}} e^{i\delta}$$

در اینجا δ هر مقدار حقیقی را می‌تواند داشته باشد و بنابراین α مقدار منحصر به فردی ندارد.

تمرین ۲-۵

اگر $|\psi\rangle = |\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle$ و $|x\rangle = |\phi_1\rangle - |\phi_2\rangle$ آنگاه روابط زیر را ثابت کنید (توجه کنید که $|\phi_1\rangle$ و $|\phi_2\rangle$ متعامد - بهنجار نیستند)

$$(A) \quad \langle \psi | \psi \rangle + \langle x | x \rangle = 2 \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle + 2 \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle$$

$$(B) \quad \langle \psi | \psi \rangle - \langle x | x \rangle = 2 \langle \phi_1 | \phi_2 \rangle + 2 \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle$$

حل:

(A)

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle + \langle x | x \rangle &= (\langle \phi_1 | + \langle \phi_2 |)(|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) + (\langle \phi_1 | - \langle \phi_2 |)(|\phi_1\rangle - |\phi_2\rangle) \\ &= \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 | \phi_2 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle + \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle - \langle \phi_1 | \phi_2 \rangle - \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle \\ &= 2 \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle + 2 \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle \end{aligned}$$

(B)

$$\langle \psi | \psi \rangle - \langle x | x \rangle = (\langle \phi_1 | + \langle \phi_2 |)(|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) - (\langle \phi_1 | - \langle \phi_2 |)(|\phi_1\rangle - |\phi_2\rangle)$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 | \phi_2 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle - \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 | \phi_2 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle - \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle \\
 &= 2\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle + 2\langle \phi_2 | \phi_1 \rangle
 \end{aligned}$$

تمرین ۲-۶

حالتی را در نظر بگیرید که برحسب سه بردار متعامد - بهنجار $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ به صورت زیر است:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{15}}|\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}|\phi_3\rangle$$

و در آن $|\phi_n\rangle$ ها ویژه حالت های عملگر $\hat{B}$ هستند به طوری که: $\hat{B}|\phi_n\rangle = (2n^2 - 1)|\phi_n\rangle$ و

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

(آ) اندازه ی حالت $|\psi\rangle$ را بیابید.

(ب) مقدار انتظاری $\hat{B}$ را برای حالت $|\psi\rangle$ بیابید.

(پ) مقدار انتظاری $\hat{B}^2$ را برای حالت $|\psi\rangle$ بیابید.

حل:

(آ)

$$\langle \psi | \psi \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{15}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{1}{15} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{1+5+3}{15} = \frac{9}{15}$$

(ب)

برای یافتن مقدار انتظاری عملگر $\hat{B}$ با استفاده از حالت $|\psi\rangle$ ، ابتدا اثر $\hat{B}$ را بر $|\psi\rangle$ می یابیم:

$$\hat{B}|\psi\rangle = \hat{B} \left(\frac{1}{\sqrt{15}}|\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}|\phi_3\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{15}}\hat{B}|\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}\hat{B}|\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}\hat{B}|\phi_3\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{15}}(2(1)^2 - 1)|\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}(2(2)^2 - 1)|\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}}(2(3)^2 - 1)|\phi_3\rangle = \frac{2}{\sqrt{15}}|\phi_1\rangle + \frac{11}{\sqrt{3}}|\phi_2\rangle + \frac{26}{\sqrt{5}}|\phi_3\rangle$$

و از اینجا نتیجه می شود که:

$$\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{15}} \frac{2}{\sqrt{15}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{11}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{26}{\sqrt{5}} = \frac{2}{15} + \frac{11}{3} + \frac{26}{5} = \frac{2+55+78}{15} = \frac{135}{15} = 9$$

و به دلیل اینکه $|\psi\rangle$ بهنجار نیست بنابراین:

$$\langle \hat{B} \rangle_\psi = \frac{\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \frac{9}{\frac{9}{15}} = 15$$

(پ)

$$\langle \psi | \hat{B}^2 | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{B} \hat{B} | \psi \rangle$$

با فرض اینکه $|\phi\rangle = \hat{B}|\psi\rangle$ ، لذا:

$$\langle\psi|\hat{B}^2|\psi\rangle = \langle\phi|\phi\rangle = \left(\frac{2}{\sqrt{15}}\right)^2 + \left(\frac{11}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{26}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{4}{15} + \frac{121}{3} + \frac{676}{5} = \frac{2637}{15}$$

$$\langle B^2 \rangle_\psi = \frac{\langle\psi|\hat{B}^2|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} = \frac{\frac{2637}{15}}{\frac{9}{15}} = 293$$

تمرین ۲-۷

آیا مجموعه‌های توابع زیر مستقل خطی‌اند یا وابسته‌ی خطی؟

(آ) $\Delta e^x, e^x, 4e^x$

(ب) $3\sin x, e^{ix}, \cos x$

(پ) $e^{-x}, 9x^2, x^2, 7$

حل:
(آ)

$$4e^x = (\Delta e^x) - (e^x)$$

پس e^x و Δe^x وابسته‌ی خطی هستند.
(ب)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x = \cos x + \frac{i}{3}(3 \sin x)$$

یعنی e^{ix} ، $\cos x$ و $3 \sin x$ وابسته‌ی خطی هستند.
(پ)

ترکیب خطی دلخواهی از مجموعه توابع داده شده را در نظر گرفته و آن را مساوی صفر قرار می‌دهیم:

$$a_1(7) + a_2(x^2) + a_3(9x^2) + a_4(e^{-x}) = 0$$

برای اینکه تساوی فوق همواره برقرار باشد لازم است که:

$$a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$$

و این یعنی اینکه مجموعه توابع داده شده مستقل خطی هستند.

تمرین ۲-۸

مجموعه توابع زیر در جهت مثبت محور x مستقل خطی‌اند یا وابسته‌ی خطی؟

$$(A) \quad x, x+2, x+5$$

$$(B) \quad \cos x, \cos^2 x, \cos^3 x$$

$$(P) \quad \sin^2 x, \cos^2 x, \sin^2 x$$

$$(T) \quad x, (x-1)^2, (x+1)^2$$

$$(Th) \quad 1, \cosh^2 x, \sinh^2 x$$

حل:

(A)

$$x = \frac{5}{3}(x+2) - \frac{2}{3}(x+5)$$

پس مجموعه‌ی داده شده وابسته‌ی خطی هستند.

(B)

$$a \cos x + b \cos^2 x + c \cos^3 x = 0$$

با فرض اینکه رابطه‌ی فوق همواره و بد ازای همه‌ی مقادیر مثبت x برقرار است؛ به x مقادیر ۰،

$\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{4}$ را می‌دهیم:

$$a + b + c = 0$$

$$a \frac{\sqrt{2}}{2} + b \times 0 - c \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

$$a \times 0 + b \times (-1) + c \times 0 = 0$$

از حل معادلات فوق نتیجه می‌شود که $a = b = c = 0$ و بنابراین مجموعه‌ی داده شده مستقل خطی است.

(P)

$$a \sin^2 x + b \cos^2 x + c \sin^2 x = 0$$

با فرض اینکه رابطه‌ی فوق همواره و بد ازای همه‌ی مقادیر مثبت x برقرار است؛ به x مقادیر ۰،

$\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{4}$ را می‌دهیم:

$$b = 0$$

$$\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + c = 0$$

$$a = 0$$

پس $a = b = c = 0$ و لذا مجموعه‌ی داده شده مستقل خطی است.

(ت)

$$\frac{1}{4}(x+1)^2 - \frac{1}{4}(x-1)^2 = x$$

یعنی مجموعه‌ی داده شده وابسته‌ی خطی است. زیرا x را برحسب $(x+1)^2$ و $(x-1)^2$ می‌توان بسط داد.

(ث)

$$\cos h^2 x - \sin h^2 x = 1$$

پس این مجموعه نیز وابسته‌ی خطی هستند.

تمرین ۹-۲

مجموعه بردارهای زیر در فضای مختلط به طور خطی، مستقل‌اند یا وابسته؟

$$(2i, i, -i), (0, 0, 1), (2, -3, 0) \quad (\bar{A})$$

$$(2, 0, 1), (i, -3i, i), (0, 4, 0) \quad (\bar{B})$$

$$(-i, 3i, 5i), (3, i, -1), (i, 1, 2) \quad (\bar{C})$$

حل:

(\bar{A})

$$a(2, -3, 0) + b(0, 0, 1) + c(2i, i, -i) = 0$$

$$(2a + 2ic, -3a + ic, b - ic) = (0, 0, 0)$$

رابطه‌ی اخیر در صورتی برقرار است که:

$$2a + 2ic = 0$$

$$-3a + ic = 0$$

$$b - ic = 0$$

از حل این معادلات نتیجه می‌شود که:

$$a = b = c = 0$$

پس مجموعه بردارهای داده شده مستقل خطی هستند.

(ب)

$$a(0, 4, 0) + b(i, -3i, i) + c(2, 0, 1) = 0$$

$$(ib + 2c, 4a - 3ib, ib + c) = (0, 0, 0)$$

رابطه‌ی اخیر در صورتی برقرار خواهد شد که:

$$a = b = c = 0$$

پس مجموعه داده شده مستقل خطی هستند.

(پ)

$$a(i, 1, 2) + b(2, i, -1) + c(-i, 2i, 5i) = 0$$

$$ia + 2b - ic = 0$$

$$a + ib + 2ic = 0$$

$$2a - b + 5ic = 0$$

چون $a = b = c = 0$ پس مجموعه بردارهای داده شده مستقل خطی هستند.

تمرین ۲-۱۰

مجموعه بردارهای زیر (در فضای اقلیدسی سه بعدی) مستقل خطی اند یا وابسته خطی؟

$$(A) ((7, 8, 9), (1, 2, 3), (4, 5, 6))$$

$$(B) ((0, 0, \sqrt{7}), (0, -5, 0), (1, 0, 0))$$

$$(P) ((0, 6, -1), (2, 0, -2), (5, 4, 1))$$

حل:

(A)

$$a(7\vec{i} + 8\vec{j} + 9\vec{k}) + b(\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + c(4\vec{i} + 5\vec{j} + 6\vec{k}) = 0$$

$$(7a + b + 4c)\vec{i} + (8a + 2b + 5c)\vec{j} + (9a + 3b + 6c)\vec{k} = 0$$

در نتیجه:

$$7a + b + 4c = 0$$

$$8a + 2b + 5c = 0$$

$$9a + 3b + 6c = 0$$

از حل این معادلات نتیجه می شود که:

$$\frac{-a}{2} = b = c$$

به ازای همگی مقادیر، c جوابی برای دستگاه معادلات اخیر می باشد و بنابراین مجموعه بردارهای داده شده وابسته خطی هستند. برای نمونه می توان نوشت:

$$\frac{1}{2}[(1, 2, 3) + (7, 8, 9)] = (4, 5, 6)$$

(ب)

$$a(\vec{i}) + b(-\delta\vec{j}) + c(\sqrt{7}\vec{k}) = 0.$$

$$a = 0.$$

$$-\delta b = 0.$$

$$c\sqrt{7} = 0.$$

در نتیجه چون $a = b = c = 0$ لذا مجموعه بردارهای داده شده مستقل خطی هستند.

(پ)

$$a(\delta\vec{i} + \epsilon\vec{j} + \vec{k}) + b(2\vec{i} - 2\vec{k}) + c(6\vec{j} - \vec{k}) = 0.$$

$$\delta a + 2b = 0.$$

$$\epsilon a + 6c = 0.$$

$$a - 2b - c = 0.$$

چون $a = b = c = 0$ پس مجموعه بردارهای داده شده مستقل خطی هستند.

تمرین ۲-۱۱

نشان دهید که اگر $\hat{A}$ یک عملگر تصویری باشد، $1 - \hat{A}$ نیز یک عملگر تصویری است.

حل:

عملگر $\hat{P}$ را یک عملگر تصویر گویند هرگاه هرمیتی باشد و $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$.

$$(1 - \hat{A})^\dagger = 1 - \hat{A}^\dagger = 1 - \hat{A}$$

پس $(1 - \hat{A})$ هرمیتی است. از طرفی:

$$(1 - \hat{A})(1 - \hat{A}) = 1 - 2\hat{A} + \hat{A}^2$$

اما چون $\hat{A}$ خود یک عملگر تصویری است، پس:

$$\hat{A}^2 = \hat{A}$$

و بنابراین:

$$(1 - \hat{A})(1 - \hat{A}) = 1 - 2\hat{A} + \hat{A} = 1 - \hat{A}$$

بنابراین $1 - \hat{A}$ یک عملگر تصویری است.

تمرین ۲-۱۲

نشان دهید $\langle \psi | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$ بدون توجه به اینکه $|\psi\rangle$ بهنجار باشد یا نه، یک عملگر تصویری است.

حل:

$$A = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\langle\psi|\psi\rangle}$$

$$A^\dagger = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\langle\psi|\psi\rangle} = A$$

$$A^T = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\langle\psi|\psi\rangle} = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\langle\psi|\psi\rangle} = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\langle\psi|\psi\rangle} = A$$

بنابراین A هم هرمیتی است و هم مربع آن با خودش برابر است و لذا یک عملگر تصویر می‌باشد.

تمرین ۲-۱۳

در عبارت‌های زیر که $\hat{A}$ یک عملگر است، طبیعت هر عبارت را مشخص کنید (یعنی مشخص کنید که این عملگرها برا، یا کت هستند؛ سپس مزدوج هرمیتی آنها را بیابید.

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle \langle \psi | \quad (\bar{A})$$

$$\hat{A} | \psi \rangle \langle \psi | \quad (\bar{A})$$

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle | \psi \rangle \langle \phi | \hat{A} \quad (\bar{A})$$

$$| \psi \rangle \langle \phi | \hat{A} | \phi \rangle + i \hat{A} | \psi \rangle \quad (\bar{A})$$

$$\langle \phi | \langle \phi | \hat{A} - i(\hat{A} | \psi \rangle \langle \psi | \quad (\bar{A})$$

حل:

(آ)

$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle$ یک اسکالر است و $|\psi\rangle$ یک برا است و چون حاصل ضرب یک اسکالر در یک برا، یک برا می‌شود پس $\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle \langle \psi |$ یک برا است و مزدوج هرمیتی: $\langle \psi | \hat{A}^\dagger | \phi \rangle$ (ب)

$$\hat{A} | \psi \rangle \langle \phi | = \hat{A} \hat{B}$$

در اینجا $\hat{B} = | \psi \rangle \langle \phi |$ و چون $\hat{A} \hat{B}$ یک عملگر است پس $\hat{A} | \psi \rangle \langle \phi |$ نیز یک عملگر می‌باشد و مزدوج هرمیتی آن $\hat{A}^\dagger | \phi \rangle \langle \psi |$ است.

(ب)

$$\langle \phi | A | \psi \rangle | \psi \rangle \langle \phi | \hat{A} = c \hat{B} \hat{A} = c \hat{C} = \hat{D}$$

در اینجا $c = \langle \phi | A | \psi \rangle$ یک اسکالر است و $\hat{B} = |\psi\rangle\langle\phi|$ یک عملگر می باشد. در نتیجه $\hat{C} = \hat{B} \hat{A}$ یک عملگر است و لذا $\hat{D} = \langle \phi | A | \psi \rangle | \psi \rangle \langle \phi | A$ نیز یک عملگر خواهد بود.

$$\hat{D}^\dagger = A^\dagger \langle \phi | \langle \psi | \langle \psi | A^\dagger | \phi \rangle$$

(ت)

$$\langle \psi | \hat{A} | \phi \rangle | \phi \rangle + i \hat{A} | \psi \rangle \langle \phi | \langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle - i \langle \psi | A^\dagger$$

$\langle \psi | \hat{A} | \phi \rangle$ یک اسکالر است. پس $\langle \psi | \hat{A} | \phi \rangle | \phi \rangle$ یک کت است و چون $i \hat{A} | \psi \rangle$ نیز یک کت می باشد پس در کل، این عبارت یک کت خواهد بود.

(ث)

$$| \phi \rangle \langle \phi | \hat{A} - i \hat{A} | \psi \rangle \langle \psi | = \text{عملگر} - \text{عملگر} = \text{عملگر}$$

$$A^\dagger | \phi \rangle \langle \phi | + i | \psi \rangle \langle \psi | A^\dagger : \text{مزدوج هرمیتی}$$

تمرین ۲-۱۴

یک فضای دوبعدی را در نظر بگیرید که در آن عملگر هرمیتی $\hat{A}$ با $\hat{A} | \phi_1 \rangle = | \phi_1 \rangle$ و $\hat{A} | \phi_2 \rangle = - | \phi_2 \rangle$ تعریف می شود، و $| \phi_1 \rangle$ و $| \phi_2 \rangle$ متعامد - بهنجارند.

(آ) آیا حالت های $| \phi_1 \rangle$ و $| \phi_2 \rangle$ یک پایه تشکیل می دهند؟

(ب) عملگر $\hat{B} = | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 |$ را در نظر بگیرید. آیا $\hat{B}$ هرمیتی است؟ نشان دهید که $\hat{B}^\dagger = 0$ است.

(پ) نشان دهید که حاصل ضرب های $\hat{B}^\dagger \hat{B}$ و $\hat{B} \hat{B}^\dagger$ عملگرهای تصویری هستند.

(ت) نشان دهید که عملگر $\hat{B} \hat{B}^\dagger - \hat{B}^\dagger \hat{B}$ یکانی است.

(ث) $\hat{C} = \hat{B} \hat{B}^\dagger + \hat{B}^\dagger \hat{B}$ را در نظر بگیرید. نشان دهید که $\hat{C} | \phi_1 \rangle = | \phi_1 \rangle$ و $\hat{C} | \phi_2 \rangle = | \phi_2 \rangle$.

حل:

(آ)

$| \phi_1 \rangle$ و $| \phi_2 \rangle$ تشکیل یک پایه می دهند زیرا ویژه حالت های یک عملگر هرمیتی هستند و طبق قضیه، ویژه حالت های یک عملگر هرمیتی تشکیل یک پایه را می دهند.

(ب)

$$\hat{B} = | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | = \begin{pmatrix} \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle & \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle \\ \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle & \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{B}^\dagger = (\hat{B}^T)^* = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix} \neq \hat{B}$$

پس $\hat{B}$ هرمیتی نیست.

$$B^\tau = |\phi_l\rangle\langle\phi_r|\phi_l\rangle\langle\phi_r| = 0.$$

(ب)

$$BB^\dagger = |\phi_l\rangle\langle\phi_l|\phi_l\rangle\langle\phi_l| = |\phi_l\rangle\langle\phi_l|$$

$$(BB^\dagger)^\tau = BB^\dagger BB^\dagger = |\phi_l\rangle\langle\phi_l|\phi_l\rangle\langle\phi_l| = |\phi_l\rangle\langle\phi_l| = BB^\dagger$$

پس چون $BB^\dagger$ هرمیتی است و $(BB^\dagger)^\tau = BB^\dagger$ بنابراین $BB^\dagger$ یک عملگر تصویر است.

$$B^\dagger B = |\phi_r\rangle\langle\phi_l|\phi_l\rangle\langle\phi_r| = |\phi_r\rangle\langle\phi_r|$$

پس به همین ترتیب $B^\dagger B$ نیز یک عملگر تصویر است.

(ت)

$$\hat{D} \equiv BB^\dagger - B^\dagger B = |\phi_l\rangle\langle\phi_l| - |\phi_r\rangle\langle\phi_r|$$

$$D^\dagger = |\phi_l\rangle\langle\phi_l| - |\phi_r\rangle\langle\phi_r|$$

$$\begin{aligned} DD^\dagger &= |\phi_l\rangle\langle\phi_l|\phi_l\rangle\langle\phi_l| - |\phi_l\rangle\langle\phi_l|\phi_r\rangle\langle\phi_r| - |\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_l\rangle\langle\phi_l| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_r| \\ &= |\phi_l\rangle\langle\phi_l| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| = I \end{aligned}$$

پس: $\hat{D} = BB^\dagger - B^\dagger B$ یک عملگر یکانی است.

(ث)

$$\hat{C}|\phi_l\rangle = (|\phi_l\rangle\langle\phi_l| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r|)|\phi_l\rangle = |\phi_l\rangle\langle\phi_l|\phi_l\rangle + |\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_l\rangle = |\phi_l\rangle$$

و به همین ترتیب برای ϕ_r .

تمرین ۲-۱۵

دو رابطه‌ی زیر را ثابت کنید:

$$e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}} e^{[\hat{A}, \hat{B}]/2} \quad (\bar{I})$$

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{3!} [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots \quad (\text{ب})$$

راهنمایی: برای اثبات رابطه‌ی اول، می‌توان تابع عملگری $\hat{F}(t) = e^{\hat{A}t} e^{\hat{B}t}$ را تعریف کرد که در آن t

یک متغیر و $\hat{A}$ و $\hat{B}$ عملگرهایی مستقل از t هستند، و سپس از $dG(\hat{B})/d\hat{B}$ $[\hat{A}, G(\hat{B})] = [\hat{A}, \hat{B}]$

استفاده نمود که در آن $G(\hat{B})$ تابعی از عملگر $\hat{B}$ است.

حل:
(آ)

با در نظر گرفتن $T(\varepsilon) := e^{\varepsilon A} e^{\varepsilon B}$ و با مشتق گرفتن نسبت به ε داریم:

$$\begin{aligned}\frac{dT}{d\varepsilon} &= A e^{\varepsilon A} e^{\varepsilon B} + e^{\varepsilon A} B e^{\varepsilon B} \\ &= (A + e^{\varepsilon A} B e^{-\varepsilon A}) T(\varepsilon)\end{aligned}$$

می دانیم:

$$[[A, B], A] = 0, \quad [[A, B], B] = 0.$$

در نتیجه:

$$e^{\varepsilon A} B e^{-\varepsilon A} = B - [B, A] \varepsilon$$

بنابراین:

$$\frac{dT}{d\varepsilon} = (A + B + [A, B] \varepsilon) T(\varepsilon) \quad (۱)$$

با توجه به شرط $T(\varepsilon=0)=1$ و به علت اینکه عملگرهای $A+B$ و $[A, B]$ جابجا می شوند، می توان از معادله (۱) انتگرال گرفت که نتیجه می دهد:

$$T(\varepsilon) = e^{\varepsilon(A+B)} e^{\frac{1}{2} \varepsilon^2 [A, B]}$$

با جایگذاری $\varepsilon=1$ رابطه ی زیر به دست می آید:

$$e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}} e^{\frac{1}{2} [A, B]}$$

(ب) با در نظر گرفتن:

$$f(\varepsilon) = e^{\varepsilon A} B e^{-\varepsilon A}$$

و با مشتق گرفتن نسبت به ε می توان نوشت:

$$\begin{aligned}\frac{df}{d\varepsilon} &= A e^{\varepsilon A} B e^{-\varepsilon A} - e^{\varepsilon A} B e^{-\varepsilon A} A \\ &= [A, f(\varepsilon)]\end{aligned}$$

$$\frac{d^2 f}{d\varepsilon^2} = \left[A, \frac{df}{d\varepsilon} \right] = [A, [A, f(\varepsilon)]]$$

با نوشتن بسط تیلور

$$f(\varepsilon) = f(0) + \frac{1}{1!} \frac{df(0)}{d\varepsilon} + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(0)}{d\varepsilon^2} + \dots$$

و جایگذاری روابط به دست آمده به جای مشتق ها می توان نوشت:

$$e^{\hat{A}} B e^{-\hat{A}} = B + [A, B] + \frac{1}{2!} [A, [A, B]] + \frac{1}{3!} [A, [A, [A, B]]] + \dots$$

تمرین ۲-۱۶

(آ) ثابت کنید که ماتریس زیر، یکه است

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

(ب) ویژه مقادیر و ویژه بردارهای متناظر آن را بیابید.

حل:

(آ)

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = (A^T)^* = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AA^\dagger &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta + \cos \theta \sin \theta \\ -\cos \theta \sin \theta + \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \end{aligned}$$

پس A یونیتاری (یکانی) است.

(ب)

معادله‌ی ویژه مقدراری عبارتست از:

$$A|a\rangle = a|a\rangle$$

$$(A - aI)|a\rangle = 0$$

برای اینکه $|a\rangle$ غیر صفر باشد لازم است که:

$$\det(A - aI) = 0$$

پس:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \cos \theta - a & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta - a \end{vmatrix} &= (\cos \theta - a)^2 + \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - 2a \cos \theta + a^2 + \sin^2 \theta \\ &= a^2 - 2a \cos \theta + 1 = 0 \end{aligned}$$

از حل این معادله نتیجه می‌شود که:

$$a = \cos \theta \pm \sqrt{\cos^2 \theta - 1} = \cos \theta \pm i \sin \theta$$

برای به دست آوردن ویژه بردارها، هر دو مقدار به دست آمده a را در معادله‌ی ویژه مقداری قرار می‌دهیم.

با انتخاب: $a_+ = \cos \theta + i \sin \theta$ و $a_- = \cos \theta - i \sin \theta$ داریم:

$$A|a_+\rangle = a_+|a_+\rangle$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (\cos \theta + i \sin \theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$x \cos \theta + y \sin \theta = x (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$y = ix$$

از آنجا که می‌خواهیم $|a_+\rangle$ بهنجار باشد؛ پس:

$$\langle a_+ | a_+ \rangle = 1$$

$$|x|^2 + |y|^2 = 1$$

$$|x|^2 + |x|^2 = 1$$

$$|x| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

در اینجا فرض کرده‌ایم که x مقداری حقیقی و مثبت باشد پس:

$$|a_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

به همین ترتیب می‌توان $|a_-\rangle$ را نیز به دست آورد. نتیجه عبارتست از:

$$|a_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

تمرین ۲-۱۷

سه ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(آ) جابه‌جاگرهای $[A, B]$, $[B, C]$ و $[C, A]$ را محاسبه کنید.

(ب) نشان دهید که $A^2 + B^2 + 2C^2 = 4I$ است که در آن I ماتریس یکه است.

(پ) ثابت کنید $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$

حل:

(آ)

با توجه به تعریف کلی:

$$[\hat{X}, \hat{Y}] = \hat{X}\hat{Y} - \hat{Y}\hat{X}$$

داریم:

$$[A, B] = \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & -i & \cdot \\ i & \cdot & -i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cdot & -i & \cdot \\ i & \cdot & -i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & \cdot & -i \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ i & \cdot & -i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} +i & \cdot & +i \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ -i & \cdot & -i \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2i & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -2i \end{pmatrix}$$

$$[B, C] = \begin{pmatrix} \cdot & -i & \cdot \\ i & \cdot & -i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & -i & \cdot \\ i & \cdot & -i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ i & \cdot & i \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & +i & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & +i & \cdot \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cdot & i & \cdot \\ i & \cdot & i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix}$$

$$[C, A] = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & -1 & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ -1 & \cdot & +1 \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ -1 & \cdot & 1 \\ \cdot & -1 & \cdot \end{pmatrix}$$

(ب)

$$A^T + B^T + 2C^T = \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & 1 & \cdot \\ 1 & \cdot & 1 \\ \cdot & 1 & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & -i & \cdot \\ i & \cdot & -i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & -i & \cdot \\ i & \cdot & -i \\ \cdot & i & \cdot \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4I$$

(پ)

$$ABC = \begin{pmatrix} i & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & i \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(ABC) = (ABC)_{11} + (ABC)_{22} + (ABC)_{33} = i + 0 + i = 2i$$

$$BCA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(BCA) = (BCA)_{11} + (BCA)_{22} + (BCA)_{33} = 0 + 2i + 0 = 2i$$

$$CAB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & i \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(CAB) = (CAB)_{11} + (CAB)_{22} + (CAB)_{33} = i + 0 + i = 2i$$

پس:

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB) = 2i$$

تمرین ۲-۱۸

دو ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & i & 1 \\ -1 & -i & 2 \\ 4 & 2i & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2i & 5 & -3 \\ -i & 3 & 0 \\ 7i & 1 & i \end{pmatrix}$$

روابط زیر را ثابت کنید:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \quad (\text{آ})$$

$$\det(A^T) = \det(A) \quad (\text{ب})$$

$$\det(A^\dagger) = (\det(A))^* \quad (\text{پ})$$

$$\det(A^*) = (\det(A))^* \quad (\text{ت})$$

حل:

با توجه به اینکه:

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & i & 1 \\ -1 & -i & 2 \\ 4 & 3i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2i & 5 & -3 \\ -i & 3 & 0 \\ 7i & 1 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13i+1 & 16+3i & -9+i \\ 12i-1 & -3-3i & 3+2i \\ 15i+3 & 21+9i & -12+i \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ i & -i & 3i \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A^\dagger = (A^T)^* = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ -i & i & -3i \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

خواننده می‌تواند به راحتی با محاسباتی سراسر درست‌ی روابط خواسته شده را تحقیق کند.

تمرین ۲-۱۹

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) ویژه مقادیر و ویژه بردارهای بهنجار ماتریس A را به دست آورید.

(ب) آیا این ویژه مقادیر تشکیل یک پایه می‌دهند (یعنی آیا این پایه، کامل و متعامد - بهنجار است)؟

(پ) ماتریس U را در نظر بگیرید که از ویژه بردارهای بهنجار A تشکیل شده است. ثابت کنید که U یکانی است و رابطه‌ی زیر را برآورده می‌کند:

$$U^\dagger A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

که در آن λ_1 و λ_2 ویژه مقادیر A هستند.(ت) نشان دهید که $e^{xA} = \cosh x + A \sinh x$ است.

حل:

(آ)

$$a_1 + a_2 = \text{Tr}(\hat{A}) = 0$$

$$a_1 a_2 = \det(\hat{A}) = -1$$

$$|a_1\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$a_1 = 1 \text{ و } a_2 = -1$$

$$\begin{pmatrix} \cdot & i \\ -i & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$x = iy$$

$$|a_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|a_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

(ب)

چون $\hat{A}$ هرمیتی است ویژه بردارهای بهنجار آن تشکیل یک پایه را می‌دهند و تحقیق این امر با توجه به حل مسائل بسیار مشابه ساده است.

(پ)

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

$$UU^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

پس U یکانی است.

$$U^\dagger A U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & +i \\ -i & \cdot \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(ت)

مشابه با قسمت (ت) تمرین ۲-۳۵ ثابت می‌شود.

تمرین ۲-۳۵

با استفاده از جبر برا - کت نشان دهید که $\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \text{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) = \text{Tr}(\hat{B}\hat{C}\hat{A})$ که $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ و عملگر هستند.

حل:

$$\text{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \sum_n \langle \phi_n | \hat{A}\hat{B}\hat{C} | \phi_n \rangle$$

چون $\sum_i |\phi_i\rangle \langle \phi_i| = I$ پس:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) &= \sum_{nml} \langle \phi_n | \hat{A} | \phi_m \rangle \langle \phi_m | \hat{B} | \phi_l \rangle \langle \phi_l | \hat{C} | \phi_n \rangle = \sum_{nml} \langle \phi_l | \hat{C} | \phi_n \rangle \langle \phi_n | \hat{A} | \phi_m \rangle \langle \phi_m | \hat{B} | \phi_l \rangle \\ &= \sum_l \langle \phi_l | \hat{C}\hat{A}\hat{B} | \phi_l \rangle = \text{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) = \sum_{nml} \langle \phi_m | \hat{B} | \phi_l \rangle \langle \phi_l | \hat{C} | \phi_n \rangle \langle \phi_n | \hat{A} | \phi_m \rangle \end{aligned}$$

$$= \sum_m \langle \phi_m | \hat{B} \hat{C} \hat{A} | \phi_m \rangle = \text{Tr}(\hat{B} \hat{C} \hat{A})$$

تمرین ۲-۲۱

برای هر دو کت مانند $|\psi\rangle$ و $|\phi\rangle$ که بهنجار متناهی دارند، نشان دهید که $\text{Tr}(|\psi\rangle\langle\phi|) = \langle\phi|\psi\rangle$.

حل:

$$\text{Tr}(|\psi\rangle\langle\phi|) = \sum_m \langle \phi_m | \psi \rangle \langle \phi | \phi_m \rangle = \sum_m \langle \phi | \phi_m \rangle \langle \phi_m | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$$

تمرین ۲-۲۲

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & -1+i \\ \cdot & 2 & \cdot \\ -1-i & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

(آ) ویژه مقادیر و ویژه بردارهای بهنجار A را محاسبه کنید. ویژه برداری A را با $|a_1\rangle$ ، $|a_2\rangle$ و $|a_3\rangle$ نشان دهید. آیا ویژه مقادیر تبهگن داریم؟

(ب) نشان دهید ویژه بردارهای $|a_1\rangle$ ، $|a_2\rangle$ و $|a_3\rangle$ تشکیل پایه‌ای کامل و متعامد - بهنجار می‌دهند یعنی $\sum_{j=1}^3 |a_j\rangle\langle a_j| = I$ که در آن I ماتریس واحد 3×3 است و $\langle a_j | a_k \rangle = \delta_{jk}$.

(پ) ماتریس متناظر با عملگر به دست آمده از ضرب کت - برا مربوط به اولین ویژه بردار یعنی $P = |a_1\rangle\langle a_1|$ را پیدا کنید. آیا P عملگری تصویری است؟

حل:

(آ)

معادله‌ی ویژه مقادیری عبارتست از:

$$A|a\rangle = a|a\rangle$$

به جهت غیر صفر بودن $|a\rangle$ این معادله تبدیل می‌شود به:

$$\det(\hat{A} - a\hat{I}) = 0.$$

یعنی:

$$\begin{vmatrix} -a & \cdot & -1+i \\ \cdot & 2-a & \cdot \\ -1-i & \cdot & -a \end{vmatrix} = -a(2-a)(-a) + (-1+i)(i+1)(2-a) = (2-a)(a^2-2) = 0.$$

پس ویژه مقادیر عبارتند از:

$$a_1 = 3, a_r = -\sqrt{2}, a_r = +\sqrt{2}$$

ویژه بردار $|a_1\rangle$ را می‌یابیم. برای این منظور داریم:

$$A|a_1\rangle = 3|a_1\rangle$$

$$\text{با تعریف } |a_1\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ خواهیم داشت:}$$

$$(-1+i)z = 3x$$

$$3y = 3y$$

$$(-1-i)x = 3z$$

در نتیجه:

$$|a_1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

و به طور مشابه:

$$|a_r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{1-i} \end{pmatrix}, |a_r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{1+i} \end{pmatrix}$$

در اینجا هیچ گونه تبهگنی وجود ندارد.

(ب)

به دلیل اینکه $\hat{A}$ هرمیتی است روابط مذکور در این قسمت بدیهی خواهند بود و خواننده با محاسبه سرراست می‌تواند آن‌ها را نشان دهد.

(پ)

با توجه به اینکه $\hat{P}$ هرمیتی است و $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$ ، لذا $\hat{P}$ عملگر تصویر است:

$$\hat{P} = |a_1\rangle\langle a_1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{P}^\dagger = |a_1\rangle\langle a_1| = |a_1\rangle\langle a_1| = \hat{P}$$

تمرین ۲-۲۳

در یک فضای برداری سه بعدی، عملگری را در نظر بگیرید که ماتریس آن، در یک پایه متعامد-بهنجار $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ است.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) آیا A هرمیتی است؟ ویژه مقادیر و ویژه بردارهای بهنجار متناظر آن را بیابید. بررسی کنید که ویژه بردارهای متناظر با دو ویژه مقدار غیرتبهگن، متعامد-بهنجار هستند.
(ب) نمایش ماتریسی عملگرهای تصویری را برای دو ویژه بردار غیرتبهگن بدست آمده در بند (آ) محاسبه کنید.

حل:
(آ)

$$A^\dagger = (A^T)^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A$$

پس A هرمیتی است.

برای به دست آوردن ویژه مقادیر A ، معادله $\det(A - a) = 0$ را حل می‌کنیم.

$$\begin{vmatrix} -a & 0 & 1 \\ 0 & -1-a & 0 \\ 1 & 0 & -a \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} -1-a & 0 \\ 0 & -a \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1-a \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -a^2 - a^2 + a + 1 = 0.$$

پس:

$$-a^2(a+1) + a + 1 = 0.$$

$$(a+1)(1-a^2) = 0.$$

$$a = -1$$

$$a = \pm 1$$

برای به دست آوردن ویژه بردار متناظر با ویژه مقدار $a_1 = +1$ ، معادله ماتریسی زیر را حل

می‌کنیم:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

این معادله‌ی ماتریسی متناظر با سه معادله‌ی زیر است:

$$x = z$$

$$-y = y$$

$$x = z$$

پس ویژه بردار بهنجار شده متناظر با $a_1 = +1$ برابر است با:

$$|a_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |3\rangle)$$

$$|3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ و } |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ می‌دانیم:}$$

به‌ازای $a_2 = -1$ داریم:

$$z = -x$$

$$-y = -y$$

اما $|a_2\rangle$ و $|a_3\rangle$ را باید طوری انتخاب کرد که بهنجار بوده و برهم و بر $|a_1\rangle$ عمود باشند؛ پس:

$$|a_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |2\rangle$$

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |3\rangle)$$

پس مجموعه‌ی $\{a_i\}$ راست هنجار است. حال کامل بودن آن را بررسی می‌کنیم. برای این منظور باید

رابطه‌ی $\sum_{i=1}^r |a_i\rangle \langle a_i| = I$ برقرار باشد. لذا این موضوع را بررسی می‌کنیم:

$$\sum_i^r |a_i\rangle \langle a_i| = |a_1\rangle \langle a_1| + |a_2\rangle \langle a_2| + |a_3\rangle \langle a_3|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ 1) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ 0) + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ -1)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

پس کامل بودن $\{a_i\}$ نیز برقرار است.

(ب)

$$|a_1\rangle\langle a_1| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$|a_2\rangle\langle a_2| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

تمرین ۲-۲۴

دو عملگر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ را در نظر بگیرید که ماتریس آنها برابر است با:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

(آ) آیا $\hat{A}$ و $\hat{B}$ هرمیتی هستند؟

(ب) آیا $\hat{A}$ و $\hat{B}$ جابه‌جاپذیرند؟

(پ) ویژه مقادیر و ویژه بردارهای $\hat{A}$ و $\hat{B}$ را بیابید؟

(ت) آیا ویژه بردارهای هریک از این عملگرها، متعامد بهنجارند؟

(ث) ثابت کنید $\hat{U}^\dagger \hat{B} \hat{U}$ قطری است، $\hat{U}$ ماتریس ویژه بردارهای بهنجار شده $\hat{B}$ است.

(ج) نشان دهید که $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^\dagger$

حل:

$$A^\dagger = (A^T)^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \neq A$$

$$B^\dagger = (B^T)^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} = B$$

بنابراین B هرمیتی است ولی A هرمیتی نیست.
(ب)

$$\begin{aligned} [A, B] &= AB - BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -5 & +2 \\ 0 & 0 & 0 \\ +2 & +10 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 10 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

پس $[A, B] \neq 0$ یعنی A و B با هم جابه‌جا نمی‌شوند.
(پ)

برای یافتن ویژه مقادیر A ، معادله $\det(A - a) = 0$ را حل می‌کنیم.

$$\begin{vmatrix} 1-a & 2 & 0 \\ 1 & -a & 1 \\ 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = (1-a)[(-a)(1-a) + 1] - 2[1(1-a) - 0] = (1-a)(a^2 - a - 2) = 0$$

پس a دارای یکی از مقادیر ± 1 یا 2 می‌باشد.

برای به‌دست آوردن ویژه بردارهای A ، به‌ازای $a_1 = 1$ داریم:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

یا:

$$x + 2y = x$$

$$x + z = y$$

بنابراین:

$$|a_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

به ازای $a_1 = -1$ داریم:

$$x + 2y = -x$$

$$x + z = -y$$

$$-y + z = -z$$

پس:

$$|a_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

به ازای $a_2 = 2$ داریم:

$$x + 2y = 2x$$

$$x + z = 2y$$

$$-y + z = 2z$$

پس:

$$|a_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

به همین ترتیب b ویژه مقدار عملگر B دارای مقادیر ۰ یا ۵ خواهد بود و ویژه بردارهای متناظر آن عبارتند از:

$$|b_1 = 0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |b_2 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |b_3 = 5\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(ت)

واضح است که مجموعه $\{a_i\}$ راست هنجار نیستند اما مجموعه $\{b_i\}$ به دست آمده در اینجا راست هنجار می باشند.

(ث)

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$U^\dagger B U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{5} & 0 & -2\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

(پ)

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

پس:

$$U^\dagger = U^{-1}$$

تمرین ۲-۲۵

عملگر $\hat{A}$ را در نظر بگیرید به طوری که $[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1$.

(آ) جابه‌جاگرهای $[\hat{A}^\dagger \hat{A}, \hat{A}^\dagger]$ و $[\hat{A}^\dagger \hat{A}, \hat{A}]$ را محاسبه کنید.

(ب) اگر اثر $\hat{A}$ و $\hat{A}^\dagger$ روی حالت $\{|a\rangle\}$ با $\hat{A}|a\rangle = \sqrt{a}|a-1\rangle$ و $\hat{A}^\dagger|a\rangle = \sqrt{a+1}|a+1\rangle$ داده شوند و

اگر $\langle a'|a\rangle = \delta_{a',a}$ آنگاه $\langle a|\hat{A}|a+1\rangle$ ، $\langle a+1|\hat{A}^\dagger|a\rangle$ و $\langle a|\hat{A}^\dagger\hat{A}|a\rangle$ و $\langle a|\hat{A}\hat{A}^\dagger|a\rangle$ را محاسبه کنید.

(پ) $\langle a|(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)^2|a\rangle$ و $\langle a|(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)^2|a\rangle$ را محاسبه کنید.

حل:

(آ)

$$[\hat{A}^\dagger \hat{A}, \hat{A}] = -[\hat{A}, \hat{A}^\dagger \hat{A}] = -[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] \hat{A} - \hat{A}^\dagger [\hat{A}, \hat{A}] = -1\hat{A} - \hat{A}^\dagger(0) = -\hat{A}$$

$$[\hat{A}^\dagger \hat{A}, \hat{A}^\dagger] = -[\hat{A}^\dagger, \hat{A}^\dagger \hat{A}] = -[\hat{A}^\dagger, \hat{A}^\dagger] \hat{A} - \hat{A}^\dagger [\hat{A}^\dagger, \hat{A}] = \hat{A}^\dagger$$

(ب)

$$\langle a | A | a+1 \rangle = \langle a | \sqrt{a+1} | a \rangle = \sqrt{a+1} \delta_{aa} = \sqrt{a+1}$$

$$\langle a+1 | A^\dagger | a \rangle = \langle a+1 | \sqrt{a+1} | a+1 \rangle = \sqrt{a+1} \delta_{a+1,a+1} = \sqrt{a+1}$$

$$\langle a | A^\dagger A | a \rangle = (A | a \rangle)^\dagger A | a \rangle = \sqrt{a} \langle a-1 | \sqrt{a} | a-1 \rangle = a \delta_{a-1,a-1} = a$$

$$\langle a | A A^\dagger | a \rangle = (A^\dagger | a \rangle)^\dagger A^\dagger | a \rangle = \sqrt{a+1} \langle a+1 | \sqrt{a+1} | a+1 \rangle = a+1$$

(پ)

$$\begin{aligned} \langle a | (A + A^\dagger)^2 | a \rangle &= \langle a | (A + A^\dagger) (A + A^\dagger) | a \rangle = \left((A + A^\dagger) | a \rangle \right)^\dagger (A + A^\dagger) | a \rangle \\ &= \left(\sqrt{a} \langle a-1 | + \sqrt{a+1} \langle a+1 | \right) \left(\sqrt{a} | a-1 \rangle + \sqrt{a+1} | a+1 \rangle \right) \\ &= (\sqrt{a})^2 \delta_{a-1,a-1} + \sqrt{a} \sqrt{a+1} \delta_{a-1,a+1} + \sqrt{a} \sqrt{a+1} \delta_{a+1,a-1} + (\sqrt{a+1})^2 \delta_{a+1,a+1} \\ &= a + a + 1 = 2a + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle a | (A - A^\dagger)^2 | a \rangle &= \langle a | (A - A^\dagger) (A - A^\dagger) | a \rangle = \left((A^\dagger - A) | a \rangle \right)^\dagger (A - A^\dagger) | a \rangle \\ &= \left(\sqrt{a+1} \langle a+1 | - \sqrt{a} \langle a-1 | \right) \left(\sqrt{a} | a-1 \rangle - \sqrt{a+1} | a+1 \rangle \right) \\ &= -(a+1) - a = -2a - 1 \end{aligned}$$

تمرین ۲-۲۶

ماتریس ۴×۴ زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) ماتریس‌های $A^\dagger$, $N = A^\dagger A$, $H = N + \frac{1}{2}I$ (که در آن I ماتریس یکه است)، $B = A + A^\dagger$ و $C = i(A - A^\dagger)$ را به دست آورید.

(ب) ماتریس‌های متناظر با جابه‌جاگرهای $[A^\dagger, A]$, $[B, C]$, $[N, B]$ و $[N, C]$ را بیابید.

(پ) ماتریس‌های متناظر با $C^\dagger$, $B^\dagger$, $[N, B^\dagger + C^\dagger]$, $[H, A^\dagger]$, $[H, A]$ و $[H, N]$ را بیابید.

(ت) ثابت کنید که $\det(ABC) = \det(A)\det(B)\det(C)$ و $\det(C^\dagger) = (\det(C))^*$.

حل:
(i)

$$A^\dagger = (A^T)^* = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix}$$

$$N = A^\dagger A = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 3 \end{pmatrix}$$

$$H = N + \frac{1}{2} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{1}{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{1}{2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{3}{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{5}{2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$B = A + A^\dagger = \begin{pmatrix} \cdot & \sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix}$$

$$C = i(A - A^\dagger) = \begin{pmatrix} \cdot & i\sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ -i\sqrt{1} & \cdot & i\sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & -i\sqrt{2} & \cdot & i\sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & -i\sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix}$$

(ب)

$$AA^\dagger = \begin{pmatrix} \cdot & \sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$[A^\dagger, A] = \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 2 & . \\ . & . & . & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & . & . & . \\ . & -2 & . & . \\ . & . & -3 & . \\ . & . & . & . \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & . & . & . \\ . & -1 & . & . \\ . & . & -1 & . \\ . & . & . & 3 \end{pmatrix}$$

$$[B, C] = \begin{pmatrix} . & \sqrt{1} & . & . \\ \sqrt{1} & . & \sqrt{2} & . \\ . & \sqrt{2} & . & \sqrt{3} \\ . & . & \sqrt{3} & . \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & i\sqrt{1} & . & . \\ -i\sqrt{1} & . & i\sqrt{2} & . \\ . & -i\sqrt{2} & . & i\sqrt{3} \\ . & . & -i\sqrt{3} & . \end{pmatrix}$$

$$- \begin{pmatrix} . & i\sqrt{1} & . & . \\ -i\sqrt{1} & . & i\sqrt{2} & . \\ . & -i\sqrt{2} & . & i\sqrt{3} \\ . & . & -i\sqrt{3} & . \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & \sqrt{1} & . & . \\ \sqrt{1} & . & \sqrt{2} & . \\ . & \sqrt{2} & . & \sqrt{3} \\ . & . & \sqrt{3} & . \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2i & . & . & . \\ . & -2i & . & . \\ . & . & -2i & . \\ . & . & . & 6i \end{pmatrix}$$

$$[N, B] = \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 2 & . \\ . & . & . & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & \sqrt{1} & . & . \\ \sqrt{1} & . & \sqrt{2} & . \\ . & \sqrt{2} & . & \sqrt{3} \\ . & . & \sqrt{3} & . \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} . & \sqrt{1} & . & . \\ \sqrt{1} & . & \sqrt{2} & . \\ . & \sqrt{2} & . & \sqrt{3} \\ . & . & \sqrt{3} & . \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 2 & . \\ . & . & . & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ 1 & . & \sqrt{2} & . \\ . & 2\sqrt{2} & . & 2\sqrt{3} \\ . & . & 2\sqrt{3} & . \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} . & -1 & . & . \\ . & . & . & . \\ . & -\sqrt{2} & . & . \\ . & . & -2\sqrt{3} & . \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} . & -1 & . & . \\ 1 & . & \sqrt{2} & . \\ . & \sqrt{2} & . & 2\sqrt{3} \\ . & . & \sqrt{3} & . \end{pmatrix}$$

$$[N, C] = \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 2 & . \\ . & . & . & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & i\sqrt{1} & . & . \\ -i\sqrt{1} & . & i\sqrt{2} & . \\ . & -i\sqrt{2} & . & i\sqrt{3} \\ . & . & -i\sqrt{3} & . \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} . & i\sqrt{1} & . & . \\ -i\sqrt{1} & . & i\sqrt{2} & . \\ . & -i\sqrt{2} & . & i\sqrt{3} \\ . & . & -i\sqrt{3} & . \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ . & 1 & . & . \\ . & . & 2 & . \\ . & . & . & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} . & . & . & . \\ -i\sqrt{1} & . & i\sqrt{2} & . \\ . & -2i\sqrt{2} & . & 2i\sqrt{3} \\ . & . & -2i\sqrt{3} & . \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} . & -i\sqrt{1} & . & . \\ . & . & -2i\sqrt{2} & . \\ . & +i\sqrt{2} & . & -2i\sqrt{3} \\ . & . & +2i\sqrt{3} & . \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} . & -i & . & . \\ -i & . & -i\sqrt{2} & . \\ . & -i\sqrt{2} & . & i\sqrt{3} \\ . & . & i\sqrt{3} & . \end{pmatrix}$$

$$B^T = BB = \begin{pmatrix} \cdot & \sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & 2 & \cdot & \sqrt{6} \\ \sqrt{2} & \cdot & 5 & \cdot \\ \cdot & \sqrt{6} & \cdot & 3 \end{pmatrix}$$

$$C^T = CC = \begin{pmatrix} \cdot & i\sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ -i\sqrt{1} & \cdot & i\sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & -i\sqrt{2} & \cdot & i\sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & -i\sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & i\sqrt{1} & \cdot & \cdot \\ -i\sqrt{1} & \cdot & i\sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & -i\sqrt{2} & \cdot & i\sqrt{3} \\ \cdot & \cdot & -i\sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & -\sqrt{2} & \cdot \\ \cdot & 2 & \cdot & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{2} & \cdot & 5 & \cdot \\ \cdot & -\sqrt{6} & \cdot & 3 \end{pmatrix}$$

$$B^T + C^T = \begin{pmatrix} 2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 4 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & 10 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 6 \end{pmatrix}$$

$$[N, B^T + C^T] = 0$$

علت جابه‌جا شدن N و $B^T + C^T$ آن است که هر دو قطری هستند.

$$[H, A^\dagger] = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{3}{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{5}{2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \frac{7}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sqrt{1} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{3}{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{5}{2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{3}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{5}{2}\sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{7}{2}\sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{-1}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{-3}{2}\sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{-5}{2}\sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sqrt{2} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \sqrt{3} & \cdot \end{pmatrix} = A^\dagger$$

$$[H, A] = \left[A^\dagger A + \frac{1}{2}, A \right] = -[A, A^\dagger A] = -[A, A^\dagger]A - A^\dagger[A, A] = [A^\dagger, A]A$$

$$[H, A] = \begin{pmatrix} -1 & . & . & . \\ . & -1 & . & . \\ . & . & -1 & . \\ . & . & . & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} . & \sqrt{1} & . & . \\ . & . & \sqrt{2} & . \\ . & . & . & \sqrt{2} \\ . & . & . & . \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} . & -1 & . & . \\ . & . & -\sqrt{2} & . \\ . & . & . & -\sqrt{2} \\ . & . & . & . \end{pmatrix} = -A$$

$$[H, N] = \left[N + \frac{1}{2}, N \right] = 0$$

(ت)

$$ABC = \begin{pmatrix} . & \sqrt{1} & . & . \\ . & . & \sqrt{2} & . \\ . & . & . & \sqrt{2} \\ . & . & . & . \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & . & i\sqrt{2} & . \\ . & -i & . & i\sqrt{6} \\ -i\sqrt{2} & . & -i & . \\ . & -i\sqrt{6} & . & 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} . & -i & . & i\sqrt{6} \\ -2i & . & -i\sqrt{2} & . \\ . & -i3\sqrt{2} & . & 2i\sqrt{2} \\ . & . & . & . \end{pmatrix}$$

$$\det(ABC) = i \begin{vmatrix} -2i & -i\sqrt{2} & . \\ . & . & 2i\sqrt{2} \\ . & . & . \end{vmatrix} - i\sqrt{6} \begin{vmatrix} -2i & . & -i\sqrt{2} \\ . & -2i\sqrt{2} & . \\ . & . & . \end{vmatrix} = 0$$

$$\det(A) = -\sqrt{1} \begin{vmatrix} . & \sqrt{2} & . \\ . & . & \sqrt{2} \\ . & . & . \end{vmatrix} = 0$$

پس:

$$\det(ABC) = \det(A) \det(B) \det(C) = 0$$

$$\det(C^\dagger) = \det(C) = -i\sqrt{1} \begin{vmatrix} -i\sqrt{1} & i\sqrt{2} & . \\ . & . & i\sqrt{3} \\ . & -i\sqrt{3} & . \end{vmatrix} = -i\sqrt{1} \left(-i\sqrt{1} \begin{vmatrix} . & i\sqrt{3} \\ -i\sqrt{3} & . \end{vmatrix} - i\sqrt{2} \begin{vmatrix} . & i\sqrt{3} \\ . & . \end{vmatrix} \right) = 2$$

پس:

$$\det(C^\dagger) = \det(C) = (\det(C))^*$$

تمرین ۲-۲۷

اگر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ جابه‌جا شوند و اگر $|\psi_1\rangle$ و $|\psi_2\rangle$ دو ویژه بردار از $\hat{A}$ (هرمیتی است) با ویژه مقادیر متفاوت باشند، نشان دهید که

(آ) $\langle \psi_1 | \hat{B} | \psi_r \rangle$ برابر صفر است.

(ب) $\hat{B} | \psi_1 \rangle$ نیز ویژه برداری از $\hat{A}$ با ویژه مقدار مشابه $|\psi_1\rangle$ است یعنی اگر $\hat{A} | \psi_1 \rangle = a_1 | \psi_1 \rangle$ باشد نشان دهید $\hat{A}(\hat{B} | \psi_1 \rangle) = a_1 \hat{B} | \psi_1 \rangle$ است.

حل:

(آ)

در اثبات رابطه‌ی $\langle \psi_1 | \hat{B} | \psi_r \rangle = 0$ ؛ فرض هرمیتی بودن A ضروری است.

$$\hat{A} | \psi_1 \rangle = a_1 | \psi_1 \rangle$$

$$\hat{A} | \psi_r \rangle = a_r | \psi_r \rangle$$

از رابطه‌ی اول نتیجه می‌شود که:

$$\langle \psi_1 | \hat{A}^\dagger = a_1^* \langle \psi_1 |$$

اما اگر $\hat{A}$ هرمیتی باشد، یعنی $A = A^\dagger$ ، آنگاه:

$$\langle \psi_1 | \hat{A} = a_1 \langle \psi_1 |$$

پس چون $[A, B] = 0$ ، آنگاه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | [A, B] | \psi_r \rangle &= \langle \psi_1 | AB - BA | \psi_r \rangle = \langle \psi_1 | AB | \psi_r \rangle - \langle \psi_1 | BA | \psi_r \rangle = a_1 \langle \psi_1 | B | \psi_r \rangle - a_r \langle \psi_1 | B | \psi_r \rangle \\ &= (a_1 - a_r) \langle \psi_1 | B | \psi_r \rangle = 0. \end{aligned}$$

اما چون فرض مسئله، آن است که: $a_1 \neq a_r$ ، پس:

$$\langle \psi_1 | B | \psi_r \rangle = 0.$$

(ب)

$$AB | \psi_1 \rangle = BA | \psi_1 \rangle = B(a_1 | \psi_1 \rangle) = a_1 B | \psi_1 \rangle$$

$$A(B | \psi_1 \rangle) = a_1 (B | \psi_1 \rangle)$$

این رابطه بیانگر آن است که $B | \psi_1 \rangle$ ویژه بردار عملگر A با ویژه مقدار a_1 می‌باشد.

تمرین ۲-۲۸

فرض کنید A و B دو ماتریس $n \times n$ هستند. با فرض وجود B^{-1} نشان دهید

$$[A, B^{-1}] = -B^{-1} [A, B] B^{-1}$$

حل:

$$BB^{-1} = B^{-1}B = I$$

$$\begin{aligned} -B^{-1}[A, B]B^{-1} &= -B^{-1}(AB - BA)B^{-1} = -B^{-1}ABB^{-1} + B^{-1}BAB^{-1} = -B^{-1}AI + IAB^{-1} \\ &= -B^{-1}A + AB^{-1} = [A, B^{-1}] \end{aligned}$$

تمرین ۲-۲۹

یک سیستم فیزیکی را در نظر بگیرید که هامیلتونی H و عملگر A آن در فضای سه بعدی با ماتریس‌های زیر داده می‌شوند:

$$H = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad A = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) آیا H و A هرمیتی هستند؟

(ب) نشان دهید که H و A جابه‌جا می‌شوند. یک پایه از ویژه بردارهای مشترک H و A را معین کنید.

حل:

$$H^\dagger = (H^T)^* = \hbar\omega^* \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

تنها با این فرض که H هرمیتی است (یعنی $H = H^\dagger$) خواهیم داشت: $w = w^*$. اما چون H هامیلتونی یک سیستم فیزیکی است، بنابراین باید هرمیتی باشد و لاجرم حقیقی بودن w محرز فرض شود. اما هرمیتی بودن A ، مستلزم آن است که a حقیقی باشد؛ زیرا:

$$A^\dagger = (A^T)^* = a^* \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(ب)

$$\begin{aligned} [H, A] &= HA - AH = \hbar\omega a \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \hbar\omega a \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right] = 0 \end{aligned}$$

واضح است که ویژه بردارها و ویژه مقادیر راست هنجار H عبارتند از:

$$|h_l = \hbar\omega\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |h_r = -\hbar\omega\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |h_r = -\hbar\omega\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

حال ویژه مقادیر و ویژه بردارهای راست هنجار A را می‌یابیم. برای این منظور معادله‌ی $\det(\hat{A} - \lambda) = 0$ را حل می‌کنیم:

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & a \\ 0 & a & -\lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(\lambda^2 - a^2) = 0.$$

مقادیر متمایز λ عبارتند از $\pm a$. در واقع متناظر با ویژه مقدار $\lambda = +a$ ، تبهگنی دوگانه وجود دارد. حال ابتدا ویژه بردار بهنجار متناظر با $\lambda = -a$ را می‌یابیم.

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -a \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

پس:

$$|\lambda = -a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

اما معادلات متناظر با $\lambda = a$ عبارتند از:

$$x = x$$

$$y = z$$

پس:

$$|\lambda = +a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, |\lambda = +a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

در اینجا ویژه حالت‌های A را با الزام راست هنجار بودن یعنی $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ به دست آوردیم. در اینجا این ویژه بردارها خود به خود ویژه بردارهای H نیز می‌باشند.

تمرین ۲-۳۰

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \text{ با استفاده از } [\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \text{ نشان دهید که } [\hat{X}, \hat{P}^2] = 2i\hbar \hat{P}.$$

$$(ب) \text{ نشان دهید } [\hat{X}^2, \hat{P}^2] = 2i\hbar(i\hbar + 2\hat{P}\hat{X})$$

(پ) جابه‌جاگر $[\hat{X}^2, \hat{P}^2]$ را محاسبه کنید.

حل:

در حل این تمرین از اتحادهای زیر استفاده خواهیم کرد:

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$$

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$$

$$[\hat{X}, \hat{P}^2] = [\hat{X}, \hat{P}] \hat{P} + \hat{P} [\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \hat{P} + \hat{P} (i\hbar) = 2i\hbar \hat{P} \quad (\text{آ})$$

$$\begin{aligned} [\hat{X}^2, \hat{P}^2] &= \hat{X} [\hat{X}, \hat{P}^2] + [\hat{X}, \hat{P}^2] \hat{X} = \hat{X} (2i\hbar \hat{P}) + (2i\hbar \hat{P}) \hat{X} = 2i\hbar (\hat{X} \hat{P} + \hat{P} \hat{X}) \\ &= 2i\hbar (i\hbar + \hat{P} \hat{X} + \hat{P} \hat{X}) = 2i\hbar (i\hbar + 2\hat{P} \hat{X}) \end{aligned} \quad (\text{ب})$$

$$[\hat{X}^2, \hat{P}^2] = [\hat{X}^2, \hat{P}^2] \hat{P} + \hat{P}^2 [\hat{X}^2, \hat{P}] = 2i\hbar (i\hbar + 2\hat{P} \hat{X}) + \hat{P}^2 [\hat{X}^2, \hat{P}] \quad (\text{پ})$$

$$[\hat{X}^2, \hat{P}] = X[X, P] + [X, P]X = X(i\hbar) + i\hbar(X) = 2i\hbar X \quad \text{اما:}$$

$$[\hat{X}^2, \hat{P}^2] = 2i\hbar (i\hbar + 2\hat{P} \hat{X}) + \hat{P}^2 (2i\hbar X) = 2i\hbar (i\hbar + 2\hat{P} \hat{X} + \hat{P}^2 \hat{X}) \quad \text{پس:}$$

تمرین ۲-۳۱

هرمیتی بودن جابه‌جاگرهای $[\hat{X}, \hat{P}]$ ، $[\hat{X}^2, \hat{P}]$ و $[\hat{X}, \hat{P}^2]$ را مورد بحث قرار دهید.

حل:

در حالت کلی اگر A و B هرمیتی باشند، جابه‌جاگر آنها پاد هرمیتی خواهد بود زیرا:

$$[A, B]^\dagger = (AB - BA)^\dagger = (AB)^\dagger - (BA)^\dagger = B^\dagger A^\dagger - A^\dagger B^\dagger = BA - AB = -[A, B]$$

پس واضح است که $[X, P]$ ، $[X^2, P]$ و نیز $[X, P^2]$ پاد هرمیتی هستند.

تمرین ۲-۳۲

(آ) جابه‌جاگر $[\hat{X}^2, d/dx]$ را با اعمال آن روی یک تابع موج به دست آورید.

(ب) با استفاده از $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ جابه‌جاگر $[\hat{X} \hat{P}^2, \hat{P} \hat{X}^2]$ را برحسب ترکیب خطی $\hat{X} \hat{P}$ و $\hat{X}^2 \hat{P}^2$ به دست آورید.

حل:

(آ)

$$\begin{aligned}\left[\hat{X}^2, \frac{d}{dx}\right] \psi(x) &= \hat{X}^2 \frac{d\psi(x)}{dx} - \frac{d}{dx} (\hat{X}^2 \psi(x)) = x^2 \frac{d\psi}{dx} - \frac{d}{dx} (x^2 \psi(x)) \\ &= x^2 \frac{d\psi}{dx} - 2x \psi(x) - x^2 \frac{d\psi}{dx} = -2x \psi(x) = -2\hat{X} \psi(x)\end{aligned}$$

پس:

$$\left[\hat{X}^2, \frac{d}{dx}\right] = -2\hat{X}$$

(ب)

$$\begin{aligned}[\hat{X}P^2, P\hat{X}^2] &= [X, P\hat{X}^2]P^2 + X[P^2, P\hat{X}^2] \\ &= \{[X, P]X^2 + P[X, X^2]\}P^2 + X\{[P^2, P]X^2 + P[P^2, X^2]\} \\ &= (i\hbar X^2 + P \times \cdot)P^2 + X(X^2 + P(-2i\hbar(XP + PX))) \\ &= i\hbar X^2 P^2 - 2i\hbar XPXP - 2i\hbar XP^2 X \\ &= -i\hbar [-X^2 P^2 + 2(XP)^2 - 2i\hbar XP] \\ &= -i\hbar [-X^2 P^2 + 2(XP)^2 + 2XP(XP - i\hbar)] \\ &= -i\hbar (-X^2 P^2 + 2XPXP - 2i\hbar XP) \\ &= -i\hbar (-X^2 P^2 + 2X(XP - i\hbar)P - 2i\hbar XP) \\ &= -i\hbar (2X^2 P^2 - 4i\hbar XP)\end{aligned}$$

تمرین ۲-۳۳

نشان دهید که $[\hat{X}, \hat{P}^n] = i\hbar \hat{X} \hat{P}^{n-1}$ است.

حل:

اثبات این رابطه را از طریق استقراء انجام می‌دهیم.

بدیهی است که این رابطه به‌ازای $n=1$ برقرار است، یعنی:

$$[\hat{X}, \hat{P}^1] = [\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar (1) \hat{P}^{1-1}$$

از طرفی با فرض اینکه به‌ازای $n=k$ این رابطه برقرار باشد، ثابت می‌کنیم که به‌ازای $n=k+1$ نیز

برقرار است.

$$[\hat{X}, \hat{P}^{k+1}] = [\hat{X}, \hat{P}^k] \hat{P} + \hat{P}^k [\hat{X}, \hat{P}]$$

اما:

$$[\hat{X}, \hat{P}^k] = i\hbar k \hat{P}^{k-1}$$

لذا:

$$[\hat{X}, \hat{P}^{k+1}] = i\hbar k \hat{P}^{k-1} \hat{P} + \hat{P}^k (i\hbar) = i\hbar (k \hat{P}^k + \hat{P}^k) = i\hbar (k+1) \hat{P}^k$$

تمرین ۲-۳۴

جابه‌جاگرهای $[e^{i\hat{X}}, \hat{P}]$ و $[e^{i\hat{X}^\tau}, \hat{P}^\tau]$ را به دست آورید.

حل:

در متن کتاب ثابت شده است که:

$$[X^m, P] = im\hbar X^{m-1}$$

پس:

$$\begin{aligned} [e^{iX}, \hat{P}] &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{n!} [X^n, \hat{P}] = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{i^n}{n!} in\hbar X^{n-1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} X^{n-1} \\ &= -\hbar \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iX)^k}{k!} = -\hbar e^{iX} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [e^{iX^\tau}, P] &= \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iX^\tau)^n}{n!}, P \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n!} [X^{\tau n}, P] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n!} \tau n i\hbar X^{\tau n-1} = -\tau \hbar X \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^{n-1}}{(n-1)!} X^{\tau(n-1)} \\ &= -\tau \hbar X \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iX^\tau)^k}{k!} = -\tau \hbar X e^{iX^\tau} \end{aligned}$$

$$[e^{iX}, P^\tau] = [e^{iX}, PP] = [e^{iX}, P]P + P[e^{iX}, P] = -\hbar e^{iX}P + P(-\hbar e^{iX}) = -\hbar (e^{iX}P + Pe^{iX})$$

تمرین ۲-۳۵

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & -1 \\ \cdot & 1 & \cdot \\ -1 & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

(آ) ویژه مقادیر و ویژه بردارهای بهنجار شده ی A را بیابید.
 (ب) آیا این ویژه بردارها تشکیل یک پایه را می دهند (یعنی آیا این پایه، کامل و متعامد بهنجار است)؟

(پ) ماتریس U را در نظر بگیرید که از ویژه بردارهای متعامد بهنجار A تشکیل شده است. ثابت کنید U یک ماتریس یکه است و رابطه ی زیر را برآورد می کند:

$$U^\dagger A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

که در آن $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ویژه مقادیر A هستند.

(ت) نشان دهید که $e^{xA} = \cosh x + A \sinh x$ است.

(راهنمایی: $\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} / (2n+1)!$ و $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} / (2n)!$)

حل:

(آ)

برای یافتن ویژه مقادیر معادله ی $\det(A - a) = 0$ را حل می کنیم.

$$\begin{vmatrix} -a & 0 & -1 \\ 0 & 1-a & 0 \\ -1 & 0 & -a \end{vmatrix} = -a(-a)(1-a) - 1(1-a) = (1-a)(a^2 - 1) = 0$$

ویژه بردار متناظر با $a = -1$ را می یابیم.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

یا:

$$z = +x$$

$$y = -y$$

بنابراین ویژه بردار بهنجار متناظر با $a = -1$ عبارتست از:

$$|a_1 = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

برای $a = 1$ داریم:

$$z = -x$$

$$y = y$$

پس ویژه بردارهای بهنجار متناظر با $a = 1$ که بر هم و بر $|a_1 = -1\rangle$ عمودند عبارتند از:

$$|a_r = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |a_r = 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(ب)

از آنجا که A هرمیتی است؛ پس، ویژه بردارهای آن متعامد و پایده کاملی را تشکیل می‌دهند زیرا:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^r |a_i\rangle \langle a_i| &= |a_1\rangle \langle a_1| + |a_r\rangle \langle a_r| + |a_r\rangle \langle a_r| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ 1) + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ -1) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

در ضمن واضح است که:

$$\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$$

(پ)

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$UU^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = I$$

پس U یکانی است.

$$U^\dagger A U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(ت)

$$A^T = AA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$A^{rn} = (A^T)^n = I^n = I$$

$$A^{rn+1} = AA^{rn} = AI = A$$

$$\begin{aligned} e^{xA} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(xA)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{rn}}{(rn)!} A^{rn} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{rn+1}}{(rn+1)!} A^{rn+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{rn}}{(rn)!} I + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Ax^{rn+1}}{(rn+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{rn}}{(rn)!} + A \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{rn+1}}{(rn+1)!} = \cos hx + A \sin hx \end{aligned}$$

تمرین ۲-۳۶

(آ) اگر $[\hat{A}, \hat{B}] = c$ که در آن c یک عدد است، دو رابطه‌ی زیر را ثابت کنید.

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + c$$

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-c/\tau}$$

(ب) حال اگر $[\hat{A}, \hat{B}] = c\hat{B}$ که در آن c یک عدد است نشان دهید

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = e^c \hat{B}$$

حل:

(آ)

از تمرین ۲-۱۵ داریم:

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [A, B] + \frac{1}{2!} [A, [A, B]] + \frac{1}{3!} [A, [A, [A, B]]] + \dots$$

اما اگر $[A, B] = c$ آنگاه داریم:

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + c + \frac{1}{2!} [A, c] + \frac{1}{3!} [A, [A, c]] + \dots$$

اما چون $[\hat{A}, c] = 0$ پس:

$$e^A B e^{-A} = \dot{B} + c + \dots = \dot{B} + c$$

باز از همان تمرین داریم:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A,B]}$$

اما اگر $[A, B] = c$ آنگاه داریم:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}c}$$

$$e^A e^B e^{\frac{c}{2}} = e^{A+B}$$

(ب)

اگر $[A, B] = cB$ آنگاه:

$$e^A B e^{-A} = B + cB + \frac{1}{2!}[A, cB] + \frac{1}{3!}[A, [A, cB]] + \dots$$

$$= B + cB + \frac{1}{2!}c[A, B] + \frac{1}{3!}c[A, [A, B]] + \dots = B \left(1 + c + \frac{c^2}{2!} + \frac{c^3}{3!} + \dots \right) = B e^c$$

تمرین ۲-۳۷

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(آ) ویژه مقدارهای A و ویژه بردارهای متناظر آن‌ها را بیابید.

(ب) پایه‌ای را در نظر بگیرید که از سه ویژه بردار A ساخته شده باشد. با بهره‌گیری از جبر ماتریسی، ثابت کنید که این پایه هم متعامد - بهنجار و هم کامل است.

حل:

(آ)

بردار $\vec{a}$ را ویژه بردار عملگر (ماتریس) $\hat{A}$ با ویژه مقدار a گویند هرگاه:

$$\hat{A}\vec{a} = a\vec{a}$$

نتیجه‌ی این معادله آن است که:

$$(\hat{A} - a)\vec{a} = 0$$

برای این که معادله‌ی اخیر دارای جوابی غیر از جواب بدیهی $\vec{a} = 0$ باشد لازم است که:

$$\det(\hat{A} - a) = 0.$$

پس برای یافتن ویژه مقادیر باید این معادله را حل کنیم؛ پس:

$$\begin{vmatrix} 1-a & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2}-a & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}-a \end{vmatrix} = (1-a) \left[\left(\frac{3}{2}-a \right) \left(\frac{3}{2}-a \right) - \frac{1}{4} \right] = 0.$$

ویژه مقادیر متمایز a عبارتند از ۱ و ۲. در واقع $a=1$ دارای تبهگنی است. یعنی دو ویژه بردار متناظر با ویژه مقدار $a=1$ داریم. حال ویژه بردار متناظر با ویژه مقدار $a=2$ را می‌یابیم.

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

نتیجه آن که:

$$x = 2x$$

$$\frac{1}{2}(2y - z) = 2y$$

$$\frac{1}{2}(-y + 2z) = 2z$$

از حل این معادله نتیجه می‌شود که:

$$x = 0$$

$$y = -z$$

و در نتیجه با لحاظ کردن بهنجار بودن $|a_i\rangle$ داریم:

$$|a_1 = 2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ +1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

برای $a=1$ نتیجه می‌شود که: $x=x$ و $y=z$ و لذا:

$$|a_2 = 1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |a_1 = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

واضح است که $\langle a_i | a_j \rangle = \delta_{ij}$ و همین‌طور $\sum_{i=1}^2 |a_i\rangle \langle a_i| = I$ زیرا:

$$\begin{aligned}
 |a_1\rangle\langle a_1| + |a_r\rangle\langle a_r| + |a_r\rangle\langle a_r| &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (0 \ 1 \ -1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 0) + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (0 \ 1 \ 1) \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

بنابراین $\{a_i\}$ متعامد و کامل است.

تمرین ۲-۳۸

(آ) شرطی را تعیین کنید که باید به وسیله‌ی ماتریسی مانند A برآورده شود به طوری که هم یکانی و هم هرمیتی باشد.

(ب) سه ماتریس زیر را در نظر بگیرید.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_r = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad M_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

وارون هر ماتریس را محاسبه کنید. آیا شرط به دست آمده در (آ) را برآورده می‌کنند؟

حل:

(آ)

$$A \equiv \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix}$$

A هرمیتی است اگر $A = A^\dagger$. این شرط ایجاب می‌کند که a و d حقیقی باشند و $c = b^*$. یعنی:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} = A^\dagger$$

از طرفی A یونیتاری است اگر $A^{-1} = A^\dagger$. و لذا:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bb^*} \begin{pmatrix} d & -b \\ -b^* & a \end{pmatrix}$$

از این تساوی نتیجه می‌شود که:

$$a = \frac{d}{ad - |b|^2}$$

$$b = \frac{-b}{ad - |b|^2}$$

$$d = \frac{a}{ad - |b|^2}$$

بنابراین یک ماتریس 2×2 با شروط زیر هرمیتی یونیتاری است:

۱. عناصر روی قطر اصلی آن حقیقی و عناصر روی قطر فرعی آن مزدوج مختلط یکدیگر باشند.

۲. رد یا Trace آن صفر شود.

۳. دترمینان آن برابر ۱- شود.

(ب)

$$M_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

هر سه ماتریس M_1 ، M_2 و M_3 هرمیتی یونیتاری هستند زیرا شروط قید شده در بند (آ) را ارضا می‌کنند.

تمرین ۲-۳۹

دو ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}$$

(آ) آیا این ماتریس‌ها هرمیتی هستند؟

(ب) وارون‌های این ماتریس‌ها را حساب کنید.

(پ) آیا این ماتریس‌ها یکانی هستند؟

(ت) ثابت کنید که دترمینان‌های A و B به شکل $e^{i\theta}$ هستند. مقادیر متناظر با θ را پیدا کنید.

حل:

(آ)

$$A^\dagger = (A^T)^* = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \neq A$$

$$B^\dagger = (B^T)^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix} \neq B$$

پس هیچ یک از A و B هرمیتی نیست.
(ب)

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}}{\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{i}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = A^\dagger$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & -\frac{1-i}{2} \\ -\frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}}{\left(\frac{1+i}{2}\right)^2 - \left(\frac{1-i}{2}\right)^2} = \begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & +\frac{i+1}{2} \\ \frac{i+1}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix} = B^\dagger$$

(پ)

طبق قسمت (ب)، A و B هر دو یکانی هستند.

(ت)


$$\det(A) = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

$$\det(B) = i = e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

تمرین ۲-۴۰

نشان دهید که ماتریس تبدیل نمایشگر چرخش پادساعتگرد 90° حول محور z از بردارهای پایه‌ی $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ به صورت زیر است:

$$U = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



حل:

فرض می‌کنیم بردار مکان $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ پس از دوران به اندازه 90° حول محور z به بردار $\vec{r}' = x'\hat{i} + y'\hat{j} + z'\hat{k}$ تبدیل شود. برای این عمل دوران، ماتریس U را در نظر می‌گیریم به‌طوری که:

$$\vec{r}' = U\vec{r}$$

یا:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ U_{21} & U_{22} & U_{23} \\ U_{31} & U_{32} & U_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

اما از طرفی می‌دانیم که:

$$x' = -y$$

$$y' = x$$

$$z' = z$$

پس:

$$U = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

تمرین ۲-۴۱

نشان دهید که ماتریس تبدیل نمایشگر چرخش ساعت گرد 90° حول محور y از بردارهای پایه‌ی $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ به صورت زیر است:

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

حل:

این مسئله مشابه مسئله‌ی قبل است با این تفاوت که داریم:

$$x' = -z$$

$$y' = y$$

$$z' = x$$

و در نتیجه:

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

تمرین ۲-۴۲

نشان دهید که عملگر $(\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X})^2$ برابر است با $(\hat{X}^2\hat{P}^2 + \hat{P}^2\hat{X}^2)$ به اضافی جمله‌ای از مرتبه‌ی $\hbar^2$.

حل:

$$XP - PX = [X, P] = i\hbar$$

$$PX = XP - i\hbar$$

$$(XP + PX)^2 = (XP + XP - i\hbar)^2 = (2XP - i\hbar)^2 = 4XPXP - 4i\hbar XP - \hbar^2$$

$$(XP + PX)^2 = 4X(XP - i\hbar)P - 4i\hbar XP - \hbar^2 = 4X^2P^2 - 4i\hbar XP - \hbar^2$$

$$X^2P^2 - P^2X^2 = [X^2, P^2] = 2i\hbar(XP + PX)$$

از دو خط آخر نتیجه می‌شود که:

$$\begin{aligned} (XP + PX)^2 &= 2X^2P^2 + 2(P^2X^2 + 2i\hbar XP + 2i\hbar PX) - 4i\hbar XP - \hbar^2 \\ &= 2(X^2P^2 + P^2X^2) + 4i\hbar PX - 4i\hbar XP - \hbar^2 \\ &= 2(X^2P^2 + P^2X^2) - 4i\hbar(XP - PX) - \hbar^2 \\ &= 2(X^2P^2 + P^2X^2) - 4i\hbar(i\hbar) - \hbar^2 = 2(X^2P^2 + P^2X^2) + 2\hbar^2 \end{aligned}$$

تمرین ۲-۴۳

دو ماتریس $A = \begin{pmatrix} 4 & i & 7 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix}$ و $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & i & 0 \\ -i & 0 & i \end{pmatrix}$ را در نظر بگیرید. حاصل ضرب‌های $B^{-1}A$ و AB^{-1} را حساب کنید. آیا با هم برابرند؟ اهمیت این نتیجه در چیست؟

حل:

با توجه به رابطه‌ی ۱۹۰-۲ داریم:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 6 & i \\ i & -4i & 2 \\ 1 & -4 & -i \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -i & -i \\ 0 & 2i & 0 \\ -1 & -i & i \end{pmatrix}$$

و لذا

$$B^{-1}A = \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -i & -i \\ 0 & 2i & 0 \\ -1 & -i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & i & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{2}i & i & 2 + \frac{1}{2}i \\ -i & 0 & -i \\ 2 + \frac{i}{2} & 0 & 2 + \frac{1}{2}i \end{pmatrix}$$

$$AB^{-1} = \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} 4 & i & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -i & -i \\ 0 & 2i & 0 \\ -1 & -i & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{2} & 1 + \frac{11}{2}i & -\frac{3}{2}i \\ 1 & i & 0 \\ -\frac{1}{2}i & \frac{1}{2} - i & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

ملاحظه می‌شود که $B^{-1}A$ و AB^{-1} معادل نمی‌باشند. اهمیت این در آن است که:

$$\frac{A}{B} = AB^{-1} \neq B^{-1}A$$

تمرین ۲-۴۴

رابطه‌های فهرست شده در پیوست (آ) را برای محاسبه‌ی انتگرال‌های دربرگیرنده‌ی تابع دلتای دیراک زیر به کار گیرید:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(3x) \cos^2(x) \delta(x - \pi/2) dx \quad (\text{آ})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{yx+y} \delta(\Delta x) dx \quad (\text{ب})$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(\theta/2) \delta''(\theta + \pi) d\theta \quad (\text{پ})$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 \theta \delta[(\theta - \pi)/2] d\theta \quad (\text{ت})$$

حل:

(آ)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(3x) \cos^2(x) \delta\left(x - \frac{\pi}{2}\right) dx = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

(ب)

$$\int_{-\tau}^{\tau} e^{vx+\tau} \delta(x) dx = \frac{1}{\Delta} \int_{-\tau}^{\tau} e^{vx+\tau} \delta(x) dx = \frac{1}{\Delta} e^{v(\cdot)+\tau} = \frac{1}{\Delta} e^{\tau}$$

(پ)

$$\int_{-\tau\pi}^{\tau\pi} \sin\left(\frac{\theta}{\tau}\right) \delta''(\theta + \pi) d\theta = \int_{-\tau\pi}^{\tau\pi} f(\theta) \delta''(\theta + \pi) d\theta = f''(-\pi)$$

در اینجا $f(\theta)$ را به صورت زیر تعریف کرده ایم:

$$f(\theta) = \sin\left(\frac{\theta}{\tau}\right)$$

پس:

$$f''(\theta) = -\frac{1}{\tau} \sin\left(\frac{\theta}{\tau}\right)$$

و لذا:

$$\int_{-\tau\pi}^{\tau\pi} \sin\left(\frac{\theta}{\tau}\right) \delta''(\theta + \pi) d\theta = -\frac{1}{\tau} \sin\left(-\frac{\pi}{\tau}\right) = \frac{1}{\tau}$$

(ت)

$$\int_{-\tau\pi}^{\tau\pi} \cos^{\tau} \theta \delta\left(\frac{\theta - \pi}{\tau}\right) d\theta = \tau \int_{-\tau\pi}^{\tau\pi} \cos^{\tau} \theta \delta(\theta - \pi) d\theta = \tau \cos^{\tau}(\pi) = \tau$$

تمرین ۲-۴۵

رابطه های فهرست شده در پیوست (آ) را برای محاسبه ی عبارت های زیر به کار بگیرید.

$$\int_{-1}^1 (3x^2 + 2) \delta(x-1) dx \quad (\bar{A})$$

$$(2x^3 - 4x^2 + 1) \delta(x+2) \quad (\text{ب})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\Delta x^2 - 7x^2 - 3) \delta(x^2 - 4) dx \quad (\text{پ})$$

حل:

(آ)

$$\int_{-1}^1 (3x^2 + 2) \delta(x-1) dx = 3(1)^2 + 2 = 5$$

(ب)

$$(2x^3 - 4x^2 + 1) \delta(x+2) = \left[2(-2)^3 - 4(-2)^2 + 1 \right] \delta(x+2) = -31 \delta(x+2)$$

(ب)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} (\delta x^r - v x^r - r) \delta(x^r - r) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} (\delta x^r - v x^r - r) \frac{1}{r(r)} [\delta(x - r) + \delta(x + r)] dx \\ &= \frac{1}{r} \int_{-\infty}^{+\infty} (\delta x^r - v x^r - r) \delta(x - r) dx = \frac{1}{r} [\delta(r)^r - v(r)^r - r] \\ &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

تمرین ۲-۴۶

رابطه‌های فهرست شده در پیوست (آ) را برای محاسبه‌ی عبارت‌های زیر به کار بگیرید.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\epsilon x - r} \delta(-\epsilon x) dx \quad (\bar{A})$$

$$\cos(r\theta) \sin(\theta) \delta\left(\theta^r - \pi^r / r\right) \quad (\text{ب})$$

$$\int_{-1}^1 e^{\delta x - 1} \delta'''(x) dx \quad (\text{پ})$$

حل:

(آ)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\epsilon x - r} \delta(-\epsilon x) dx = \frac{1}{r} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\epsilon x - r} \delta(x) dx = 0$$

(ب)

$$\begin{aligned} \cos(r\theta) \sin \theta \delta\left(\theta^r - \frac{\pi^r}{r}\right) &= \cos(r\theta) \sin(\theta) \frac{1}{r\left(\frac{\pi}{r}\right)} \left[\delta\left(\theta - \frac{\pi}{r}\right) + \delta\left(\theta + \frac{\pi}{r}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\cos\left(\frac{r\pi}{r}\right) \sin\left(\frac{\pi}{r}\right) \delta\left(\theta - \frac{\pi}{r}\right) + \cos\left(\frac{-r\pi}{r}\right) \sin\left(\frac{-\pi}{r}\right) \delta\left(\theta + \frac{\pi}{r}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\delta\left(\theta - \frac{\pi}{r}\right) + \delta\left(\theta + \frac{\pi}{r}\right) \right] \end{aligned}$$

(پ)

$$\int_{-1}^{+1} e^{\delta x - 1} \delta'''(x) dx = (-1)^r \left[e^{\delta(x-1)} \right]_{x=0}''' = -\delta^r e^{\delta(0-1)} = -12\delta e^{-\delta}$$

تمرین ۲-۴۷

اگر عملگرهای مکان و اندازه حرکت به ترتیب با $\hat{R}$ و $\hat{P}$ نمایش داده شوند، نشان دهید که $\hat{P}^\dagger \hat{R}^n \hat{P} = (-1)^n \hat{P}^n$ و $\hat{P}^\dagger \hat{P}^n \hat{P} = (-1)^n \hat{P}^n$ که در آن $\mathcal{P}$ یک عملگر پاریته و n عدد صحیح

برای جلوگیری از خطا، عملگر یاریده را با $\hat{\pi}$ نشان می‌دهیم.

$$\hat{\pi}^\dagger \hat{R} \hat{\pi} = \hat{\pi}^\dagger (-\hat{\pi} \hat{R}) = -(\hat{\pi}^\dagger \hat{\pi}) \hat{R} = -\hat{R}$$

لذا:

$$\hat{\pi}^\dagger \hat{R}^n \hat{\pi} = \hat{\pi}^\dagger \hat{R} \hat{\pi} \hat{\pi}^\dagger \hat{R} \hat{\pi} \hat{\pi}^\dagger \hat{R} \hat{\pi} \dots \hat{\pi}^\dagger \hat{R} \hat{\pi} = (\hat{\pi}^\dagger \hat{R} \hat{\pi})^n = (-\hat{R})^n = (-1)^n \hat{R}^n$$

و به همین ترتیب می‌توان نشان داد که:

$$\hat{\pi}^\dagger \hat{P}^n \hat{\pi} = (-1)^n \hat{P}^n$$

تمرین ۲-۴۸

عملگر $\hat{A} = |\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - |\phi_1\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1| - |\phi_r\rangle\langle\phi_1|$ را در نظر بگیرید که در آن $|\phi_1\rangle, |\phi_r\rangle, |\phi_l\rangle$ یک پایه‌ی کامل و متعامد - بهنجار تشکیل می‌دهند.

(آ) آیا $\hat{A}$ هرمیتی است؟ $\hat{A}^\dagger$ را محاسبه کنید. آیا $\hat{A}^\dagger$ عملگری تصویری است؟

(ب) ماتریس 3×3 نمایش دهنده‌ی $\hat{A}$ در پایه‌ی $|\phi_l\rangle, |\phi_r\rangle, |\phi_1\rangle$ را بیابید.

(پ) ویژه‌مقدارها و ویژه بردارهای ماتریس $\hat{A}$ را پیدا کنید.

حل:

(آ)

برای بدست آوردن $\hat{A}^\dagger$ از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$(C|\phi_i\rangle\langle\phi_j|)^\dagger = C^*|\phi_j\rangle\langle\phi_i|$$

پس:

$$\hat{A}^\dagger = |\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_l\rangle\langle\phi_1| - |\phi_r\rangle\langle\phi_1| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - |\phi_1\rangle\langle\phi_r| = \hat{A}$$

پس $\hat{A}$ هرمیتی است.

برای محاسبه $\hat{A}^\dagger$ از رابطه $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$ استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \hat{A}^\dagger &= (|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - |\phi_1\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1| - |\phi_r\rangle\langle\phi_1|) \\ &\quad \times (|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - |\phi_1\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1| - |\phi_r\rangle\langle\phi_1|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= |\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + |\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_r| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r| \\
&\quad - |\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_1| - |\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + \dots + |\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + \dots + \dots \\
&\quad + i|\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + \dots + \dots + |\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + \dots + \dots - |\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + \dots \\
&\quad - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + \dots + \dots - i^r|\phi_1\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + \dots + \dots - |\phi_1\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + \dots + \dots \\
&\quad + \dots + |\phi_1\rangle\langle\phi_r|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + \dots + \dots - i^r|\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - i|\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r| \\
&\quad + \dots + \dots - |\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + \dots + \dots + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r| + \dots + \dots = |\phi_1\rangle\langle\phi_1| \\
&\quad - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - |\phi_1\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| - |\phi_r\rangle\langle\phi_1| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| + |\phi_1\rangle\langle\phi_1| \\
&\quad - |\phi_1\rangle\langle\phi_r| + |\phi_1\rangle\langle\phi_1| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| - i|\phi_r\rangle\langle\phi_r| - |\phi_r\rangle\langle\phi_1| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + |\phi_r\rangle\langle\phi_r| \\
&= 2|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - 2i|\phi_1\rangle\langle\phi_r| - 2|\phi_1\rangle\langle\phi_r| + 2|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + 2i|\phi_r\rangle\langle\phi_1| + 2|\phi_r\rangle\langle\phi_r| - 2|\phi_r\rangle\langle\phi_1| \\
&\quad - i|\phi_r\rangle\langle\phi_r| + i|\phi_r\rangle\langle\phi_r| \neq A
\end{aligned}$$

پس $\hat{A}$ یک عملگر تصویری نیست.

(ب)

$$A_{ij} = \langle\phi_i|A|\phi_j\rangle$$

$$\begin{aligned}
A_{11} &= \langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle + \langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_1\rangle + \langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_r|\phi_1\rangle - i\langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r|\phi_1\rangle - \langle\phi_1|\phi_1\rangle\langle\phi_r|\phi_1\rangle \\
&\quad + i\langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle - \langle\phi_1|\phi_r\rangle\langle\phi_1|\phi_1\rangle = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
\end{aligned}$$

به همین ترتیب می توان مابقی A_{ij} ها را به دست آورد، خواهیم داشت:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -i & -1 \\ i & 1 & 0 \\ -1 & 0 & +1 \end{pmatrix}$$

حال روش دومی را برای بررسی اینکه $\hat{A}$ عملگر تصویری است ارائه می دهیم و از نمایش ماتریسی A استفاده می کنیم.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -i & -1 \\ i & 1 & 0 \\ -1 & 0 & +1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i & -1 \\ i & 1 & 0 \\ -1 & 0 & +1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2i & -2 \\ 2i & 2 & -i \\ -2 & i & 2 \end{pmatrix} \neq A$$

(ب)

$$\det(A - a) = \begin{vmatrix} 1-a & -i & -1 \\ i & 1-a & 0 \\ -1 & 0 & 1-a \end{vmatrix} = (1-a)^2 - 2(1-a) = (1-a)[(1-a) - 2] = 0.$$

از حل این معادله، مقادیر ۱ و $1 \pm \sqrt{2}$ برای a به دست می آیند.
برای $a = 1$ داریم:

$$\begin{pmatrix} 1 & -i & -1 \\ i & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$x - iy - z = x$$

$$ix + y = y$$

$$-x + z = z$$

یا:

$$x = 0, z = -iy$$

پس $|a_1 = 1\rangle$ بهنجار شده عبارت خواهد بود از:

$$|a_1 = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

برای $a = 1 \pm \sqrt{2}$ خواهیم داشت:

$$|a_r = 1 + \sqrt{2}\rangle = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ i \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |a_r = 1 - \sqrt{2}\rangle = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

تمرین ۲-۴۹

همیلتونی یک سیستم دو حالت به صورت زیر است:

$$\hat{H} = E(|\phi\rangle\langle\phi| - |\phi\rangle\langle\phi| - i|\phi\rangle\langle\phi| + i|\phi\rangle\langle\phi|)$$

که در آن $|\phi\rangle$ و $|\phi\rangle$ یک پایه کامل و متعامد بهنجار را تشکیل می دهند. E یک ثابت حقیقی دارای بعد انرژی است.

(آ) آیا $\hat{H}$ هرمیتی است؟ رد $\hat{H}$ را محاسبه کنید.

(ب) ماتریس متناظر با $\hat{H}$ را در پایه‌ی $|\phi_1\rangle$ و $|\phi_2\rangle$ بیابید و ویژه‌مقادیرها و ویژه‌بردارهای آن را محاسبه کنید. رد ماتریس را حساب کنید و آن را با نتیجه به دست آمده در (آ) مقایسه کنید.

(پ) $[\hat{H}, |\phi_1\rangle\langle\phi_1|]$ و $[\hat{H}, |\phi_2\rangle\langle\phi_2|]$ را محاسبه کنید.

حل:

(آ)

$$H^\dagger = E(|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_2\rangle\langle\phi_2| + i|\phi_2\rangle\langle\phi_1| - i|\phi_1\rangle\langle\phi_2|) = H$$

پس H هرمیتی است.

$$\text{Tr}(H) = \langle\phi_1|H|\phi_1\rangle + \langle\phi_2|H|\phi_2\rangle = E - E = 0.$$

(ب)

$$H_{ij} = \langle\phi_i|H|\phi_j\rangle$$

$$H = E \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix}$$

می‌بینیم که H قطری نیست؛ اما با تغییر پایه‌های فضا می‌توان آن را قطری کرد. تبدیلی که تحت آن پایه‌های فضا تغییر می‌نماید، رد و دترمینان ماتریس‌ها را تغییر نمی‌دهد. چون اگر H در پایه‌های خودش نوشته شود به شکل زیر خواهد بود:

$$H = \begin{pmatrix} h_1 & 0 \\ 0 & h_2 \end{pmatrix}$$

که h_1 و h_2 ویژه‌مقادیر آن می‌باشند. پس می‌توان گفت:

$$\text{Tr}(H) = h_1 + h_2 = 0.$$

$$\det(H) = h_1 h_2 = -2E^2$$

پس:

$$h_1 = -h_2 = E\sqrt{2}$$

حال ویژه‌بردارهای H ، یعنی $|h_1\rangle$ و $|h_2\rangle$ را می‌یابیم:

$$H|h_1\rangle = h_1|h_1\rangle$$

$$E \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = E\sqrt{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$x - iy = x\sqrt{2}$$

$$y = ix(\sqrt{2} - 1)$$

پس چون $|x|^2 + |y|^2 = 1$ ، لذا:

$$|h_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} -1 \\ i(\sqrt{2} - 2) \end{pmatrix}$$

به همین ترتیب داریم:

$$|h_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i(1 + \sqrt{2}) \end{pmatrix}$$

(پ)

$$|\phi_1\rangle\langle\phi_1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, |\phi_2\rangle\langle\phi_2| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, |\phi_1\rangle\langle\phi_2| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} [H, |\phi_1\rangle\langle\phi_1|] &= H|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_1\rangle\langle\phi_1|H = E \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - E \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \\ &= E \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 0 \end{pmatrix} + E \begin{pmatrix} -1 & +i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = iE(|\phi_1\rangle\langle\phi_2| + |\phi_2\rangle\langle\phi_1|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [H, |\phi_2\rangle\langle\phi_2|] &= E \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - E \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} 0 & -i \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + E \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -i & +1 \end{pmatrix} \\ &= E \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -iE(|\phi_1\rangle\langle\phi_2| + |\phi_2\rangle\langle\phi_1|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [H, |\phi_1\rangle\langle\phi_2|] &= E \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - E \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix} + E \begin{pmatrix} -i & +1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} -i & 2 \\ 0 & i \end{pmatrix} \\ &= E(-i|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + 2|\phi_1\rangle\langle\phi_2| + i|\phi_2\rangle\langle\phi_2|) \end{aligned}$$

تمرین ۲-۵۰

ذره‌ای را در نظر بگیرید که محدود به حرکت در راستای مثبت محور x است و هامیلتونی آن $\hat{H} = -\epsilon d^2/dx^2$ است که در آن ϵ یک ثابت مثبت حقیقی دارای بعد انرژی است.

(آ) تابع موج متناظر با ویژه مقدار انرژی ۹ ϵ را بیابید. (مطمئن شوید تابعی که پیدا می کنید در همه جای راستای مثبت محور x متناهی و انتگرال پذیر مجذوری است). این تابع موج را بهنجار کنید.

(ب) احتمال یافتن ذره را در ناحیه $0 \leq x \leq 15$ حساب کنید.

(پ) آیا تابع موج به دست آمده در (آ) ویژه تابعی از عملگر $\hat{A} = \frac{d}{dx} - 7$ است؟

(ت) جابه‌جاگر $[\hat{H}, \hat{A}]$ را محاسبه کنید.

حل:

(ا)

اگر ویژه تابع انرژی متناظر با ویژه مقدار ϵ عملگر هامیلتونی را با $\psi_{\epsilon}(x)$ نشان دهیم، داریم:

$$\hat{H}\psi_{\epsilon}(x) = \epsilon\psi_{\epsilon}(x)$$

و:

$$\epsilon \frac{d^2}{dx^2} \psi_{\epsilon}(x) = \epsilon\psi_{\epsilon}(x)$$

و یا:

$$\frac{d^2 \psi_{\epsilon}(x)}{dx^2} - \psi_{\epsilon}(x) = 0$$

در نتیجه:

$$\psi_{\epsilon}(x) = e^{\pm \sqrt{\epsilon} x}$$

از آنجا که $\psi_{\epsilon}(x)$ باید در $x=0$ پیوسته و در $x \rightarrow \pm\infty$ متناهی باشد، در نتیجه:

$$\psi_{\epsilon}(x) = \begin{cases} A e^{\sqrt{\epsilon} x} & ; x < 0 \\ A e^{-\sqrt{\epsilon} x} & ; x > 0 \end{cases}$$

از بهنجارش $\psi_{\epsilon}(x)$ ، A را می‌یابیم:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_{\epsilon}(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\epsilon x} dx + |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\epsilon x} dx = \frac{|A|^2}{\epsilon} \left\{ [e^{\epsilon x}]_{-\infty}^0 - [e^{\epsilon x}]_{-\infty}^{+\infty} \right\} \\ &= \frac{|A|^2}{\epsilon} (1 + 1) = \frac{|A|^2}{\epsilon} \end{aligned}$$

با فرض حقیقی بودن و مثبت بودن A خواهیم داشت:

$$A = \sqrt{\epsilon}$$

(ب)

$$P = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \epsilon \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\epsilon x} dx = -\frac{\epsilon}{\epsilon} [e^{-\epsilon x}]_{-\infty}^{+\infty} = -\frac{1}{\epsilon} (e^{-\epsilon \cdot 0} - 1) \simeq 50\%$$

(پ)

$$\hat{A}\psi_{\epsilon}(x) = \left(\frac{d}{dx} - \gamma \right) \psi_{\epsilon}(x) = \left(\frac{d}{dx} - \gamma \right) A \begin{cases} e^{\sqrt{\epsilon} x} & ; x < 0 \\ e^{-\sqrt{\epsilon} x} & ; x > 0 \end{cases} = A \begin{cases} -\sqrt{\epsilon} e^{\sqrt{\epsilon} x} & ; x < 0 \\ -\sqrt{\epsilon} e^{-\sqrt{\epsilon} x} & ; x > 0 \end{cases}$$

پس $\psi_{\epsilon}(x)$ ویژه تابع $\hat{A}$ نیست.

(ت)

$$[\hat{H}, \hat{A}] = \left[\varepsilon \frac{d^2}{dx^2}, \frac{d}{dx} - \gamma \right] = \varepsilon \left[\frac{d^2}{dx^2}, \frac{d}{dx} \right] + \varepsilon \left[\frac{d^2}{dx^2}, -\gamma \right] = 0$$

تمرین ۲-۵۱

توابع موج زیر را در نظر بگیرید:

$$\psi(x, y) = \sin \gamma x \cos \Delta y, \quad \phi(x, y) = e^{-\gamma(x^2 + y^2)}, \quad \chi(x, y) = e^{-i(x+y)}$$

(آ) آیا این توابع موج، ویژه تابعی از $\hat{A} = \partial/\partial x + \partial/\partial y$ هستند یا نه؟(ب) آیا این توابع موج ویژه تابعی از $\hat{B} = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + 1$ هستند یا نه؟(پ) اثر $\hat{A}\hat{B}$ و $\hat{B}\hat{A}$ را روی هریک از این توابع موج محاسبه کرده و $[\hat{A}, \hat{B}]$ را نتیجه بگیرید.

حل:

(آ)

$$\hat{A}\psi(x, y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x, y) = \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial y}$$

$$= \gamma \cos \gamma x \cos \Delta y - \Delta \sin \gamma x \sin \Delta y$$

$$\hat{A}\phi(x, y) = \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial y} = -\gamma x e^{-\gamma(x^2 + y^2)} - \gamma y e^{-\gamma(x^2 + y^2)} = -\gamma(x+y) \phi(x, y)$$

$$\hat{A}\phi(x, y) = \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial y} = -\gamma x e^{-\gamma(x^2 + y^2)} - \gamma y e^{-\gamma(x^2 + y^2)} = -\gamma(x+y) \phi(x, y)$$

$$\hat{A}\chi(x, y) = \frac{\partial \chi(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial \chi(x, y)}{\partial y} = -ie^{-i(x+y)} - ie^{-i(x+y)} = -2ie^{-i(x+y)} = -2i\chi(x, y)$$

پس فقط $\chi(x, y)$ ویژه تابع عملگر $\hat{A}$ می باشد.

(ب)

$$\hat{B}\psi(x, y) = \frac{\partial^2 \psi(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi(x, y)}{\partial y^2} + \psi(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (\gamma \cos \gamma x \cos \Delta y) + \frac{\partial}{\partial y} (-\Delta \sin \gamma x \sin \Delta y)$$

$$+ \sin \gamma x \cos \Delta y = -\gamma \sin \gamma x \cos \Delta y - \gamma \Delta \sin \gamma x \cos \Delta y + \sin \gamma x \cos \Delta y$$

$$= -\gamma \Delta \sin \gamma x \cos \Delta y = -\gamma \Delta \psi(x, y)$$

$$\hat{B}\phi(x, y) = \frac{\partial^2 \phi(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi(x, y)}{\partial y^2} + \phi(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\gamma x e^{-\gamma(x^2 + y^2)} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\gamma y e^{-\gamma(x^2 + y^2)} \right)$$

$$+e^{-\sqrt{x^2+y^2}} = -\sqrt{x^2+y^2} e^{-\sqrt{x^2+y^2}} + 16x^2 e^{-\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2} e^{-\sqrt{x^2+y^2}} + 16y^2 e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$+e^{-\sqrt{x^2+y^2}} = (16x^2 + 16y^2 - \sqrt{x^2+y^2}) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} = (16x^2 + 16y^2 - \sqrt{x^2+y^2}) \phi(x, y)$$

$$\hat{B}\chi(x, y) = -e^{-\sqrt{x^2+y^2}} - e^{-\sqrt{x^2+y^2}} + e^{-\sqrt{x^2+y^2}} = -e^{-\sqrt{x^2+y^2}} = -\chi(x, y)$$

پس در اینجا $\psi(x, y)$ و $\chi(x, y)$ ویژه تابع عملگر $\hat{B}$ هستند.

(ب)

$$\hat{A}\hat{B}\psi(x, y) = \hat{A}(-2\lambda\psi(x, y)) = -2\lambda\hat{A}\psi(x, y) = -\Delta\psi \cos 2x \cos \Delta y + 14 \cdot \sin 2x \sin \Delta y$$

$$\hat{B}\hat{A}\psi(x, y) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 1 \right) (\sqrt{x^2+y^2} \cos 2x \cos \Delta y - \Delta \sin 2x \sin \Delta y)$$

$$= -\lambda \cos 2x \cos \Delta y + 2 \cdot \sin 2x \sin \Delta y - \Delta \cdot \cos 2x \cos \Delta y + 12 \Delta \sin 2x \cos \Delta y$$

$$+ 2 \cos 2x \cos \Delta y - \Delta \sin 2x \sin \Delta y = -\Delta \cos 2x \cos \Delta y + 14 \cdot \sin 2x \sin \Delta y$$

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{B}\phi(x, y) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \right) \left[(16x^2 + 16y^2 - \sqrt{x^2+y^2}) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \right] \\ &= 32x e^{-\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2} e^{-\sqrt{x^2+y^2}} (16x^2 + 16y^2 - \sqrt{x^2+y^2}) + 32y e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \\ &\quad - \sqrt{x^2+y^2} e^{-\sqrt{x^2+y^2}} (16x^2 + 16y^2 - \sqrt{x^2+y^2}) = \sqrt{x^2+y^2} (x+y) (-16x^2 - 16y^2 + 1\Delta) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{B}\hat{A}\phi(x, y) &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 1 \right) \left[-\sqrt{x^2+y^2} (x+y) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left[-\sqrt{x^2+y^2} e^{-\sqrt{x^2+y^2}} + 16x(x+y) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \right] \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial y} \left[-\sqrt{x^2+y^2} e^{-\sqrt{x^2+y^2}} + 16y(x+y) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \right] - \sqrt{x^2+y^2} (x+y) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= 16(\sqrt{x^2+y^2} (x+y) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2} (16x^2 + 16xy - \sqrt{x^2+y^2}) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \\ &\quad + 16(\sqrt{x^2+y^2} (y+x) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2} (16y^2 + 16xy - \sqrt{x^2+y^2}) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \\ &\quad - \sqrt{x^2+y^2} (x+y) e^{-\sqrt{x^2+y^2}}) = \sqrt{x^2+y^2} (x+y) (-16x^2 - 16y^2 + 1\Delta) e^{-\sqrt{x^2+y^2}} \end{aligned}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}]\phi(x, y) = \hat{A}\hat{B}\phi(x, y) - \hat{B}\hat{A}\phi(x, y) = 0$$

و به همین ترتیب:

$$[\hat{A}, \hat{B}] \chi(x, y) = 0$$

زیرا در حالت کلی $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ و دلیل آن نیز این است که:

$$\left[\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^m, \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^n \right] = 0$$

$$\left[\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^m, \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^n \right] = 0$$

$$[A, B] = \left[\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial^r}{\partial x^r} + \frac{\partial^r}{\partial y^r} + 1 \right] = \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial^r}{\partial x^r} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial^r}{\partial y^r} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x}, 1 \right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial^r}{\partial x^r} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial^r}{\partial y^r} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial y}, 1 \right] = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

تمرین ۲-۵۲

(آ) آیا حالت $\psi(\theta, \phi) = e^{-r i \phi} \cos \theta$ ویژه تابعی از $\hat{A}_\phi = \partial / \partial \phi$ یا $\hat{B}_\theta = \partial / \partial \theta$ است یا نه؟

(ب) آیا $\hat{A}_\phi$ و $\hat{B}_\theta$ هرمیتی هستند؟

(پ) عبارت‌های $\langle \psi | \hat{A}_\phi | \psi \rangle$ و $\langle \psi | \hat{B}_\theta | \psi \rangle$ را حساب کنید.

(ت) جابجاگر $[\hat{A}_\phi, \hat{B}_\theta]$ را بیابید.

حل:

(آ)

$$\hat{A}_\phi \psi(\theta, \phi) = \frac{\partial}{\partial \phi} [e^{-r i \phi} \cos \theta] = -r i e^{-r i \phi} \cos \theta = -r i \psi(\theta, \phi)$$

$$\hat{B}_\theta \psi(\theta, \phi) = \frac{\partial}{\partial \theta} [e^{-r i \phi} \cos \theta] = -e^{-r i \phi} \sin \theta$$

بنابراین $\psi(\theta, \phi)$ ویژه تابع $\hat{A}_\phi$ هست اما ویژه تابع $\hat{B}_\theta$ نمی‌باشد.

(ب)

در مختصات قطبی (r, θ, ϕ) داریم:

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

بنابراین:

$$\frac{\partial}{\partial f} = \frac{\partial x}{\partial f} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial f} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial f} \frac{\partial}{\partial z} = (-r \sin \theta \sin \phi) \frac{\partial}{\partial x} + (r \sin \theta \cos \phi) \frac{\partial}{\partial y} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$$

با توجه به اینکه:

$$\left[y, \frac{\partial}{\partial x} \right] = \left[x, \frac{\partial}{\partial y} \right] = 0$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\dagger = -\frac{\partial}{\partial x}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^\dagger = -\frac{\partial}{\partial y}$$

داریم:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \phi} \right)^\dagger = -\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\dagger y^\dagger + \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^\dagger x^\dagger = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) y - \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) x = y \frac{\partial}{\partial y} - x \frac{\partial}{\partial x}$$

از آنجا که ویژه مقدار آن حقیقی نیست پس هرمیتی نیست.

پس $\frac{\partial}{\partial \phi}$ پاد هرمیتی است.

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial z} = -r \sin \theta \frac{\partial}{\partial z} = -\sqrt{x^2 + y^2} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \right)^\dagger = -\left(\frac{\partial}{\partial z} \right)^\dagger \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)^\dagger = -\left(\frac{-\partial}{\partial z} \right) \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right) = +\sqrt{x^2 + y^2} \frac{\partial}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial \theta}$$

پس $\frac{\partial}{\partial \theta}$ نیز پاد هرمیتی است.

(پ)

$$\langle \psi | \hat{A}_\phi | \psi \rangle = \langle \psi | -ri | \psi \rangle = -ri \langle \psi | \psi \rangle = -ri$$

برای یافتن $\langle \hat{B}_\theta \rangle$ ، ابتدا $\psi(\theta, \phi)$ را بهنجار می‌کنیم.

$$\psi(r, \theta, \phi) = f(r) e^{-ri\phi} \cos \theta$$

$$\psi^*(r, \theta, \phi) = f^*(r) e^{ri\phi} \cos \theta$$

$$\int_V \psi(r, \theta, \phi) \psi^*(r, \theta, \phi) dv = \int_0^{+\infty} |f(r)|^2 r^2 dr \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$= 2\pi \left(\frac{-1}{3} \cos^3 \theta \right) \int_0^{+\infty} r^2 |f(r)|^2 dr = \frac{4\pi}{3} \int_0^{+\infty} r^2 |f(r)|^2 dr = 1$$

$$\langle \psi | \hat{B}_\theta | \psi \rangle = \int_V dV \psi^*(r, \theta, \phi) \hat{B}_\theta \psi(r, \theta, \phi) = \int_V dV f^*(r) e^{+ri\phi} \cos \theta f(r) e^{-ri\phi} (-\sin \theta)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} r^r |f(r)|^r dr \int_{-\pi}^{+\pi} d\phi \int_{-\pi}^{+\pi} (-\sin^r \theta \cos \theta) d\theta = \frac{r}{4\pi} (2\pi) \left(\frac{-1}{r} \sin^r \theta \right) \Big|_{-\pi}^{+\pi} = 0.$$

(ت)

$$[\hat{A}_\phi, \hat{B}_\theta] = \hat{A}_\phi \hat{B}_\theta - \hat{B}_\theta \hat{A}_\phi = \frac{\partial}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} = \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \theta} - \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \theta} = 0.$$

منظور از W در $\int_W$ ، تمام فضا است.

تمرین ۲-۵۳

عملگر $\hat{A} = (\hat{X} \frac{d}{dx} + 2)$ را در نظر بگیرید.

(آ) ویژه تابع $\hat{A}$ متناظر با ویژه مقدار صفر را بیابید. آیا این تابع بهنجارشده است؟

(ب) آیا عملگر $\hat{A}$ هرمیتی است؟

(پ) $[\hat{X}, [\hat{A}, \hat{X}]]$ ، $[\hat{A}, d/dx]$ ، $[\hat{A}, d^2/dx^2]$ و $[d/dx, [\hat{A}, d/dx]]$ را محاسبه کنید.

حل:

$$\hat{A}\psi(x) = 0 \cdot \psi(x)$$

$$\left(\hat{X} \frac{d}{dx} + 2 \right) \psi(x) = x \frac{d\psi(x)}{dx} + 2\psi(x) = 0.$$

$$\frac{d\psi(x)}{\psi(x)} = -\frac{2dx}{x}$$

$$\ln \psi(x) = -2 \ln x + \ln c = \ln \frac{c}{x^2}$$

$$\psi(x) = \frac{c}{x^2}$$

حال $\psi(x)$ را بهنجار می‌کنیم.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|c|^2}{x^4} dx = |c|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4} = |c|^2 \left[\frac{-1}{3x^3} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 1$$

$$|c|^2 = \frac{1}{\left[\frac{-1}{3x^3} \right]_{-\infty}^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

$$|c| = 0.$$

بنابراین $\psi(x)$ قابل بهنجار شدن نیست.

(ب)

$$A^\dagger = \left(\hat{X} \frac{d}{dx} + \gamma \right)^\dagger = \left(\frac{d}{dx} \right)^\dagger \hat{X}^\dagger + \gamma = - \left(\frac{d}{dx} \right) X + \gamma \neq A^\dagger$$

پس $\hat{A}$ هرمیتی نیست.

(پ)

$$\hat{P} = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{i}{\hbar} \hat{P}$$

$$A = \frac{i}{\hbar} \hat{X} \hat{P} + \gamma$$

$$[\hat{A}, \hat{X}] = \left[\frac{i}{\hbar} \hat{X} \hat{P} + \gamma, \hat{X} \right] = \frac{i}{\hbar} [\hat{X} \hat{P}, \hat{X}] = \frac{i}{\hbar} (-i \hbar X) = \hat{X}$$

$$\left[\hat{A}, \frac{d}{dx} \right] = \left[\frac{i}{\hbar} \hat{X} \hat{P} + \gamma, \frac{i}{\hbar} \hat{P} \right] = \frac{i}{\hbar} [\hat{X} \hat{P}, \hat{P}] = \frac{-i}{\hbar} \hat{X} \hbar P = \frac{-i P}{\hbar} = \frac{-i \hbar}{\hbar} \frac{d}{dx} = - \frac{d}{dx}$$

$$\left[A, \frac{d^2}{dx^2} \right] = \left[\frac{i}{\hbar} \hat{X} \hat{P} + \gamma, \frac{-\hat{P}^2}{\hbar^2} \right] = \frac{-i}{\hbar^2} [\hat{X} \hat{P}, P^2] = \frac{-i}{\hbar^2} \gamma i \hbar P^2 = \frac{\gamma}{\hbar^2} \left(-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \right) = -\gamma \frac{d^2}{dx^2}$$

$$[X, [A, \hat{X}]] = [X, X] = 0$$

$$\left[\frac{d}{dx}, \left[A, \frac{d}{dx} \right] \right] = \left[\frac{d}{dx}, -\frac{d}{dx} \right] = 0$$

تمرین ۲-۵۴

اگر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ دو عملگر هرمیتی باشند، ویژه مقادیرهای متناظر آن‌ها را بیابید به طوری که $\hat{A}^\dagger = \gamma \hat{I}$ و $\hat{B}^\dagger = \hat{I}$ که در آن $\hat{I}$ عملگر واحد است.

حل:

اگر $|a\rangle$ ویژه حالت $\hat{A}$ متناظر با ویژه مقدار a باشد داریم:

$$A|a\rangle = a|a\rangle$$

$$A^\dagger|a\rangle = A(A|a\rangle) = A(a|a\rangle) = aA|a\rangle = aa|a\rangle = a^\dagger|a\rangle$$

از طرفی داریم:

$$A^\dagger|a\rangle = \gamma I|a\rangle = \gamma|a\rangle$$

بنابراین:

$$a^\dagger |a\rangle = \tau |a\rangle$$

$$(a^\dagger - \tau) |a\rangle = 0$$

چون $|a\rangle$ برداری غیر صفر است، پس:

$$a^\dagger - \tau = 0$$

$$a = \pm \sqrt{\tau}$$

به همین ترتیب در مورد b ویژه مقادیر عملگر $\hat{B}$ نیز داریم:

$$b^\dagger = 1$$

$$b = \pm 1, \pm i$$

اما چون $\hat{B}$ هرمیتی است، پس ویژه مقادیر آن باید حقیقی باشند و بنابراین فقط $b = \pm 1$ قابل قبول است.

تمرین ۲-۵۵

فضای هیلبرت تابع مختلط دو متغیره $\psi(x, y)$ را در نظر بگیرید. یک عملگر جایگشت به وسیله اثر آن روی $\psi(x, y)$ به این صورت تعریف می شود:

$$\hat{\pi}\psi(x, y) = \psi(y, x)$$

(آ) ثابت کنید که عملگر $\hat{\pi}$ خطی و هرمیتی است.(ب) نشان دهید که $\hat{\pi}^\dagger = \hat{I}$. ویژه مقدارها را بیابید و نشان دهید که ویژه تابع های $\hat{\pi}$ از رابطه زیر به دست می آیند:

$$\psi_+(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi(x, y) + \psi(y, x)] \text{ و } \psi_-(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi(x, y) - \psi(y, x)]$$

حل:
(آ)

$$\begin{aligned} \langle \hat{\pi} \rangle - \langle \hat{\pi} \rangle^* &= \int dx dy \psi^*(x, y) \pi(x, y) - \int \pi \psi(x, y)^* \psi(x, y) dx dy \\ &= \int dx dy \psi^*(x, y) \psi(y, x) - \int \psi^*(y, x) \psi(x, y) dx dy \\ &= \int dx dy \psi^*(x, y) \psi(y, x) - \int \psi^*(x, y) \psi(y, x) dy dx = 0 \end{aligned}$$

پس $\hat{\pi}$ هرمیتی است.

$$\hat{\pi}(c_\psi \psi(x, y) + c_\phi \phi(x, y)) = c_\psi \psi(y, x) + c_\phi \phi(y, x) = c_\psi \hat{\pi} \psi(x, y) + c_\phi \hat{\pi} \phi(x, y)$$

پس $\hat{\pi}$ خطی نیز می باشد.

$$\hat{\pi}^\tau \psi(x, y) = \hat{\pi} \psi(y, x) = \psi(x, y) \quad (\text{ب})$$

پس:

$$\hat{\pi}^\tau = I$$

اگر $|\pi\rangle$ ویژه حالت عملگر $\hat{\pi}$ متناظر با ویژه مقدار π باشد داریم:

$$\hat{\pi}|\pi\rangle = \pi|\pi\rangle$$

$$\hat{\pi}^\tau|\pi\rangle = \pi^\tau|\pi\rangle = |\pi\rangle$$

پس:

$$\pi^\tau = 1$$

$$\pi = \pm 1$$

از طرفی:

$$\hat{\pi}\psi_\pm(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\pi}\psi(x, y) \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\pi}\psi(y, x) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi(y, x) \pm \psi(x, y)] = \pm\psi_\pm(x, y)$$

فصل سوم

اصول موضوعه‌ی مکانیک کوانتومی

تمرین ۱-۳

ذره‌ای در یک جعبه‌ی پتانسیل با دیواره‌هایی در $x=0$ و $x=a$ (پتانسیل برای $x < 0$ و $x > a$ نامتناهی و بین آن‌ها صفر است) در زمان اولیه دارای تابع موج زیر است:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\Delta a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{2}{\sqrt{\Delta a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

(آ) نتایج ممکن اندازه‌گیری انرژی سیستم و احتمال‌های متناظر را بیابید.

(ب) شکل تابع موج را پس از یک چنین اندازه‌گیری‌ای پیدا کنید.

(پ) اگر پس از آن انرژی بی‌درنگ اندازه‌گیری شود، احتمال‌های مربوط به این جواب‌های ممکن

چقدر هستند؟

حل:

در اینجا باید توجه داشته باشیم که ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی یک ذره‌ی محصور در بازه $0 < x < a$ از روابط زیر به دست می‌آید:

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} ; \quad n = 1, 2, \dots$$

(i)

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{10}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{2}{\sqrt{10}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) = \frac{1}{\sqrt{10}} \phi_1(x) + \frac{2}{\sqrt{10}} \phi_2(x)$$

چون $\psi(x)$ بهنجار نیست ابتدا آن را بهنجار می‌کنیم. برای این منظور $\psi(x)$ را بر اندازه‌ی آن یعنی $\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}$ تقسیم می‌کنیم:

$$\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{10}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\psi(x)$ بهنجار شده را $\psi_N(x)$ می‌نامیم. پس:

$$\psi_N(x) = \frac{\psi(x)}{\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}} = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \phi_1(x) + \frac{2}{\sqrt{10}} \phi_2(x) \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \phi_1(x) + \frac{2}{\sqrt{5}} \phi_2(x)$$

در اینجا واضح است که در اندازه‌گیری انرژی مقادیر E_1 و E_2 حاصل می‌شوند و اگر این احتمال‌ها را به ترتیب $P_1(E_1)$ و $P_2(E_2)$ بنامیم، داریم:

$$P_1(E_1) = \left| \langle \phi_1 | \psi_N \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{1}{5}$$

$$P_2(E_2) = \left| \langle \phi_2 | \psi_N \rangle \right|^2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{4}{5}$$

(ب)

اگر پس از اندازه‌گیری انرژی مقدار E_1 حاصل شود، تابع موج سیستم بلافاصله به $\phi_1(x)$ و اگر مقدار E_2 حاصل شود تابع موج آن بلافاصله به $\phi_2(x)$ تغییر می‌نماید.

(پ)

اگر در اندازه‌گیری انرژی مقدار E_1 به دست آید، آنگاه تابع موج سیستم $\phi_1(x)$ است و چون این یک حالت پایدار است لذا در اندازه‌گیری‌های بعدی انرژی نیز همین مقدار حاصل خواهد شد و احتمال اینکه مقدار انرژی E_2 به دست آید صفر است و بالعکس.

تمرین ۲-۳

فرض کنید $\psi_n(x)$ حالت‌های مانای متعامد بهنجار سیستمی با انرژی E_n باشند. اگر تابع موج بهنجار سیستم در زمان $t=0$ ، $\psi(x,0)$ باشد و نیز اندازه‌گیری انرژی سیستم مقادیر E_1 با احتمال $\frac{1}{3}$ ، E_2 با احتمال $\frac{3}{8}$ و E_3 با احتمال $\frac{1}{8}$ به دست آیند:

(آ) کلی‌ترین بسط را برای $\psi(x,0)$ که در برگیرنده‌ی این اطلاعات باشد بنویسید.

(ب) بسط تابع موج سیستم در زمان t ، $(\psi(x, t))$ چیست؟
 (پ) نشان دهید که مقدار چشم‌داشتی هامیلتونی با زمان تغییر نمی‌کند.

حل:
 (آ)

$$P_1(E_1) = \left| \langle \psi_1 | \psi(\cdot) \rangle \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_2(E_2) = \left| \langle \psi_2 | \psi(\cdot) \rangle \right|^2 = \frac{2}{\lambda}$$

$$P_3(E_3) = \left| \langle \psi_3 | \psi(\cdot) \rangle \right|^2 = \frac{1}{\lambda}$$

چون:

$$P_1(E_1) + P_2(E_2) + P_3(E_3) = 1$$

پس:

$$P_n(E_n) = \left| \langle \psi_n | \psi(\cdot) \rangle \right|^2 = 0; \quad n \neq 1 \text{ یا } 2 \text{ یا } 3$$

اما $|\psi(\cdot)\rangle$ را می‌توان بر حسب $|\psi_n\rangle$ ها بسط داد:

$$|\psi(\cdot)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} C_n |\psi_n\rangle$$

که در این رابطه $C_n = \langle \psi_n | \psi(\cdot) \rangle$. پس:

$$|\psi(\cdot)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\psi_1\rangle + \sqrt{\frac{3}{\lambda}} |\psi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} |\psi_3\rangle$$

و یا:

$$|\psi(x, \cdot)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x) + \sqrt{\frac{3}{\lambda}} \psi_2(x) + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \psi_3(x)$$

(ب)

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \psi_1(x) + \sqrt{\frac{3}{\lambda}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \psi_2(x) + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \psi_3(x)$$

در حالت کلی $\psi(x, t) = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \psi(x, \cdot)$ است. اما اگر $\psi(x, \cdot)$ را بر حسب ویژه توابع انرژی بسط دهیم یعنی:

$$\psi(x, \cdot) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \psi_n(x)$$

بدطوری که:

$$\hat{H}\psi_n(x) = E_n \psi_n(x)$$

آنگاه:

$$\psi(x, t) = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \sum C_n \psi_n = \sum C_n e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \psi_n(x) = \sum C_n e^{\frac{-iE_n t}{\hbar}} \psi_n(x)$$

(پ)

$$E(\cdot) = \sum P_n(E_n) E_n = P_1 E_1 + P_2 E_2 + P_3 E_3 = \frac{1}{2} E_1 + \frac{3}{4} E_2 + \frac{1}{4} E_3$$

$$E(t) = \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle$$

$$\langle \psi(t) | = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}} \langle \psi_1 | + \frac{3}{\sqrt{4}} e^{\frac{iE_2 t}{\hbar}} \langle \psi_2 | + \frac{1}{\sqrt{4}} e^{\frac{iE_3 t}{\hbar}} \langle \psi_3 |$$

$$H\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}} E_1 |\psi_1\rangle + \sqrt{\frac{3}{4}} e^{\frac{iE_2 t}{\hbar}} E_2 |\psi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} e^{\frac{iE_3 t}{\hbar}} E_3 |\psi_3\rangle$$

چون $\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}$ پس:

$$E(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} E_1 + \sqrt{\frac{3}{4}} e^{\frac{iE_2 t}{\hbar}} \sqrt{\frac{3}{4}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} E_2 + \frac{1}{\sqrt{4}} e^{\frac{iE_3 t}{\hbar}} \frac{1}{\sqrt{4}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} E_3$$

$$= \frac{1}{2} E_1 + \frac{3}{4} E_2 + \frac{1}{4} E_3 = E(\cdot)$$

تمرین ۳-۳

نوترونی را در نظر بگیرید که در یک چاه پتانسیلی نامتناهی به پهنای $a = 8 \text{ fm}$ محدود است. در زمان $t = 0$ فرض می‌شود که نوترون در حالت زیر است:

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\frac{4}{7a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{2}{7a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{1}{7a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$$

(آ) اگر اندازه‌گیری انرژی روی سیستم انجام شود، چه مقادیری برای انرژی و با چه احتمال‌هایی به دست خواهند آمد؟ پاسخ خود را برحسب MeV (جرم نوترون $mc^2 \simeq 939 \text{ MeV}$ و $\hbar c \simeq 197 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ است) بیان کنید.

(ب) اگر این اندازه‌گیری روی شمار زیادی از سیستم‌های مشابه تکرار شود، مقدار میانگین انرژی که به دست خواهد آمد چیست؟ پاسخ خود را برحسب MeV بیان کنید.

(پ) بابه‌کارگیری اصل عدم قطعیت، مرتبه‌ی بزرگی سرعت نوترون در این چاه را به صورت تابعی از سرعت نور c به دست آورید.

حل:

ویژه مقادیر و ویژه توابع انرژی برای ذره در جعبه‌ی $0 < x < a$ از روابط زیر بدست می‌آیند:

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}; \quad n = 1, 2, \dots$$

(ا)

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\frac{2}{Y}} \phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{Y}} \phi_2(x) + \frac{2}{\sqrt{Y}} \phi_3(x)$$

با توجه به شکل $\psi(x, 0)$ واضح است که در اندازه‌گیری انرژی یکی از مقادیر E_1 ، E_2 یا E_3 بدست می‌آید:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2 c^2}{2mc^2 a^2} \simeq \frac{\Delta n^2 \hbar^2 c^2}{mc^2 a^2}$$

$$E_1 = \frac{\Delta \times 1^2 \times 197^2}{939 \times 1^2} \simeq 3/22 \text{ MeV}$$

$$E_2 = 4E_1 = 12/92 \text{ MeV}$$

$$E_3 = 9E_1 = 29/07 \text{ MeV}$$

(ب)

$$E = \langle \hat{H} \rangle = P_1 E_1 + P_2 E_2 + P_3 E_3 = \left(\sqrt{\frac{2}{Y}}\right)^2 \times 3/22 + \left(\frac{1}{\sqrt{Y}}\right)^2 \times 12/92 + \left(\frac{2}{\sqrt{Y}}\right)^2 \times 29/07$$

$$= 19/28 \text{ MeV}$$

(پ)

در اینجا عدم قطعیت در مکان ذره از مرتبه‌ی a خواهد بود.

$$\Delta x \simeq a$$

بنابراین طبق اصل عدم قطعیت:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x}$$

لذا اگر تکانه‌ی ذره را از مرتبه‌ی Δp در نظر بگیریم، داریم:

$$p \simeq \frac{\hbar}{\lambda \Delta x} = \frac{\hbar}{\lambda a} = mv = \frac{m \cdot v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$v^2 = \frac{c^2}{1 + \frac{4a^2 m^2 c^2}{\hbar^2 c^2}} \simeq 2 \times 10^{-4} c^2$$

$$v = 10^{-2} \sqrt{2} c = 0.14c$$

تمرین ۳-۴

هامیلتونی نوسانگر هماهنگ یک بعدی را در نظر بگیرید.

$$\hat{P} = -i \frac{d}{dx} \quad \text{با} \quad \hat{H} = \frac{1}{2} \hat{P}^2 + \frac{1}{2} \hat{X}^2$$

(آ) نشان دهید که دو تابع موج $\psi_1(x) = x e^{-\frac{x^2}{2}}$ و $\psi_2(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ ویژه توابع $\hat{H}$ با ویژه مقدارهای $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$ هستند.

(ب) مقدار ضریب α را طوری بیابید که $\psi_2(x) = (1 + \alpha x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$ بر $\psi_1(x)$ عمود باشد. سپس نشان دهید که $\psi_2(x)$ ویژه تابع $\hat{H}$ با ویژه مقدار $\frac{5}{2}$ است.

حل:

(آ) برای بررسی اینکه آیا $\psi_1(x)$ و $\psi_2(x)$ ویژه توابع هامیلتونی هستند، $\hat{H}$ را بر این دو تابع موج اثر می دهیم:

$$\begin{aligned} \hat{H} \psi_2(x) &= \left(\frac{\hat{P}^2}{2} + \frac{\hat{X}^2}{2} \right) \psi_2(x) = \left(\frac{1}{2} \left(-i \frac{d}{dx} \right)^2 + \frac{\hat{X}^2}{2} \right) \psi_2(x) = \left(-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} X^2 \right) e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left(-x e^{-\frac{x^2}{2}} \right) + \frac{1}{2} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} + x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2} \psi_2(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{H} \psi_1(x) &= -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} \left(x e^{-\frac{x^2}{2}} \right) + \frac{1}{2} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} \right) + \frac{1}{2} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} (x^2 - 2x) e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{2} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{3}{2} x e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{3}{2} \psi_1(x) \end{aligned}$$

بی $\psi_1(x)$ و $\psi_2(x)$ ویژه توابع عملگر هامیلتونی به ترتیب با ویژه مقادیر $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$ می‌باشند.

(ب) شرط تعامد $\psi_1(x)$ و $\psi_2(x)$ آنست که:

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$$

پس:

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi_1^*(x) \psi_2(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} (1 + \alpha x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + \alpha x^2) e^{-x^2} dx \\ &= \sqrt{\pi} + \alpha \left(\frac{1}{2} \sqrt{\pi} \right) = \left(1 + \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\pi} = 0 \end{aligned}$$

پس:

$$\alpha = -2$$

حال $\hat{H}$ را بر $\psi_2(x)$ اثر می‌دهیم.

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi_2(x) &= \left(-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} x^2 \right) (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \left[(2x^2 - 2x) e^{-\frac{x^2}{2}} \right] + \frac{1}{2} x^2 (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \left[(4x - 2) - x(2x^2 - 2x) \right] e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{2} x^2 (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \left[(4x - 2) - x(2x^2 - 2x) \right] e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{2} x^2 (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \frac{1}{2} (-1 \cdot x^2 + 2) e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2} (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2} \psi_2(x) \end{aligned}$$

پس $\psi_2(x)$ نیز ویژه تابع $\hat{H}$ با ویژه مقدار $\frac{5}{2}$ می‌باشد.

تمرین ۳-۵

تابع موج نوسانگر هماهنگ یک بعدی را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن $\hat{H} = \frac{1}{2} \hat{p}^2 + \frac{1}{2} \hat{x}^2$ است و در زمان $t=0$ به وسیله‌ی:

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} \phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} \phi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

داده می‌شود.

(آ) عبارت تابع موج نوسانگر را در هر زمان t پس از آن بیابید.

- (ب) احتمال P_r را برای یافتن سیستم در یک ویژه حالت با انرژی $\frac{1}{2}$ و احتمال P_r یافتن سیستم را در یک ویژه حالت با انرژی $\frac{5}{2}$ محاسبه کنید.
- (پ) چگالی احتمال $\rho(x, t)$ و چگالی جریان $J(x, t)$ را محاسبه کنید.
- (ت) نشان دهید که احتمال پایسته است یعنی نشان دهید که $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}(x, t) = 0$.

حل:

(آ)

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} \psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} \left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{1\lambda\pi}} e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} \left((1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda\pi}} e^{-\frac{it}{\hbar} \left(\frac{1}{2} \right)} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{1\lambda\pi}} e^{-\frac{it}{\hbar} \left(\frac{5}{2} \right)} (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}\end{aligned}$$

(ب)

اگر $\psi_0(x)$ و $\psi_2(x)$ را بهنجار کنیم، داریم:

$$\psi_{0N}(x) = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\psi_{2N}(x) = \frac{2}{\pi^{\frac{1}{4}}} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 - 2x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$$

اما:

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}} \sqrt{\lambda}} \psi_{0N}(x) + \frac{2}{2\pi^{\frac{1}{4}} \sqrt{1\lambda}} \psi_{2N}(x)$$

بهنجار نیست و اگر آن را بهنجار کنیم، داریم:

$$\psi_N(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_{0N}(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_{2N}(x)$$

یعنی:

$$P_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

P_0 و P_2 در طی زمان تغییر نخواهند کرد زیرا ψ_0 و ψ_2 حالت‌های پایدار (ایستا) هستند.

(ب)

$$\psi_N(x, t) = \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-it}{r\hbar}} \psi_{\cdot N}(x) + \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-\Delta it}{r\hbar}} \psi_{rN}(x)$$

$$\begin{aligned} \rho(x, t) &= \psi_N^*(x, t) \psi_N(x, t) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{it}{r\hbar}} \psi_{\cdot N}(x) + \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{+\Delta it}{r\hbar}} \psi_{rN}(x) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-it}{r\hbar}} \psi_{\cdot N}(x) + \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-\Delta it}{r\hbar}} \psi_{rN}(x) \right) \\ &= \frac{1}{r} \psi_{\cdot N}^r(x) + \frac{1}{r} \psi_{rN}^r(x) + \frac{1}{r} \left(e^{\frac{rit}{r\hbar}} + e^{\frac{rit}{r\hbar}} \right) \psi_{\cdot N}(x) \psi_{rN}(x) \\ &= \frac{1}{r} \psi_{\cdot N}^r(x) + \frac{1}{r} \psi_{rN}^r(x) + \cos\left(\frac{rt}{r\hbar}\right) \psi_{\cdot N}(x) \psi_{rN}(x) \end{aligned}$$

$$\vec{J}(x, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[\psi_N^*(x, t) \vec{\nabla} \psi_N(x, t) \right]$$

$$\vec{\nabla} \psi_N(x, t) = \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-it}{r\hbar}} \vec{\nabla} \psi_{\cdot N}(x) + \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{\Delta it}{r\hbar}} \vec{\nabla} \psi_{rN}(x)$$

$$\vec{\nabla} \psi_{\cdot N}(x) = -\hat{i} \frac{1}{\pi^{\frac{1}{r}}} x e^{-\frac{x^r}{r}}$$

$$\vec{\nabla} \psi_{rN}(x) = +\hat{i} \frac{r}{r\pi^{\frac{1}{r}}} (rx^r - \Delta x) e^{-\frac{x^r}{r}}$$

$$\vec{\nabla} \psi_N(x, t) = \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-it}{r\hbar}} \frac{-\hat{i}}{\pi^{\frac{1}{r}}} x e^{-\frac{x^r}{r}} + \frac{1}{\sqrt{r}} e^{\frac{-\Delta it}{r\hbar}} \hat{i} \frac{r}{r\pi^{\frac{1}{r}}} (rx^r - \Delta x) e^{-\frac{x^r}{r}}$$

$$\begin{aligned} \psi_N^* \nabla \psi_N &= \frac{1}{r} \frac{-\hat{i}}{\pi^{\frac{1}{r}}} x e^{-x^r} + \frac{1}{r} e^{\frac{-rit}{r\hbar}} \hat{i} \frac{r}{r\pi^{\frac{1}{r}}} (rx^r - \Delta x) e^{-x^r} - \frac{1}{r} e^{\frac{rit}{r\hbar}} \hat{i} \frac{r}{r\pi^{\frac{1}{r}}} x (1 - rx^r) e^{-x^r} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{r}{\pi^{\frac{1}{r}}} \hat{i} (rx^r - \Delta x) (1 - rx^r) e^{-x^r} \end{aligned}$$

$$\vec{J}(x, t) = \frac{\hbar}{m} \left[\frac{-\hat{i}}{r\pi^{\frac{1}{r}}} \sin\left(\frac{rt}{r\hbar}\right) (rx^r - \Delta x) e^{-x^r} - \frac{\hat{i}}{r\pi^{\frac{1}{r}}} \sin\left(\frac{rt}{r\hbar}\right) x (1 - rx^r) e^{-x^r} \right]$$

$$= \frac{i\hbar}{m} \frac{rx}{2\pi} \sin\left(\frac{rt}{2\hbar}\right) e^{-x^2}$$

(ت)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \frac{-r}{2\hbar} \sin\left(\frac{rt}{2\hbar}\right) \frac{2}{2\pi} (1 - rx^2) e^{-x^2} + \frac{\hbar}{m} \frac{rx}{2\pi} \sin\left(\frac{rt}{2\hbar}\right) (1 - rx^2) e^{-x^2} = 0$$

تمرین ۳-۶

ذره‌ای به جرم m در یک چاه پتانسیل نامتناهی به طول a در $t=0$ دارای تابع موج اولیه‌ی

$$\psi(x,0) = \sqrt{\frac{3}{\Delta a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) + \frac{1}{\sqrt{\Delta a}} \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right)$$

و طیف انرژی $E_n = -\hbar^2 \pi^2 n^2 / (2ma^2)$ است.

$\psi(x,t)$ را در هر زمان t پس از آن بیابید. سپس $\frac{\partial p}{\partial t}$ و بردار چگالی جریان احتمال $J(x,t)$ را حساب کنید و نشان دهید که $\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}(x,t) = 0$. به‌خاطر داشته باشید که $p = \psi^*(x,t)\psi(x,t)$ و $\vec{J}(x,t) = \frac{i\hbar}{2m} (\psi(x,t)\vec{\nabla}\psi^*(x,t) - \psi^*(x,t)\vec{\nabla}\psi(x,t))$ است.

حل:

ویژه توابع و ویژه مقادیر ذره‌ای به جرم m محصور در جعبه‌ای به طول a عبارتند از:

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad ; \quad n = 1, 2, \dots$$

پس با توجه به این توضیحات $\psi(x,0)$ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\psi(x,0) = \sqrt{\frac{3}{2a}} \phi_3(x) + \sqrt{\frac{1}{2a}} \phi_{\Delta}(x)$$

در اینجا ذکر این نکته، ضروری است که $\psi(x,0)$ بهنجار نمی‌باشد. حال $\psi(x,t)$ را می‌یابیم:

$$\psi(x,t) = e^{-i\frac{E_3 t}{\hbar}} \psi(x,0) = e^{-i\frac{E_3 t}{\hbar}} \sqrt{\frac{3}{2a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) + e^{-i\frac{E_{\Delta} t}{\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2a}} \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right)$$

و از این جا نتیجه می‌شود که:

$$\rho = \psi^*(x,t)\psi(x,t) = \frac{3}{2a} \sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right) + \frac{1}{2a} \sin^2\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) + \frac{\sqrt{3}}{a} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \cos\left[\frac{t}{\hbar}(E_{\Delta} - E_3)\right]$$

و

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\sqrt{r}}{\Delta a} \frac{1}{\hbar} (E_\delta - E_r) \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \sin\left[\frac{t}{\hbar} (E_\delta - E_r)\right]$$

$$\vec{J}(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} (\psi \vec{\nabla} \psi^* - \psi^* \vec{\nabla} \psi) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \vec{\nabla} \psi)$$

$$\vec{\nabla} \psi = \hat{i} \frac{\partial \psi}{\partial x} = \hat{i} \left[\sqrt{\frac{r}{\Delta a}} e^{-i\frac{E_r t}{\hbar}} \left(\frac{r\pi}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{1}{\Delta a}} e^{-i\frac{E_\delta t}{\hbar}} \left(\frac{\Delta\pi}{a}\right) \cos\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \right]$$

$$\begin{aligned} \psi^* \vec{\nabla} \psi = & \left[\frac{r\pi}{\Delta a} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) + \frac{\Delta\sqrt{r}\pi}{\Delta a} e^{-i\frac{(E_\delta - E_r)t}{\hbar}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \right. \\ & \left. + \frac{r\sqrt{r}\pi}{\Delta a} e^{i\frac{(E_\delta - E_r)t}{\hbar}} \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) + \frac{\Delta\pi}{\Delta a} \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \right] \hat{i} \end{aligned}$$

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{m} \frac{\sqrt{r}\pi}{\Delta a} \sin\left[\frac{t}{\hbar} (E_\delta - E_r)\right] \left[r \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) - \Delta \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \right] \hat{i}$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = & \frac{\hbar\sqrt{r}\pi}{\Delta m a} \sin\left[\frac{t}{\hbar} (E_\delta - E_r)\right] \left\{ r \left(\frac{\Delta\pi}{a}\right) \cos\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) - r \left(\frac{r\pi}{a}\right) \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \right. \\ & \left. - \Delta \left(\frac{r\pi}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) - \Delta \left(-\frac{\Delta\pi}{a}\right) \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \right\} \\ = & \frac{16\hbar\sqrt{r}\pi}{\Delta m a} \sin\left[\frac{t}{\hbar} (E_\delta - E_r)\right] \sin\left(\frac{\Delta\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \end{aligned}$$

و لذا:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

تمرین ۳-۷

سیستمی را در نظر بگیرید که حالت اولیه‌ی آن در $t=0$ برحسب یک مجموعه‌ی کامل و متعامد - بهنجار از سه بردار $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ و به صورت $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|\phi_1\rangle + A|\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\phi_3\rangle$ است، و در آن A یک ثابت حقیقی است.

(آ) A را به گونه‌ای بیابید که $|\psi(0)\rangle$ بهنجار شود.

(ب) اگر انرژی‌های متناظر $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ به ترتیب با E_1, E_2, E_3 نشان داده شوند، حالت سیستم $|\psi(t)\rangle$ را در هر زمان t پس از آن بیابید.

(پ) احتمال یافتن سیستم را در یک زمان t در حالت $|\phi\rangle$ تعیین کنید.

حل:
(۱)

$$1 = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle = \frac{1}{3} + A^2 + \frac{1}{6}$$

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(ب)

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_3\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-iE_1t}{\hbar}} |\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_2t}{\hbar}} |\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3t}{\hbar}} |\phi_3\rangle \end{aligned}$$

(پ)

$$P = |\langle \phi_3 | \psi(t) \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3t}{\hbar}} \right|^2 = \frac{1}{6}$$

تمرین ۳-۸

مؤلفه‌های حالت اولیه $|\psi_i\rangle$ یک سیستم کوانتومی در یک پایه‌ی کامل و متعامد بهنجار از سه حالت $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ با رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$\langle \phi_1 | \psi_i \rangle = \frac{i}{\sqrt{3}}, \quad \langle \phi_2 | \psi_i \rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \langle \phi_3 | \psi_i \rangle = 0$$

احتمال یافتن سیستم در حالت $|\psi_f\rangle$ را که مؤلفه‌های آن در همان پایه به صورت

$$\langle \phi_1 | \psi_f \rangle = \frac{1+i}{\sqrt{3}}, \quad \langle \phi_2 | \psi_f \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad \langle \phi_3 | \psi_f \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

هستند محاسبه کنید.

حل:

$$|\psi_i\rangle = \sum_i |\phi_i\rangle \langle \phi_i | \psi_i \rangle = |\phi_1\rangle \langle \phi_1 | \psi_i \rangle + |\phi_2\rangle \langle \phi_2 | \psi_i \rangle + |\phi_3\rangle \langle \phi_3 | \psi_i \rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} |\phi_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |\phi_2\rangle$$

$$|\psi_f\rangle = \sum_i |\phi_i\rangle \langle \phi_i | \psi_f \rangle = |\phi_1\rangle \langle \phi_1 | \psi_f \rangle + |\phi_2\rangle \langle \phi_2 | \psi_f \rangle + |\phi_3\rangle \langle \phi_3 | \psi_f \rangle$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1+i}{\sqrt{3}}|\phi\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\phi_r\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\phi_r\rangle \\
 P &= \left| \langle \psi_f | \psi_i \rangle \right|^2 = \left| \left(\frac{1-i}{\sqrt{3}}\langle\phi| + \frac{1}{\sqrt{6}}\langle\phi_r| + \frac{1}{\sqrt{6}}\langle\phi_r| \right) \left(\frac{i}{\sqrt{3}}|\phi\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|\phi_r\rangle \right) \right|^2 = \left| \frac{1-i}{\sqrt{3}} \frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{2}{3}} \right|^2 \\
 &= \left| \frac{i+1}{3} + \frac{1}{3} \right|^2 = \left| \frac{i+2}{3} \right|^2 = \frac{1^2 + 2^2}{3^2} = \frac{5}{9}
 \end{aligned}$$

تمرین ۹-۳

- (آ) براکت پوآسون $\{x^r, p^r\}$ را به دست آورید.
- (ب) جابه‌جاگر $[\hat{X}^r, \hat{P}^r]$ را بر حسب $\hbar^r$ و یک ثابت بیان کنید.
- (پ) حد کلاسیک $[\hat{x}^r, \hat{p}^r]$ را برای این عبارت بیابید و سپس با نتیجه قسمت (آ) مقایسه کنید.

حل:

(آ)

$$\{A, B\} = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right)$$

$$\{x^r, p^r\} = \frac{\partial x^r}{\partial x} \frac{\partial p^r}{\partial p} - \frac{\partial x^r}{\partial p} \frac{\partial p^r}{\partial x} = 1 \times 1 - 0 = 1$$

(ب)

$$[X^r, P^r] = i\hbar (XP + PX) = i\hbar (XP + XP - i\hbar) = 2i\hbar XP + \hbar^r$$

(پ)

می‌دانیم که در مکانیک کوانتومی xp و px ، متفاوت می‌باشند و:

$$xp - px = i\hbar$$

اما وقتی $\hbar \rightarrow 0$ (یعنی در حد کلاسیکی):

$$xp \rightarrow px$$

و بنابراین می‌توان گفت:

$$[x^r, p^r] = i\hbar (xp + xp) \rightarrow i\hbar (xp + xp) = 2i\hbar xp = i\hbar \{x^r, p^r\}$$

تمرین ۱۰-۳

ذره‌ای در یک پتانسیل یک بُعدی با تابع موج زیر مقید شده است:

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{\delta i k x} \cos\left(\frac{\gamma \pi x}{a}\right) & -\frac{a}{\gamma} \leq x \leq \frac{a}{\gamma} \\ 0 & |x| > \frac{a}{\gamma} \end{cases}$$

(آ) ثابت A را به گونه‌ای محاسبه کنید که $\psi(x)$ بهنجار باشد.

(ب) احتمال یافتن ذره را میان $x = 0$ و $x = \frac{a}{\gamma}$ محاسبه کنید.

حل:

(آ)

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \psi(x) dx = \int_{|x| > \frac{a}{\gamma}} 0 \times 0 dx + \int_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}} A^* e^{-\delta i k x} \cos\left(\frac{\gamma \pi x}{a}\right) A e^{\delta i k x} \cos\left(\frac{\gamma \pi x}{a}\right) dx$$

$$= |A|^2 \int_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}} \cos^2\left(\frac{\gamma \pi x}{a}\right) dx = \gamma \times \frac{|A|^2}{\gamma} \int_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}} \left(1 + \cos\left(\frac{2\gamma \pi x}{a}\right)\right) dx = |A|^2 \left[\frac{a}{\gamma} + \frac{a}{2\gamma \pi} \sin\left(\frac{2\gamma \pi x}{a}\right) \right]_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}}$$

$$= \frac{a}{\gamma} |A|^2$$

پس:

$$|A| = \sqrt{\frac{\gamma}{a}}$$

(ب)

$$P = \int_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}} \psi^*(x) \psi(x) dx = \frac{\gamma}{a} \int_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}} \cos^2\left(\frac{\gamma \pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{a} \left[x + \frac{a}{2\gamma \pi} \sin\left(\frac{2\gamma \pi x}{a}\right) \right]_{-\frac{a}{\gamma}}^{\frac{a}{\gamma}} = \frac{1}{a} \left(\frac{a}{\gamma} + \frac{a}{2\gamma \pi} \sin\left(\frac{2\gamma \pi}{\gamma}\right) \right)$$

$$= \frac{1}{\gamma} + \frac{1}{2\gamma \pi}$$

تمرین ۳-۱۱

(آ) نشان دهید که هر مؤلفه‌ی عملگر اندازه حرکت یک ذره با عملگر انرژی جنبشی خود سازگار است.

(ب) نشان دهید که عملگر اندازه حرکت، تنها اگر عملگر پتانسیل در مختصات فضایی ثابت باشد، با عملگر هامیلتونی سازگار است.

حل:

(آ)

$$\hat{p} = \hat{i} \hat{p}_x + \hat{j} \hat{p}_y + \hat{k} \hat{p}_z$$

$$\hat{K} = \frac{\hat{P}^2}{2m} = \frac{\hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_z^2}{2m}$$

$$[\hat{P}_x, \hat{K}] = \left[\hat{P}_x, \frac{1}{2m} (\hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_z^2) \right] = \frac{1}{2m} [\hat{P}_x, \hat{P}_x^2] + \frac{1}{2m} [\hat{P}_x, \hat{P}_y^2] + \frac{1}{2m} [\hat{P}_x, \hat{P}_z^2]$$

چون هر مؤلفه‌ی عملگر $\hat{P}$ با تابعی از خود آن و یا با تابعی از مؤلفه‌های دیگر $\hat{P}$ جابجا می‌شود، پس:

$$[\hat{P}_i, \hat{P}_j^2] = 0$$

و بنابراین:

$$[\hat{P}_x, \hat{K}] = 0 = [\hat{P}_y, \hat{K}] = [\hat{P}_z, \hat{K}]$$

(ب)

با استفاده از قسمت (آ) واضح است که:

$$\left[\frac{\hat{P}^2}{2m}, \hat{P} \right] = 0$$

پس:

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{P}] &= \left[\frac{\hat{P}^2}{2m} + \hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P} \right] = [\hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}] = [\hat{V}(\vec{r}, t), \hat{i}\hat{P}_x + \hat{j}\hat{P}_y + \hat{k}\hat{P}_z] \\ &= \hat{i}[\hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}_x] + \hat{j}[\hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}_y] + \hat{k}[\hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}_z] \\ &= i\hbar \left[\hat{i} \left\{ \hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}_x \right\} + \hat{j} \left\{ \hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}_y \right\} + \hat{k} \left\{ \hat{V}(\vec{r}, t), \hat{P}_z \right\} \right] \\ &= i\hbar \left[\hat{i} \left(\frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial x} \frac{\partial P_x}{\partial P_x} - \frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial P_x} \frac{\partial P_x}{\partial x} \right) + \hat{j} \left(\frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial y} \frac{\partial P_y}{\partial P_y} - \frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial P_y} \frac{\partial P_y}{\partial y} \right) \right. \\ &\quad \left. + \hat{k} \left(\frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial z} \frac{\partial P_z}{\partial P_z} - \frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial P_z} \frac{\partial P_z}{\partial z} \right) \right] = i\hbar \left(\hat{i} \frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial \hat{V}(\vec{r}, t)}{\partial z} \right) \\ &= i\hbar \vec{\nabla} V(\vec{r}, t) \end{aligned}$$

واضح است که اگر عملگر پتانسیل مقدار ثابتی داشته باشد آنگاه:

$$[\hat{H}, \hat{P}] = 0$$

تمرین ۳-۱۲

سیستمی فیزیکی را در نظر بگیرید که هامیلتونی $\hat{H}$ و عملگر $\hat{A}$ آن به صورت زیر داده شده‌اند:

$$H = \varepsilon \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad A = a \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

که در آن ε دارای ابعاد انرژی است.
 (آ) آیا $\hat{H}$ و $\hat{A}$ جابجا می‌شوند؟ اگر جابجا می‌شوند، یک پایه برای ویژه بردارهای مشترک $\hat{H}$ و $\hat{A}$ ارائه دهید.
 (ب) از میان مجموعه عملگرهای $\hat{H}, \hat{A}, \{\hat{H}, \hat{A}\}, \{\hat{H}^2, \hat{A}\}$ کدام یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابجا شونده (CSCO) تشکیل می‌دهند؟

حل:
 (آ)

بله زیرا:

$$\begin{aligned} [H, A] &= \varepsilon a \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \varepsilon a \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \varepsilon a \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \varepsilon a \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

ویژه مقادیر $\hat{H}$ یکی از مقادیر $h_1 = -2\varepsilon$ و $h_2 = \varepsilon$ و $h_3 = \varepsilon$ و ویژه بردارهای راست هنجار متناظر با آنها عبارتند از:

$$|h_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |h_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |h_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

از حل معادله‌ی $\det(A - a) = 0$ نیز ویژه مقادیر $\hat{A}$ حاصل می‌شوند که عبارتند از:

$$a_1 = 5a, \quad a_2 = +2a, \quad a_3 = -2a.$$

و ویژه بردارهای خود به خود متعامد متناظر با آنها عبارت خواهند بود از:

$$|a_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |a_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |a_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

اما در اینجا ویژه بردارهای بهنجار شده $\hat{A}$ خود به خود ویژه بردارهای $\hat{H}$ نیز می‌باشند به‌طوری‌که:

$$|h_1, a_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |h_2, a_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |h_3, a_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(ب)

چون $\hat{H}$ دارای ویژه بردارهای تبهگن است، بنابراین ویژه بردارهای آن به‌طور خودبه‌خود تشکیل یک مجموعه‌ی کامل را نمی‌دهند.

اما عملگر $\hat{A}$ چون دارای ویژه بردارهای غیر تبهگن است لذا ویژه بردارهای آن تشکیل یک مجموعه‌ی کامل را می‌دهند.

چون $\hat{A}$ فاقد تبهگنی است و از طرفی $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ ، لذا $\{A, H\}$ نیز تشکیل مجموعه‌ی کامل عملگرهای جابه‌جا شونده (CSCO) را می‌دهد.

در مورد $\hat{A}$ و $\hat{H}^2$ نیز استدلال مربوط به $\{A, H\}$ صادق است و لذا $\{\hat{A}, \hat{H}^2\}$ نیز تشکیل مجموعه‌ی کامل عملگرهای جابه‌جا شونده را می‌دهد.

تمرین ۳-۱۳

نشان دهید اندازه حرکت و انرژی کل را تنها هنگامی که پتانسیل در هر جا ثابت باشد می‌توان به صورت همزمان اندازه‌گیری کرد.

حل:

برای این که بتوان تکانه و انرژی را به‌طور همزمان اندازه‌گیری کرد لازم است که این دو کمیت با هم جابه‌جا شوند، یعنی:

$$[\hat{H}, \hat{P}] = 0$$

و یا به عبارتی باید داشته باشیم:

$$0 = \left[\frac{\hat{P}^2}{2m} + \hat{V}, \hat{P} \right] = \left[\frac{\hat{P}^2}{2m}, \hat{V} \right] + \left[\frac{\hat{P}^2}{2m}, \hat{P} \right] = \left[\frac{\hat{P}^2}{2m}, \hat{V} \right] + 0 = \left[\frac{\hat{P}^2}{2m}, \hat{V} \right]$$

اما رابطه‌ی $\left[\frac{\hat{P}^2}{2m}, \hat{V} \right] = 0$ فقط وقتی برقرار است که $\hat{V}$ (پتانسیل) در همه جا ثابت باشد.

تمرین ۳-۱۴

حالت اولیه‌ی سیستمی برحسب چهار ویژه تابع متعامد - بهنجار انرژی $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle, |\phi_4\rangle$ و $|\phi_5\rangle$ به‌صورت زیر است:

$$|\psi\rangle = |\psi(t=0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\phi_3\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\phi_4\rangle$$

(آ) اگر چهار کت $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle, |\phi_4\rangle$ و ویژه بردارهای هامیلتونی $\hat{H}$ به ترتیب با انرژی‌های E_1, E_2, E_3, E_4 باشند، حالت $|\psi(t)\rangle$ را در هر زمان t پس از آن بیابید.

(ب) نتایج ممکن اندازه‌گیری انرژی این سیستم چه هستند و با چه احتمالی رخ خواهند داد؟

(پ) مقدار چشمداشتی هامیلتونی سیستم را در $t=0$ و $t=1.0$ s را پیدا کنید.

حل:

(آ)

ابتدا اثر عملگر تحول زمانی را بر روی $|\phi_i\rangle$ می‌یابیم:

$$e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}}|\phi_i\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-i\hat{H}t}{\hbar} \right)^n |\phi_i\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-iE_n t}{\hbar} \right)^n |\phi_i\rangle = e^{\frac{-iE_n t}{\hbar}} |\phi_i\rangle$$

پس:

$$|\psi(t)\rangle = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_3\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\phi_4\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} |\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} |\phi_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} |\phi_3\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_4 t}{\hbar}} |\phi_4\rangle$$

(ب)

واضح است که در اندازه‌گیری انرژی یکی از مقادیر E_1, E_2, E_3, E_4 با احتمال P_1, P_2, P_3, P_4 یافت خواهد شد به‌طوری‌که:

$$P_1 = |\langle \phi_1 | \psi(t) \rangle|^2 = \left| \langle \phi_1 | \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} |\phi_1\rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \right|^2 = \frac{1}{3}$$

$$P_2 = |\langle \phi_2 | \psi(t) \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_3 = |\langle \phi_3 | \psi(t) \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \right|^2 = \frac{1}{6}$$

$$P_4 = |\langle \phi_4 | \psi(t) \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_4 t}{\hbar}} \right|^2 = \frac{1}{6}$$

ملاحظه می‌شود که این احتمالات در طول زمان ثابت هستند زیرا $|\phi_i\rangle$ ها ویژه حالت‌های انرژی می‌باشند.

(ب)

$$E(\circ) = \langle \psi, \hat{H} | \psi \rangle = \sum_i P_i(\circ) E_i = \frac{1}{3} E_1 + \frac{1}{4} E_2 + \frac{1}{6} E_3 + \frac{1}{4} E_4$$

$$E(t) = \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle = \sum_i P_i(t) E_i = \sum_i P_i(\circ) E_i = E(\circ) = \frac{1}{3} E_1 + \frac{1}{4} E_2 + \frac{1}{6} E_3 + \frac{1}{4} E_4$$

در اینجا $E(\circ)$ و $E(t)$ متوسط هامیلتونی در زمان $t = 0$ و $t = 1.08$ می‌باشند.

تمرین ۳-۱۵

بسط مجموعه‌ی کامل یک تابع موج اولیه‌ی $\psi(x, 0)$ برای سیستمی برحسب ویژه توابع متعامد و بهنجار انرژی $\phi_n(x)$ دارای سه جمله است ($n = 1, 2, 3$). اندازه‌گیری انرژی روی این سیستم با $\psi(x, 0)$ سه مقدار E_1 و E_2 (با احتمال $\frac{1}{4}$) و E_3 (با احتمال $\frac{1}{4}$) را به دست می‌دهد.

(آ) $\psi(x, 0)$ را برحسب $\phi_1(x), \phi_2(x), \phi_3(x)$ بنویسید.

(ب) $\psi(x, 0)$ را در هر زمان t پس از آن بیابید، یعنی $\psi(x, t)$ را پیدا کنید.

حل:
(آ)

$$\psi(x, 0) = \sum_n c_n \phi_n(x)$$

$$P_n = c_n c_n^* = |c_n|^2$$

در اینجا بدون اینکه کلیت مسئله از بین رود فرض می‌کنیم که c_n ها حقیقی باشد، پس:

$$c_n = \sqrt{P_n}$$

و بنابراین:

$$c_1 = \sqrt{\frac{1}{4}} = c_2 = \frac{1}{2}$$

$$c_3 = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$c_n = 0 \quad ; \quad n = 4, 5, \dots$$

پس:

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{2} \phi_1(x) + \frac{1}{2} \phi_2(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \phi_3(x)$$

(ب)

$$\psi(x, t) = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \phi_2(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \phi_3(x)$$

تمرین ۳-۱۶

سیستمی را در نظر بگیرید که هامیلتونی $\hat{H}$ و عملگر $\hat{A}$ آن با ماتریس‌های زیر نشان داده می‌شوند:

$$H = \varepsilon \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 2i \\ 0 & -2i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad A = a \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(آ) اگر انرژی را اندازه بگیریم چه مقدارهایی به دست خواهیم آورد؟

(ب) فرض کنید هنگامی که انرژی را اندازه می‌گیریم مقدار $\sqrt{5}\varepsilon$ را به دست آوریم و بی‌درنگ پس از آن A را اندازه می‌گیریم. چه مقدارهایی برای A به دست خواهیم آورد و احتمال‌های متناظر با هر مقدار چه هستند؟

(پ) مقدار چشم‌داشتی $\langle A \rangle$ را حساب کنید.

حل:
(آ)

آنچه در اندازه‌گیری انرژی حاصل می‌شود در واقع همان ویژه مقادیر عملگر هامیلتونی است. بنابراین باید h (ویژه مقدار انرژی) را به دست آورد به‌طوری‌که:

$$\det(H - h) = 0$$

پس با اختیار $h = h'\varepsilon$ داریم:

$$\begin{vmatrix} -h' & -i & 0 \\ i & -h' & 2i \\ 0 & -2i & -h' \end{vmatrix} = -h' \begin{vmatrix} -h' & 2i \\ -2i & -h' \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} i & 2i \\ 0 & -h' \end{vmatrix} = -h' (h'^2 - 4) + h' = h' (5 - h'^2) = 0$$

$$\text{اگر } |h=0\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ آنگاه:}$$

$$H|h=0\rangle = 0|h=0\rangle$$

$$\varepsilon \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 2i \\ 0 & -2i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

یا:

$$y = 0$$

$$x = -2z$$

با اعمال روش مشابه داریم:

$$|h_1 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, |h_r = \sqrt{5}\varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}, |h_r = -\sqrt{5}\varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$$

با اعمال روش مشابهی می‌توان ویژه مقادیر و ویژه بردارهای عملگر هرمیتی $\hat{A}$ را نیز یافت که عبارتند از:

$$|a_1 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix}, |a_r = -a_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ i \end{pmatrix}, |a_r = 2a_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ i \end{pmatrix}$$

(ب) احتمال‌های متناظر با ویژه مقادیر $\hat{A}$ یعنی a_1 ، a_r و a_1 عبارتند از:

$$P_1 = |\langle a_1 | h_r \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ +i) \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{20} |1 + 2i|^2 = \frac{1}{4}$$

$$P_r = |\langle a_r | h_r \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} (1 \ i \ -i) \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{30} |1 + i^2\sqrt{5} - 2i|^2 = \frac{1}{30} [(1 - \sqrt{5})^2 + 4] \\ = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{30}$$

$$P_r = |\langle a_r | h_r \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} (1 \ -2i \ -i) \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{4\sqrt{5} + 25}{60}$$

P_r را می‌توانستیم از رابطه‌ی زیر نیز به دست آوریم:

$$P_r = 1 - (P_1 + P_r) = 1 - \frac{1}{4} + \frac{2\sqrt{5} - 10}{30} = \frac{60 - 15 + 4\sqrt{5} - 20}{60} = \frac{4\sqrt{5} + 25}{60}$$

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وقتی در اندازه‌گیری انرژی مقدار $\sqrt{5}\varepsilon$ حاصل شود، بلافاصله حالت سیستم به $|h_r\rangle$ تغییر می‌نماید.

(ب)

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \sum_i P_i a_i = P_1 a_1 + P_2 a_2 + P_3 a_3 = \frac{1}{4} \times 0 + \frac{10 - 2\sqrt{5}}{30} (-a_1) + \frac{2\sqrt{5} + 25}{60} (2a_1) \\ &= \frac{(10 - 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} + 25)a_1}{30} = \frac{(2\sqrt{5} + 35)a_1}{30}\end{aligned}$$

تمرین ۳-۱۷

یک سیستم فیزیکی را در نظر بگیرید که هامیلتونی و حالت اولیه آن با روابط زیر داده می‌شوند:

$$\hat{H} = \varepsilon \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

و در آن ε بعد انرژی دارد.

(آ) اگر انرژی اندازه‌گیری شود، چه مقادیر و با چه احتمالاتی به دست خواهند آمد؟

(ب) مقدار چشمداشتی هامیلتونی $\langle \hat{H} \rangle$ را محاسبه کنید.

حل:

(آ)

ویژه مقادیر عبارتند از: $h_1 = 0$ ، $h_2 = 2\varepsilon$ و $h_3 = -\varepsilon$. چون $\hat{H}$ فاقد تبه‌گنی است، پس ویژه بردارهای آن خود به خود متعامد می‌باشند. ویژه بردارهای راست $\hat{H}$ عبارتند از:

$$|h_1 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ +1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |h_2 = 2\varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |h_3 = -\varepsilon\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

بنابراین در اندازه‌گیری انرژی، یکی از مقادیر h_1 ، h_2 و h_3 حاصل می‌شود و احتمال‌های متناظر با آنها عبارتند از:

$$P_1 = |\langle h_1 | \psi_0 \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$P_2 = |\langle h_2 | \psi_0 \rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right|^2 = 0$$

$$P_3 = 1 - (P_1 + P_2) = 1 - \left(\frac{1}{3} + 0 \right) = \frac{2}{3}$$

(ب)

$$\langle H \rangle = p_1 h_1 + p_2 h_2 + p_3 h_3 = \frac{1}{3} \times 0 + 0 \times 2\varepsilon + \frac{2}{3}(-\varepsilon) = -\frac{2}{3}\varepsilon.$$

تمرین ۳-۱۸

سیستمی را در نظر بگیرید که حالت $|\psi(t)\rangle$ آن و دو مشاهده‌پذیر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ عبارت‌اند از:

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \hat{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) یک اندازه‌گیری انجام می‌دهیم که در آن نخست A و سپس بی‌درنگ پس از آن $\hat{B}$ اندازه‌گیری می‌شود. احتمال یافتن مقدار $\sqrt{2}$ برای A و مقدار -1 برای $\hat{B}$ را بیابید.
(ب) اکنون، نخست $\hat{B}$ و سپس بی‌درنگ پس از آن $\hat{A}$ را اندازه‌گیری می‌گیریم. احتمال به‌دست آوردن مقدار -1 برای $\hat{B}$ و $\sqrt{2}$ برای $\hat{A}$ را بیابید.
(پ) نتایج (آ) و (ب) را مقایسه و توضیح دهید.

حل:

(آ)

ویژه‌مقادیر $\hat{A}$ عبارتند از $a_1 = a_2 = \sqrt{2}$ و $a_3 = 0$. به‌دلیل تبه‌گنی، ویژه‌بردارهای $\hat{A}$ خود به خود مجموعه‌ی کاملی را تشکیل نمی‌دهند. اما با کمی دقت می‌توان ویژه‌بردارهای راست هنجار آن را یافت که عبارتند از:

$$|a_1 = \sqrt{2}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |a_2 = \sqrt{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |a_3 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

به‌همین ترتیب اگر ویژه‌بردارهای راست هنجار $\hat{B}$ را بیابیم داریم:

$$|b_1 = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |b_2 = 1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |b_3 = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

چنانچه در اندازه‌گیری $\hat{A}$ مقدار $\sqrt{2}$ به‌دست آید سیستم در یکی از دو حالت $|a_1\rangle$ و یا $|a_2\rangle$ خواهد بود. اگر بر روی هر یک از این دو حالت مقدار $\hat{B}$ اندازه‌گیری شود، مقداری برابر با -1 به‌دست می‌آید. بنابراین در اندازه‌گیری دوم هرگز مقدار -1 حاصل نمی‌شود. بنابراین احتمال مطلوب در قسمت (آ) صفر خواهد شد.

(ب) چنانچه در اندازه‌گیری $\hat{B}$ مقدار ۱- به دست آید آنگاه سیستم در حالت $|b_1 = -1\rangle$ قرار دارد. اگر بر روی هر یک از این دو حالت، مقدار $\hat{A}$ اندازه‌گیری شود همواره مقدار ۰ حاصل می‌گردد. بنابراین در اندازه‌گیری دوم هرگز مقدار $\sqrt{2}$ به دست نمی‌آید. پس احتمال مطلوب در قسمت (ب) نیز صفر خواهد شد.

(پ) علت اینکه نتایج قسمت (آ) و (ب) یکسان هستند مربوط به این است که $\hat{A}$ و $\hat{B}$ با هم جابه‌جا می‌شوند و لذا ترتیب اندازه‌گیری دیگر اهمیت نخواهد داشت.

تمرین ۳-۱۹

سیستمی را در نظر بگیرید که حالت $|\psi(t)\rangle$ آن و دو مشاهده‌پذیر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ عبارت‌اند از

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -i \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i & 1 \\ -i & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) آیا $\hat{A}$ و $\hat{B}$ سازگارند؟ از میان مجموعه عملگرهای $\hat{A}, \hat{B}, \{\hat{A}, \hat{B}\}$ کدام یک، مجموعه‌ای کامل از عملگرهای جابه‌جاشونده را تشکیل می‌دهد؟

(ب) نخست با اندازه‌گیری $\hat{A}$ و بی‌درنگ پس از آن با اندازه‌گیری $\hat{B}$ ، احتمال یافتن مقدار ۱- برای $\hat{A}$ و مقدار ۳ برای $\hat{B}$ را بیابید.

(پ) اکنون نخست با اندازه‌گیری $\hat{B}$ و سپس بی‌درنگ پس از آن $\hat{A}$ ، احتمال یافتن مقدار ۳ برای $\hat{B}$ و ۱- برای $\hat{A}$ را بیابید. این نتیجه را با احتمال به دست آمده در (ب) مقایسه کنید.

حل:

(آ)

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}] &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i & 1 \\ -i & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i & 1 \\ -i & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -3i & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 3i & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -3i & -4 \\ -3i & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

پس $\hat{A}$ و $\hat{B}$ با هم جابه‌جا نمی‌شوند.

ویژه بردارهای $\hat{A}$ عبارتند از:

$$|a_1 = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad |a_2 = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |a_3 = 2\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

حالا می‌توان گفت چون $\hat{A}$ فاقد تبه‌گنی است لذا ویژه بردارهای آن خودبه‌خود تشکیل یک مجموعه‌ی کامل را می‌دهند. یعنی $\{\hat{A}\}$ یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده است. ویژه بردارهای $\hat{B}$ نیز عبارتند از:

$$|b_1 = 3\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |b_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\rangle = \frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2i \end{pmatrix}, \quad |b_3 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}\rangle = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2i \end{pmatrix}$$

چون $\hat{B}$ نیز فاقد تبه‌گنی است لذا $\{\hat{B}\}$ یک مجموعه کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده است. اما چون $\hat{A}$ و $\hat{B}$ با هم جابه‌جا نمی‌شوند پس $\{\hat{A}, \hat{B}\}$ یک مجموعه کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده نیست.

(ب)

ابتدا $|\psi(t)\rangle$ را به‌نجار می‌کنیم و آن را $|\psi_N(t)\rangle$ می‌نامیم:

$$|\psi_N(t)\rangle = \frac{|\psi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -i \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

در اندازه‌گیری $\hat{A}$ احتمال اینکه مقدار ۱- حاصل شود برابر است با:

$$P_1 = \left| \langle a_1 | \psi_N(t) \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} (1 \quad -i \quad -1) \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -i \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{15} |-3i|^2 = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

پس از این اندازه‌گیری، حالت سیستم به $|a_1\rangle$ تغییر می‌کند. حال در اندازه‌گیری $\hat{B}$ احتمال اینکه مقدار ۳ به‌دست آید برابر است با:

$$P_2 = \left| \langle b_1 | a_1 \rangle \right|^2 = \left| (1 \quad 0 \quad 0) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

اما احتمال مطلوب در قسمت (ب) در واقع حاصل ضرب این دو احتمال است، یعنی:

$$P = P_1 P_2 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$$

(پ)

احتمال مطلوب را P' می‌نامیم؛ پس:

$$P' = \left| \langle b_1 | \psi_N(t) \rangle \right|^2 \left| \langle b_1 | a_2 \rangle \right|^2$$

اما:

$$\langle b_1 | \psi_N(t) \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -i \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-i}{\sqrt{5}}$$

پس:

$$P' = \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$$

نتیجه این است که $P \neq P'$ و علت آن عدم جابه‌جایی $\hat{A}$ و $\hat{B}$ است و لذا در اینجا ترتیب اندازه‌گیری دارای اهمیت می‌باشد.

تمرین ۳-۲۰

سیستمی فیزیکی را در نظر بگیرید که دارای تعدادی مشاهده‌پذیر است که با ماتریس‌های زیر نمایش داده می‌شوند:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & i \\ -1 & -i & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(آ) نتایج اندازه‌گیری‌های مشاهده‌پذیرهای سازگار را بیابید.

(ب) از میان این مشاهده‌پذیرها کدام یک سازگار هستند؟ پایه‌ای از ویژه بردارهای مشترک این مشاهده‌پذیرها را ارائه دهید.

(پ) از میان مجموعه‌های عملگری $\{\hat{A}, \hat{B}\}, \{\hat{A}, \hat{C}\}, \{\hat{B}, \hat{C}\}$ و $\{\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}\}$ کدام یک مجموعه‌ای کامل از عملگرهای جابه‌جاشونده تشکیل می‌دهد؟

حل:

(آ)

نتایج اندازه‌گیری A ، B و C عبارتند از:

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_3 = -1$$

$$b_1 = 0, \quad b_r = 2 + \sqrt{6}, \quad b_r = 2 - \sqrt{6}$$

$$c_1 = 2, \quad c_r = 4, \quad c_r = -2$$

(ب)

از این سه عملگر فقط $\hat{A}$ و $\hat{C}$ با هم جابه‌جا می‌شوند. چون $\hat{C}$ فاقد ویژه بردارهای تبهگن است لذا ویژه بردارهای آن، خودبه‌خود تشکیل یک مجموعه‌ی کامل را می‌دهند. و به دلیل آنکه $[\hat{A}, \hat{C}] = 0$ ، لذا ویژه بردارهای آن، ویژه بردارهای عملگر $\hat{A}$ نیز خواهند بود به‌طوری‌که:

$$|c_1 = 2, a_1 = 1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |c_r = 4, a_r = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |c_r = -2, a_r = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(پ)

چون عملگر $\hat{A}$ دارای ویژه بردارهای تبهگن است، ویژه بردارهای آن خودبه‌خود یک مجموعه‌ی کامل را تشکیل نمی‌دهند و یا به عبارتی $\{A\}$ یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده نیست.

عملگرهای $\hat{B}$ و $\hat{C}$ چون فاقد ویژه بردارهای تبهگن هستند لذا ویژه بردارهای آنها تشکیل یک مجموعه‌ی کامل را می‌دهند و یا به عبارتی $\{\hat{B}\}$ و $\{\hat{C}\}$ هر کدام یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده هستند.

چون $\hat{A}$ و $\hat{B}$ با هم جابه‌جا نمی‌شوند پس $\{\hat{A}, \hat{B}\}$ یک مجموعه‌ی کامل عملگرهای جابه‌جا شونده نیست.

در مورد عملگر $\hat{B}$ و $\hat{C}$ نیز به همین ترتیب. اما $\hat{A}$ و $\hat{C}$ چون با هم جابه‌جا می‌شوند و چون $\hat{C}$ فاقد ویژه بردارهای تبهگن است لذا $\{\hat{A}, \hat{C}\}$ یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده است.

تمرین ۳-۲۱

سیستمی را در نظر بگیرید که ابتدا در حالت $|\psi(0)\rangle$ و دارای هامیلتونی $\hat{H}$ است که در آن

$$|\psi(0)\rangle = \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix}, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) اگر اندازه‌گیری $\hat{H}$ انجام شود، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی به‌دست خواهند آمد؟

(ب) حالت سیستم را در زمان t بیابید. ممکن است از بسط $|\psi(0)\rangle$ برحسب ویژه بردارهای $\hat{H}$ استفاده کنید.

(ب) انرژی کل سیستم را در زمان $t=0$ و در زمان t پس از آن بیابید. آیا این مقادیر با هم متفاوت اند؟

(ت) آیا $\hat{H}$ یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جاشونده را تشکیل می‌دهد؟

حل:
(آ)

ابتدا $|\psi(0)\rangle$ را بهنجار می‌کنیم و آن را $|\psi_N(0)\rangle$ می‌نامیم.

$$|\psi_N(0)\rangle = \frac{|\psi(0)\rangle}{\sqrt{\langle\psi(0)|\psi(0)\rangle}} = \frac{|\psi(0)\rangle}{\sqrt{|4-i|^2 + |-2+5i|^2 + |3+2i|^2}} = \frac{1}{\sqrt{59}} \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix}$$

ویژه مقادیر $\hat{H}$ از حل معادله $\det(H-h)=0$ به دست می‌آیند. اگر فرض کنیم $h = \frac{h'}{\sqrt{2}}$ آنگاه:

$$\det \begin{vmatrix} -h' & -i & 0 \\ i & 3-h' & 3 \\ 0 & 3 & -h' \end{vmatrix} = -h'[(3-h')(-h')-9] + i[i(-h')-3 \times 0] = 0.$$

نتیجه‌ی حل این معادله آن است که:

$$h_1 = \frac{-2}{\sqrt{2}}, \quad h_2 = 0, \quad h_3 = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

پس در اندازه‌گیری $\hat{H}$ یکی از مقادیر h_1, h_2, h_3 با احتمال P_1, P_2, P_3 یافت می‌شود. برای محاسبه‌ی این احتمالات، ابتدا ویژه بردارهای بهنجار $\hat{H}$ را که خودبه‌خود متعامد نیز می‌باشند (به دلیل عدم تبه‌گنی) می‌یابیم.

$$\text{با فرض } |h_1\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ داریم:}$$

$$H|h_1\rangle = h_1|h_1\rangle$$

پس:

$$-iy = -2x$$

$$ix + 2y + 3z = -2y$$

$$2y = -2z$$

نتیجه می‌شود که:

$$|h_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2i \\ 3i \end{pmatrix}$$

به همین ترتیب:

$$|h_r\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, |h_r\rangle = \frac{1}{\sqrt{35}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5i \\ 2i \end{pmatrix}$$

حال P_1, P_r و P_r را می‌یابیم:

$$P_1 = \left| \langle h_1 | \psi_N(\cdot) \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{14}} (1 \quad 2i \quad -3i) \frac{1}{\sqrt{59}} \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{14^2}{14 \times 59} = \frac{14}{59}$$

$$P_r = \left| \langle h_r | \psi_N(\cdot) \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{10}} (-3i \quad 0 \quad 1) \frac{1}{\sqrt{59}} \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{10^2}{10 \times 59} = \frac{10}{59}$$

$$P_r = 1 - (P_1 + P_r) = 1 - \left(\frac{14}{59} + \frac{10}{59} \right) = \frac{59 - 24}{59} = \frac{35}{59}$$

(ب)

$$|\psi_N(t)\rangle = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\psi_N(\cdot)\rangle$$

اما می‌توانیم $|\psi_N(\cdot)\rangle$ را بر حسب ویژه بردارهای راست هنجار $\hat{H}$ بسط دهیم.

$$|\psi_N(\cdot)\rangle = \sum_{i=1}^r |h_i\rangle \langle h_i | \psi_N(\cdot) \rangle$$

پس:

$$|\psi_N(t)\rangle = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \sum_{i=1}^r |h_i\rangle \langle h_i | \psi_N(\cdot) \rangle = \sum_{i=1}^r |h_i\rangle \langle h_i | \psi_N(\cdot) \rangle e^{\frac{-iE_i t}{\hbar}} = \sum_{i=1}^r e^{\frac{-iE_i t}{\hbar}} |h_i\rangle \langle h_i | \psi_N(\cdot) \rangle$$

$$\langle h_1 | \psi_N(\cdot) \rangle = \frac{1}{\sqrt{14}} (1 \quad 2i \quad -3i) \frac{1}{\sqrt{59}} \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix} = -\sqrt{\frac{14}{59}} i$$

$$\langle h_r | \psi_N(\cdot) \rangle = \frac{1}{\sqrt{10}} (-3i \quad 0 \quad 1) \frac{1}{\sqrt{59}} \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix} = -\sqrt{\frac{10}{59}} i$$

$$\langle h_r | \psi_N(\cdot) \rangle = \frac{1}{\sqrt{35}} (1 \quad -5i \quad -2i) \frac{1}{\sqrt{59}} \begin{pmatrix} 4-i \\ -2+5i \\ 3+2i \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{35}{59}}$$

پس:

$$|\psi_N(t)\rangle = -\sqrt{\frac{14}{59}} i e^{\frac{-5i\sqrt{2}t}{\hbar}} |a_1\rangle - \sqrt{\frac{10}{59}} i |a_2\rangle + \sqrt{\frac{35}{59}} e^{\frac{-5i\sqrt{2}t}{2\hbar}} |a_3\rangle$$

(پ)

$$\begin{aligned} E(t) &= \langle \psi_N(t) | \hat{H} | \psi_N(t) \rangle = \langle \psi_N(\cdot) | e^{i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} \hat{H} e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} | \psi_N(\cdot) \rangle = \langle \psi_N(\cdot) | \hat{H} e^{i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} | \psi_N(\cdot) \rangle \\ &= \langle \psi_N(\cdot) | \hat{H} | \psi_N(\cdot) \rangle = E(\cdot) \end{aligned}$$

(ت)

چون $\hat{A}$ فاقد ویژه بردارهای تبهگن است لذا $\{\hat{A}\}$ یک مجموعه‌ی کامل عملگرهای جابه‌جا شونده را تشکیل می‌دهد.

تمرین ۲۲-۳

ذره‌ای را در نظر بگیرید که در یک پتانسیل ندرده‌ای $V(\vec{r}) = V_x(x) + V_y(y) + V_z(z)$ حرکت می‌کند.

(آ) نشان دهید که هامیلتونی این ذره را می‌توان به صورت $\hat{H} = \hat{H}_x + \hat{H}_y + \hat{H}_z$ نوشت که در آن $\hat{H}_x = \frac{\hat{P}_x^2}{2m} + V_x(x)$ و به همین ترتیب.

(ب) آیا $\hat{H}_x, \hat{H}_y, \hat{H}_z$ یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جاشونده را تشکیل می‌دهند؟

حل:

(آ)

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{P}^2}{2m} + \hat{V}(\vec{r}) = \frac{\hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_z^2}{2m} + \hat{V}_x(x) + \hat{V}_y(y) + \hat{V}_z(z) \\ &= \frac{\hat{P}_x^2}{2m} + \hat{V}_x(x) + \frac{\hat{P}_y^2}{2m} + \hat{V}_y(y) + \frac{\hat{P}_z^2}{2m} + \hat{V}_z(z) = \hat{H}_x + \hat{H}_y + \hat{H}_z \end{aligned}$$

(ب)

چون $\hat{H}_x, \hat{H}_y, \hat{H}_z$ فاقد ویژه توابع تبهگن هستند و از طرفی دو به دو با هم جابه‌جا می‌شوند بنابراین $\{\hat{H}_x, \hat{H}_y, \hat{H}_z\}$ تشکیل یک مجموعه‌ی کامل از عملگرهای جابه‌جا شونده را می‌دهند.

تمرین ۲۳-۳

سیستمی را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن $H = \varepsilon \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ است و در آن ε ثابتی حقیقی با بعد

انرژی است.

(آ) ویژه مقدارهای انرژی H را بیابید.

(ب) اگر سیستم ابتدا (یعنی در $t=0$) در حالت $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ باشد، احتمال را طوری بیابید که اندازه‌گیری انرژی در $t=0$ ، E_1 و E_2 را نتیجه دهد.

(پ) مقدار میانگین انرژی $\langle \hat{H} \rangle$ و عدم قطعیت انرژی $\sqrt{\langle \hat{H}^2 \rangle - \langle \hat{H} \rangle^2}$ را بیابید.

(ت) حالت $|\psi(t)\rangle$ را بیابید.

حل:

(آ)

$$\text{Tr}(H) = E_1 + E_2 = 0$$

$$\det(H) = -\varepsilon^2 = E_1 E_2$$

پس:

$$E_1 = -E_2 = \varepsilon$$

(ب)

اما ویژه بردارهای راست هنجار (چون $\hat{H}$ فاقد ویژه بردار تبه‌گن است، ویژه بردارهای آن خودبه‌خود متعامد هستند) متناظر عبارتند از:

$$|E_1 = \varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |E_2 = -\varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$P_1(E_1) = \left| \langle E_1 | \psi(0) \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_2(E_2) = \left| \langle E_2 | \psi(0) \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

(پ)

در اینجا ذکر این نکته مفید است که مقدار چشمداشتی $\hat{H}$ و یا هر تابعی از آن در طول زمان ثابت است.

$$\langle \hat{H} \rangle = P_1 E_1 + P_2 E_2 = \frac{1}{2} \varepsilon + \frac{1}{2} (-\varepsilon) = 0$$

$$\langle \hat{H}^2 \rangle = P_1 E_1^2 + P_2 E_2^2 = \frac{1}{2} \varepsilon^2 + \frac{1}{2} (-\varepsilon)^2 = \varepsilon^2$$

$$\Delta \hat{H} = \sqrt{\langle \hat{H}^2 \rangle - \langle \hat{H} \rangle^2} = \sqrt{\varepsilon^2 - 0^2} = |\varepsilon|$$

(ت)

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\psi(0)\rangle = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \left(\frac{|E_1\rangle + |E_2\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{e^{\frac{-iE_1t}{\hbar}} |E_1\rangle + e^{\frac{-iE_2t}{\hbar}} |E_2\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} e^{\frac{-i\varepsilon t}{\hbar}} \\ i e^{\frac{-i\varepsilon t}{\hbar}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{\frac{i\varepsilon t}{\hbar}} \\ -i e^{\frac{i\varepsilon t}{\hbar}} \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\varepsilon t}{\hbar}\right) \\ \sin\left(\frac{\varepsilon t}{\hbar}\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

تمرین ۳-۲۴

رابطه‌ی زیر را ثابت کنید:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \hat{B} \rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{B} \right\rangle + \left\langle \hat{A} \frac{\partial \hat{B}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \hat{B} \rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle \hat{A} [\hat{B}, \hat{H}] \rangle$$

حل:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \hat{A} \hat{B} \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A} \hat{B}, \hat{H}] \rangle + \left\langle \frac{\partial (\hat{A} \hat{B})}{\partial t} \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \hat{B} + \hat{A} [\hat{B}, \hat{H}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{B} + \hat{A} \frac{\partial \hat{B}}{\partial t} \right\rangle \\ &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \hat{B} \rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle \hat{A} [\hat{B}, \hat{H}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{B} \right\rangle + \left\langle \hat{A} \frac{\partial \hat{B}}{\partial t} \right\rangle \end{aligned}$$

تمرین ۳-۲۵

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که تحت تأثیر نیروی گرانش حرکت می‌کند. هامیلتونی ذره

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_z^2}{2m} - mg\hat{Z} \quad \text{می‌باشد که در آن } g \text{ شتاب ناشی از گرانش است } (g = 9.8 \text{ ms}^{-2}).$$

$$(1) \quad \frac{d\langle \hat{H} \rangle}{dt} \text{ و } \frac{d\langle \hat{P}_z \rangle}{dt}, \frac{d\langle \hat{Z} \rangle}{dt} \text{ را محاسبه کنید.}$$

$$(2) \quad \text{معادله‌ی } \frac{d\langle \hat{Z} \rangle}{dt} \text{ را حل کنید و } \langle \hat{Z} \rangle(t) \text{ را به دست آورید به طوری که } \langle \hat{P}_z \rangle(0) = 0 \text{ و } \langle \hat{Z} \rangle(0) = h$$

نتیجه را با رابطه‌ی کلاسیکی $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h$ مقایسه کنید.

حل:

(1)

$$\frac{d\langle \hat{Z} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{Z}, \hat{H}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Z}}{\partial t} \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \left[\hat{Z}, \frac{\hat{P}_z^2}{2m} + mg\hat{Z} \right] = \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} [\hat{Z}, \hat{P}_z^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_x^2]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{i\hbar m} \langle [\hat{Z}, \hat{P}_z] \rangle = \frac{1}{i\hbar m} \langle i\hbar \hat{P}_z \rangle = \frac{\langle \hat{P}_z \rangle}{m} \\
\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{P}, \hat{H}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{P}}{\partial t} \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \left\langle \hat{P}, \frac{\hat{P}^2}{2m} + mg\hat{Z} \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{P}, mg\hat{Z}] \rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar} \left\langle \left[\sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}, mg\hat{Z} \right] \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \left\langle i\hbar \left\{ \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}, mg\hat{Z} \right\} \right\rangle = - \left\langle \frac{\hat{P}_z}{m} \right\rangle \\
&= -mg \left\langle \frac{\hat{P}_z}{m} \right\rangle
\end{aligned}$$

$$\frac{d\langle \hat{\vec{P}} \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \langle \hat{i}P_x + \hat{j}P_y + \hat{k}P_z \rangle = \hat{i} \frac{d\langle P_x \rangle}{dt} + \hat{j} \frac{d\langle P_y \rangle}{dt} + \hat{k} \frac{d\langle P_z \rangle}{dt}$$

اما:

$$\frac{d\langle \hat{P}_x \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \hat{P}_x}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{P}_x, \hat{H}] \rangle = 0 = \frac{d\langle \hat{P}_y \rangle}{dt}$$

$$\frac{d\langle \hat{P}_z \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{P}_z, mg\hat{Z}] \rangle = -mg$$

پس:

$$\frac{d\langle \hat{\vec{P}} \rangle}{dt} = -mg\hat{k}$$

$$\frac{d\langle \hat{H} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{H}] \rangle = 0$$

(ب)

از طرفین رابطه‌ی $\frac{d\langle \hat{Z} \rangle}{dt} = \frac{\langle \hat{P}_z \rangle}{m}$ نسبت به زمان مشتق می‌گیریم:

$$\frac{d^2\langle \hat{Z} \rangle}{dt^2} = \frac{1}{m} \frac{d}{dt} \langle \hat{P}_z \rangle = \frac{1}{m} (-mg) = -g$$

$$\frac{d\langle \hat{Z} \rangle}{dt} = -gt + \left(\frac{d\langle \hat{Z} \rangle}{dt} \right)_{t=0} = -gt + \frac{\langle \hat{P}_z \rangle(0)}{m}$$

$$\langle \hat{Z} \rangle = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{\langle \hat{P}_z \rangle(0)}{m}t + \langle \hat{Z} \rangle(0)$$

با فرض اینکه $\langle \hat{P}_z \rangle(0) = 0$ آنگاه:

$$\langle \hat{Z} \rangle = -\frac{1}{2}gt^2 + h$$

در اینجا باید گفت منظور از $\langle \hat{P}_z \rangle(0)$ و $\langle \hat{Z} \rangle(0)$ عبارت است از $\langle \hat{P}_z \rangle$ و $\langle \hat{Z} \rangle$ در لحظه‌ی صفر.

تمرین ۳-۲۶

برای ذره‌ای با هامیلتونی $\hat{H} = \frac{\hat{P}_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2 + V_0 \hat{X}^2$ ، $\frac{d\langle \hat{H} \rangle}{dt}$ و $\frac{d\langle \hat{P}_x \rangle}{dt}$ ، $\frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt}$ را محاسبه کنید.

حل:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \hat{X} \rangle}{dt} &= \left\langle \frac{\partial \hat{X}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{X}, \hat{H}] \rangle = \frac{1}{i\hbar} \left\langle \hat{X}, \frac{\hat{P}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2 + V_0 \hat{X}^2 \right\rangle = \frac{1}{i\hbar} \left\langle \hat{X}, \frac{\hat{P}_x^2}{2m} \right\rangle \\ &= \frac{1}{2i\hbar m} \langle 2\hat{P}_x \rangle = \frac{\langle \hat{P}_x \rangle}{m} \\ \frac{d\langle \hat{P}_x \rangle}{dt} &= \left\langle \frac{\partial \hat{P}_x}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{P}_x, \hat{H}] \rangle = \frac{1}{i\hbar} \left\langle \hat{P}_x, \frac{\hat{P}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}^2 + V_0 \hat{X}^2 \right\rangle = -\langle [m\omega^2 \hat{X} + 2V_0 \hat{X}] \rangle \\ &= -m\omega^2 \langle \hat{X} \rangle + (-2)V_0 \langle \hat{X} \rangle \\ \frac{d\langle \hat{H} \rangle}{dt} &= \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{H}] \rangle = 0 \end{aligned}$$

تمرین ۳-۲۷

سیستمی را در نظر بگیرید که حالت اولیه‌ی آن در $t=0$ برحسب مجموعه‌ای از چهار بردار $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ و $|\phi_4\rangle$ به صورت زیر است:

$$|\psi(0)\rangle = \frac{A}{\sqrt{12}}|\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|\phi_2\rangle + \frac{2}{\sqrt{12}}|\phi_3\rangle + \frac{1}{2}|\phi_4\rangle$$

و در آن A یک ثابت حقیقی است.

(آ) A را به گونه‌ای بیابید که $|\psi(0)\rangle$ بهنجار باشد.

(ب) اگر انرژی‌های متناظر با $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, |\phi_3\rangle$ و $|\phi_4\rangle$ به ترتیب با E_1, E_2, E_3 و E_4 داده شوند، حالت سیستم $|\psi(t)\rangle$ در هر زمان t پس از آن را بنویسید.

(پ) احتمال یافتن سیستم در یک زمان t در حالت $|\phi_3\rangle$ را تعیین کنید.

حل:

(ا)

$$1 = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle = \frac{|A|^2}{6} + \frac{1}{6} + 1 + \frac{1}{6}$$

ملاحظه می‌شود که به ازای هر مقداری از A ، حالت سیستم غیر قابل بهنجار شدن است. به جای $|\psi(0)\rangle$ داده شده، از $|\psi_N(0)\rangle$ که در ذیل می‌آید استفاده می‌شود:

$$|\psi_N(0)\rangle = \sqrt{\frac{12}{19}} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} |\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} |\phi_2\rangle + |\phi_3\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} |\phi_4\rangle \right)$$

(ب)

$$|\psi_N(t)\rangle = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} |\psi_N(0)\rangle = \sqrt{\frac{12}{19}} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} |\phi_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} |\phi_2\rangle + e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} |\phi_3\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_4 t}{\hbar}} |\phi_4\rangle \right)$$

(پ)

$$P = \left| \langle \phi_3 | \psi_N(t) \rangle \right|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \right|^2 = \frac{1}{6}$$

فصل چهارم

مسأله‌های یک بُعدی

تمرین ۴-۱

ذره‌ای به جرم m در معرض پتانسیل زیر قرار دارد:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < a/2 \\ \infty & |x| > a/2 \end{cases}$$

(آ) توابع موج حالت پایه و اولین و دومین حالت برانگیخته را بیابید.

(ب) مقادیر E_1, E_2, E_3 را بیابید.

(پ) چگالی‌های احتمال $P(x,t)$ و $P_r(x,t)$ را رسم کنید.

(ت) $\langle X \rangle_r, \langle X \rangle_r, \langle P \rangle_r$ و $\langle P \rangle_r$ را بیابید.

(ث) $\Delta x \Delta p$ را برای حالت‌های $\psi_r(x,t)$ و $\psi_r(x,t)$ برآورد کنید.

حل:

(آ)

توصیف حرکت ذره‌ی میکروسکوپیکی به جرم m در پتانسیل یک بُعدی مستقل از زمان از طریق معادله‌ی شرودینگر بیان می‌شود:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

در این رابطه، $\psi(x)$ و E به ترتیب ویژه توابع و ویژه مقادیر هامیلتونی هستند.

در این مسئله چون در نواحی $|x| > \frac{a}{2}$ پتانسیل نامتناهی است، لذا در این نواحی تابع موج باید صفر باشد و برای ناحیه‌ی $|x| < \frac{a}{2}$ داریم:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = E \psi(x)$$

و یا به عبارتی:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

که در این رابطه:

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

جواب این معادله عبارتست از:

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

اما پیوستگی تابع موج در $|x| = \frac{a}{2}$ بیانگر آنست که:

$$\psi\left(x = \frac{a}{2}\right) = \psi\left(x = -\frac{a}{2}\right) = 0$$

یا به عبارتی:

$$A \sin \frac{ka}{2} + B \cos \frac{ka}{2} = 0$$

$$-A \sin \frac{ka}{2} + B \cos \frac{ka}{2} = 0$$

این دو رابطه‌ی بیانگر آن هستند که از بین A و B یکی باید صفر و دیگری غیر صفر باشد یعنی $\psi(x)$ یا باید به شکل $\psi(x) = A \sin kx$ و یا به شکل $\psi(x) = B \cos kx$ باشد. در مورد اول داریم:

$$A \sin \frac{ka}{2} = 0$$

پس چون A باید صفر باشد لذا:

$$\frac{ka}{2} = m\pi \quad ; \quad m = 1, 2, \dots$$

در مورد دوم داریم:

$$B \cos \frac{ka}{2} = 0$$

و چون B باید غیر صفر باشد لذا:

$$\frac{ka}{2} = m'\pi + \frac{\pi}{2} ; m' = 0, 1, 2, \dots$$

پس به‌طور کلی نتیجه می‌شود که:

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) ; n = 2, 4, \dots \\ B \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) ; n = 1, 3, \dots \end{cases}$$

A و B نیز از شرط بهنجارش به دست می‌آیند:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x)|^2 dx$$

که نتیجه می‌دهد:

$$A = B\sqrt{\frac{2}{a}}$$

انرژی نیز از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} ; n = 1, 2, \dots$$

پس ویژه تابع حالت پایه عبارتست از:

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

ویژه تابع اولین حالت برانگیخته عبارتست از:

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

و ویژه تابع دومین حالت برانگیخته عبارتست از:

$$\psi_3(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$$

(ب)

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

$$E_2 = \frac{4\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} = \frac{4\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

$$E_3 = \frac{9\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

(پ)


از آنجا که در حالت کلی:

$$\psi_n(x, t) = e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \psi_n(x)$$

لذا:

$$P_r(x, t) = |\psi_r(x, t)|^2 = \left| \psi_r(x) e^{-\frac{iE_r t}{\hbar}} \right|^2 = |\psi_r(x)|^2 = \frac{r}{a} \sin^2 \left(\frac{r\pi x}{a} \right)$$

$$P_r(x, t) = |\psi_r(x, t)|^2 = \left| \psi_r(x) e^{-\frac{iE_r t}{\hbar}} \right|^2 = |\psi_r(x)|^2 = \frac{r}{a} \cos^2 \left(\frac{r\pi x}{a} \right)$$

نمودارهای P_r و P_r 

(ت)

$$\langle \hat{X} \rangle_r = \langle \psi_r | \hat{X} | \psi_r \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi_r^*(x) x \psi_r(x) = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \psi_r(x) x \psi_r(x) = 0$$

علت صفر شدن رابطه‌ی اخیر آن است که $\psi_r(x)$ تابعی فرد است. لذا انتگرالده تابعی فرد خواهد شد و چون بازه انتگرال‌گیری متقارن است، نتیجه‌ی انتگرال صفر خواهد شد. به‌طور کلی چون در این مسأله، ویژه توابع انرژی دارای پاریتی مشخص هستند (یعنی یا زوج هستند یا فرد)، لذا محاسبه‌ی مقدار چشمداشتی عملگرهای $\hat{X}$ و $\hat{P}$ با استفاده از هر یک از این ویژه توابع، مقداری صفر خواهد بود. پس:

$$\langle \hat{X} \rangle_r = \langle \hat{X} \rangle_r = 0$$

و:

$$\langle \hat{P} \rangle_r = \langle \hat{P} \rangle_r = 0$$

(ث)

از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

$$\Delta x = \sqrt{\langle \hat{X}^2 \rangle - \langle \hat{X} \rangle^2}$$

$$\Delta p = \sqrt{\langle \hat{P}^2 \rangle - \langle \hat{P} \rangle^2}$$

در اینجا $\langle \hat{X} \rangle = 0$ و $\langle \hat{P} \rangle = 0$ بنابراین:

$$\Delta x = \sqrt{\langle \hat{X}^2 \rangle}$$

$$\Delta p = \sqrt{\langle \hat{P}^2 \rangle}$$

برای حالت $\psi_r(x, t)$ داریم:

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_t = \langle \psi_r | \hat{X}^2 | \psi_r \rangle_t = \int_{-\frac{a}{r}}^{\frac{a}{r}} dx \psi_r^*(x, t) x^2 \psi_r(x, t) = \int_{-\frac{a}{r}}^{\frac{a}{r}} \sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) x^2 \sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) dx$$

$$= r \left(\frac{r}{a}\right) \int_{-\frac{a}{r}}^{\frac{a}{r}} x^2 \sin^2\left(\frac{r\pi x}{a}\right) dx = \frac{a^r}{\pi^r} \frac{r\pi^r + r}{r^2}$$

$$\langle \hat{P}^2 \rangle_t = \langle \psi_r | \hat{P}^2 | \psi_r \rangle_t = \int_{-\frac{a}{r}}^{\frac{a}{r}} dx \psi_r^*(x, t) \left(\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \right)^2 \psi_r(x, t)$$

$$= -\hbar^r \int_{-\frac{a}{r}}^{\frac{a}{r}} dx \sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \frac{d^2}{dx^2} \left[\sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \right] dx = \hbar^r \left(\frac{r\pi}{a}\right)^r \left(\frac{r}{a}\right) \int_{-\frac{a}{r}}^{\frac{a}{r}} \sin^2\left(\frac{r\pi x}{a}\right) dx$$

$$= \hbar^r \left(\frac{r\pi}{a}\right)^r$$

پس:

$$\Delta x = \frac{a}{r\pi} \sqrt{\frac{r\pi^r + r}{r}}$$

$$\Delta p = \frac{r\pi}{a} \hbar$$

و در نتیجه:

$$\Delta x \Delta p = \left(\frac{2\pi^2 + 2}{6} \right)^{\frac{1}{2}}$$

برای حالت $\psi_r(x, t)$ داریم:

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_t = 2 \left(\frac{2}{a} \right) \int_0^a x^2 \cos^2 \frac{2\pi x}{a} dx = \frac{(4\pi^2 - 2)a^2}{24\pi^2}$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle_t = \hbar^2 \left(\frac{2\pi}{a} \right)^2$$

$$\Delta x \Delta p = \frac{a}{6\pi} (4\pi^2 - 2)^{\frac{1}{2}} \hbar \frac{2\pi}{a} = \frac{\hbar}{2} (4\pi^2 - 2)^{\frac{1}{2}}$$

تمرین ۲-۴

سیستمی را در نظر بگیرید که تابع موج آن در $t=0$ عبارت است از

$$\psi(x, 0) = \frac{3}{\sqrt{30}} \phi_1(x) + \frac{4}{\sqrt{30}} \phi_2(x) + \frac{1}{\sqrt{6}} \phi_3(x),$$

که در آن $\phi_n(x)$ تابع موج حالت برانگیخته n ام یک چاه پتانسیل مربعی نامتناهی به پهنای a و انرژی آن $E_n = \pi^2 \hbar^2 n^2 / (2ma^2)$ است.

(آ) انرژی میانگین این سیستم را بیابید.

(ب) حالت $\psi(x, t)$ را در زمان t و مقدار متوسط انرژی را بیابید. نتیجه را با مقدار به دست آمده در قسمت (آ) مقایسه کنید.

حل:

(آ)

به طور کلی اگر تابع موج بهنجار $\psi(x)$ را بر حسب ویژه توابع راست هنجار مشاهده پذیر $\hat{A}$ ؛ $\{\phi_n(x)\}$ بسط دهیم، یعنی:

$$\psi(x) = \sum_n C_n \phi_n(x)$$

آنگاه مقدار چشمداشتی عملگر $\hat{A}$ عبارت خواهد بود از:

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_n |C_n|^2 a_n$$

که در این رابطه، a_n ویژه مقدار متناظر با ویژه تابع $\phi_n(x)$ است. پس در مورد این مسئله داریم:

$$\langle \hat{H} \rangle = \left| \frac{3}{\sqrt{30}} \right|^2 E_1 + \left| \frac{4}{\sqrt{30}} \right|^2 E_2 + \left| \frac{1}{\sqrt{6}} \right|^2 E_3$$

$$= \frac{9}{30} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \frac{16}{30} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \frac{1}{6} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{1}{30} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (9 + 64 + 125) = \frac{33}{5} \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

(ب) به‌طور کلی $\psi(x, t)$ از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:

$$\psi(x, t) = e^{\frac{-iHt}{\hbar}} \psi(x, 0)$$

اما اگر $\psi(x, 0)$ را برحسب ویژه توابع انرژی بسط داده باشیم یعنی:

$$\psi(x, 0) = \sum_n C_n \phi_n(x)$$

که در آن $\{\phi_n(x)\}$ ویژه توابع انرژی هستند، آنگاه:

$$\psi(x, t) = e^{\frac{-iHt}{\hbar}} \sum_n C_n \phi_n = \sum_n C_n e^{\frac{-iHt}{\hbar}} \phi_n(x) = \sum_n C_n e^{\frac{-iE_n t}{\hbar}} \phi_n(x)$$

پس در اینجا داریم:

$$\psi(x, t) = \frac{3}{\sqrt{30}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \phi_1(x) + \frac{4}{\sqrt{30}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \phi_2(x) + \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \phi_3(x)$$

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} \rangle_t &= \left| \frac{3}{\sqrt{30}} e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \right|^2 E_1 + \left| \frac{4}{\sqrt{30}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \right|^2 E_2 + \left| \frac{1}{\sqrt{6}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \right|^2 E_3 \\ &= \left| \frac{3}{\sqrt{30}} \right|^2 E_1 + \left| \frac{4}{\sqrt{30}} \right|^2 E_2 + \left| \frac{1}{\sqrt{6}} \right|^2 E_3 = \langle \hat{H} \rangle_{t=0} = \frac{33}{5} \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2} \end{aligned}$$

و این نتیجه‌ای کلی است:

$$\langle \hat{H} \rangle_t = \langle \hat{H} \rangle_{t=0}$$

تمرین ۳-۴

الکترونی با انرژی جنبشی 10 eV در مقدارهای منفی x از چپ به راست و در راستای محور x در حال حرکت است. انرژی پتانسیل عبارت است از:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0) \\ 20 \text{ eV} & (x > 0) \end{cases}$$

(آ) معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان را در محدوده‌های $x \leq 0$ و $x > 0$ بنویسید.

(ب) یک جواب را برای $\psi_E(x)$ رسم کنید.

(پ) تابع موج الکترون را (برحسب متر) در $-10 \text{ m} < x < -20 \text{ m}$ و $x > 10 \text{ m}$ محاسبه کنید.

(ت) شرایط مرزی را در $x=0$ بنویسید.
 (ث) نسبت احتمالها را برای یافتن الکترون نزدیکی $x=10^{-10} \text{ m}$ و $x=0$ محاسبه کنید.

حل:

به طور کلی داریم:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

پس:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} = E \psi_1(x) \quad ; \quad x < 0$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_2(x)}{dx^2} = (E - V_0) \psi_2(x) \quad ; \quad x > 0$$

و یا به طور معادل:

$$\frac{d^2 \psi_1}{dx^2} + k_1^2 \psi_1(x) = 0 \quad ; \quad x < 0$$

$$\frac{d^2 \psi_2}{dx^2} - k_2'^2 \psi_2(x) = 0 \quad ; \quad x > 0$$

که در آن:

$$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$k_2'^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)$$

پس جوابهای مربوط به $\psi_1(x)$ و $\psi_2(x)$ عبارتند از:

$$\psi_1(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x}$$

$$\psi_2(x) = C e^{-k_2' x} + D e^{k_2' x}$$

از آنجا که تابع موج باید متناهی باشد، چون عبارت $e^{k_2' x}$ وقتی $x \rightarrow +\infty$ واگرا می شود لذا D باید صفر باشد. از پیوستگی تابع موج در $x=0$ داریم:

$$\psi_1(0) = \psi_2(0)$$

یا:

$$A + B = C$$

از پیوستگی مشتق تابع موج در $x = 0$ داریم:

$$ik_1(A - B) = -k'_r C$$


از حل این دو معادله‌ی اخیر خواهیم داشت:

$$B = \frac{k_1 - ik'_r}{k_1 + ik'_r} A$$

$$C = \frac{2k_1}{k_1 + ik'_r} A$$

و یا به عبارتی:

$$\psi'_E(x) = \frac{k_1 + ik'_r}{2a} \psi_E(x) = \begin{cases} k_1 \cos k_1 x - k'_r \sin k_1 x & ; \quad x < 0 \\ k_1 e^{-k'_r x} & ; \quad x > 0 \end{cases}$$



برای ناحیه‌ی $-20m < x < -10m$ می‌توان طول موج الکترون را از رابطه‌ی زیر یافت:

$$\lambda_1 = \frac{2\pi}{k_1} = \frac{2\pi}{\left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE}} = \frac{2\pi \times 197 / 327 \frac{\text{eV} \cdot \text{nm}}{c}}{\left(2 \times 0.511 \frac{\text{MeV}}{c^2} \times 10 \text{ eV}\right)^{\frac{1}{2}}} \simeq 3/95 \text{ \AA}$$

برای ناحیه‌ی $x > 10$ به دلیل رفتارنمایی تابع موج، تعریف طول موج چندان بامعنا نیست.

اگر احتمال یافتن الکترون حول $x = 10^{-10}m$ را با P و حول $x = 0$ را با P' نشان دهیم آنگاه:

$$\frac{P}{P'} = \frac{|\psi(x = 10^{-10}m)|^2}{|\psi(x = 0)|^2} = \frac{\left|k_1 \cos\left(\frac{2\pi}{3/95 \text{ \AA}} \times 1 \text{ \AA}\right) - k'_r \sin\left(\frac{2\pi}{3/95 \text{ \AA}} \times 1 \text{ \AA}\right)\right|^2}{k_1^2} \simeq \frac{k'^2_r}{k_1^2} = \frac{V - E}{E}$$

تمرین ۴-۴

ذره‌ای در چاه پتانسیل زیر در حال حرکت است:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & -a \leq x \leq -b \\ V_0 & -b \leq x \leq b \\ 0 & b \leq x \leq a \\ +\infty & \text{بقیه جاها} \end{cases}$$

که در آن V_0 مثبت است. در این مسأله $E < V_0$ در نظر بگیرید. $\psi_1(x)$ و $\psi_2(x)$ را طوری در نظر بگیرید که دو جواب برای کمترین مقدار انرژی در معادله‌ی شرودینگر باشند و انرژی‌های آن‌ها را به ترتیب E_1 و E_2 بنامید.

(آ) E_1 و E_2 را در واحد eV برای حالتی که در آن $mc^2 = 1 \text{ GeV}$, $a = 10^{-14} \text{ m}$,

$b = 0.4 \times 10^{-14} \text{ m}$ و $\hbar c \simeq 200 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ محاسبه کنید.

(ب) جواب خصوصی معادله‌ی شرودینگر را می‌توان با برهم نهی $\psi_1(x)e^{iE_1 t/\hbar}$ و $\psi_2(x)e^{iE_2 t/\hbar}$ ساخت بسته موجی بسازید که در $t=0$ تماماً در طرف چپ چاه باشد و حرکت آن را در زمان توصیف کنید. زمان تناوب نوسان را بین دو جمله از ψ به دست آورید.

حل:
(آ)

از حل معادله‌ی شرودینگر با استفاده از پتانسیل داده شده نتیجه می‌شود که:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & ; |x| \geq a \\ A \sin kx + B \cos kx & ; -a \leq x \leq -b \\ C e^{-k'x} + D e^{k'x} & ; -b \leq x \leq +b \\ E \sin kx + F \cos kx & ; b \leq x \leq a \end{cases}$$

که در این رابطه:

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$k'^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)$$

با در نظر گرفتن اینکه $\psi(x)$ باید در $x = \pm a$ مقداری برابر صفر داشته باشد می‌توان $\psi(x)$ را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & ; |x| \geq a \\ \alpha \sin k(x+a) & ; -a \leq x \leq -b \\ C e^{-k'x} + D e^{k'x} & ; -b \leq x \leq b \\ \beta \sin k(x-a) & ; b \leq x \leq a \end{cases}$$

و از رابطه‌ی فوق نتیجه می‌شود که:

$$\psi'(x) = \begin{cases} \cdot & ; |x| \geq a \\ \alpha k \cos k(x+a) & ; -a \leq x \leq -b \\ k'(-C e^{-k'x} + D e^{k'x}) & ; -b \leq x \leq b \\ \beta k \cos k(x-a) & ; b \leq x \leq a \end{cases}$$

از پیوستگی تابع موج و مشتق آن در $x = \pm b$ داریم:

$$\alpha \sin[k(-b+a)] = C e^{k'b} + D e^{-k'b}$$

$$\alpha k \cos[k(-b+a)] = k'(-C e^{+k'b} + D e^{-k'b})$$

$$C e^{-k'b} + D e^{k'b} = \beta \sin[k(b-a)]$$

$$k'(-C e^{-k'b} + D e^{k'b}) = \beta k \cos[k(b-a)]$$

از تقسیم رابطی اول بر رابطی دوم و نیز تقسیم رابطی سوم بر رابطی چهارم داریم:

$$\frac{tg[k(a-b)]}{k} = \frac{C e^{k'b} + D e^{-k'b}}{k'(-C e^{k'b} + D e^{-k'b})} = -\frac{C e^{-k'b} + D e^{k'b}}{k'(-C e^{-k'b} + D e^{k'b})}$$

از رابطی اخیر نتیجه می‌شود که:

$$C^r = D^r$$

مورد $C = D$ (ویژه توابع زوج):

$$\frac{tg k(a-b)}{k} = -\frac{\cot h(k'b)}{k'}$$

و:

$$\alpha = -\beta = \frac{r C \cos h(k'b)}{\sin[k(a-b)]}$$


از حل معادله اول می‌توان مقادیر انرژی را به دست آورد. کوچکترین مقدار به دست آمده در واقع همان E_1 است.

مورد $C = -D$ (ویژه توابع فرد):

$$\frac{tg k(a-b)}{k} = -\frac{tg h(k'b)}{k'}$$

$$\alpha = \beta = \frac{r C \sinh(k'b)}{\sin[k(a-b)]}$$

از حل معادله‌ی اول مقادیر انرژی و ویژه توابع فرد به دست می‌آیند. کوچکترین مقدار به دست آمده در واقع همان E_r است.



در اینجا ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی هرگاه پتانسیل (یا به عبارتی هامیلتونی) زوج باشد ویژه توابع انرژی دارای پاریته‌ی مشخص هستند؛ یعنی، یا زوج هستند و یا فرد. برای محاسبه‌ی E_r و دانستن مقدار V نیز لازم است و روش کار نیز قبلاً توضیح داده شده است.

بسته‌ی موجی را که تقریباً در سمت چپ جایگزیده شده است با $L(x)$ و بسته‌ی موجی که در سمت راست جایگزیده شده است را با $R(x)$ نشان می‌دهیم. داریم:

$$L(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x) - \psi_r(x))$$

$$R(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x) + \psi_r(x))$$

اما در زمان t داریم:

$$\begin{aligned} L(x, t) &= e^{-\frac{iHt}{\hbar}} L(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-\frac{iHt}{\hbar}} \psi_1(x) - e^{-\frac{iHt}{\hbar}} \psi_r(x) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} \psi_1(x) - e^{-\frac{iE_r t}{\hbar}} \psi_r(x) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} \left(\psi_1(x) - e^{\frac{-it}{\hbar}(E_r - E_1)} \psi_r(x) \right) \end{aligned}$$

در زمان $t = \frac{T}{2} \equiv \frac{2\pi\hbar}{2(E_r - E_1)}$ سیستم در حالت $R(x)$ و در زمان $t = T$ مجدداً به حالت $L(x)$

باز خواهد گشت و در واقع بین این دو حالت، نوسانی با فرکانس $w = \frac{E_r - E_1}{\hbar}$ داریم.

تمرین ۴-۵

ذره‌ای در پتانسیل زیر حرکت می‌کند:

$$V(x) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{4}{225} \sinh^2 x - \frac{2}{5} \cosh x \right)$$

(آ) $V(x)$ را رسم کنید و مکان دونقطه‌ی کمینه را روی آن مشخص کنید.

(ب) نشان دهید که $\psi(x) = (1 + 4 \cosh x) \exp\left(-\frac{2}{15} \cosh x\right)$ یک جواب معادله‌ی شرودینگر مستقل

از زمان برای ذره است. تراز انرژی متناظر را بیابید و مکان آن را روی نمودار $V(x)$ نشان دهید.

(پ) $\psi(x)$ را رسم کنید و نشان دهید که در نقاط بازگشت کلاسیکی و در محدوده‌های ممنوع کلاسیکی خوش‌رفتار است.

حل:

(آ)

برای یافتن نقاط کمینه $V(x)$ ، نقاطی را می‌یابیم که در آنها $V'(x)$ صفر می‌شود.


$$\frac{dV(x)}{dx} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{4}{225} (2 \sinh x \cosh x) - \frac{2}{5} \sinh x \right) = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{2}{225} \sinh x (4 \cosh x - 45)$$

از مساوی صفر قرار دادن عبارت فوق، داریم:

$$x = 0$$

$$x = \cosh^{-1} \left(\frac{45}{4} \right)$$

درواقع این دو نقطه، نقاطی هستند که مینیمم $V(x)$ در آنها اتفاق می‌افتد.




(ب)

برای اینکه $\psi(x)$ جوابی برای معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان باشد باید در آن صدق کند. پس به بررسی این مطلب می‌پردازیم:

$$\begin{aligned}
 H\psi(x) &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \left[(1 + \epsilon \cosh x) \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) \right] \\
 &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d}{dx} \left[\epsilon \sinh x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) - \frac{\gamma}{15} \sinh x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) (1 + \epsilon \cosh x) \right] \\
 &\quad + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\epsilon}{225} \sinh^2 x - \frac{\gamma}{15} \cosh x \right) \psi(x) = \frac{-\hbar^2}{2m} \left[\epsilon \cosh x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) \right. \\
 &\quad \left. + \epsilon \times \frac{-\gamma}{15} \sinh^2 x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) - \frac{\gamma}{15} \cosh x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) (1 + \epsilon \cosh x) \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{\gamma}{15}\right)^2 \sinh^2 x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) (1 + \epsilon \cosh x) - \frac{\gamma}{15} \times \epsilon \sinh^2 x \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) \right] \\
 &\quad + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\epsilon}{225} \sinh^2 x - \frac{\gamma}{15} \cosh x \right) \psi(x) = \frac{16}{15} \frac{-\hbar^2}{2m} (1 + \epsilon \cosh x) \exp\left(-\frac{\gamma}{15} \cosh x\right) \\
 &= -\frac{\hbar^2}{2m} \times \frac{16}{15} \psi(x)
 \end{aligned}$$

پس $\psi(x)$ ویژه تابع هامیلتونی با سطح انرژی $-\frac{16\hbar^2}{15m}$ می باشد. (پ)



تمرین ۴-۶

نشان دهید که برای ذره‌ای به جرم m در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بعدی به طول a ، حاصل ضرب عدم قطعیت‌های $\Delta x_n \Delta p_n$ با $\frac{n\pi\hbar}{\sqrt{12}}$ $\Delta x_n \Delta p_n \simeq \frac{n\pi\hbar}{\sqrt{12}}$ داده می شود.

حل:

از تعاریف عدم قطعیت به فرم زیر استفاده می کنیم:

$$\Delta x_n = \sqrt{\langle \hat{X}^2 \rangle_n - \langle \hat{X} \rangle_n^2}$$

$$\Delta p_n = \sqrt{\langle \hat{P}^2 \rangle_n - \langle \hat{P} \rangle_n^2}$$

با توجه به اینکه:

$$\langle \hat{X} \rangle_n = \frac{a}{2}$$

$$\langle \hat{P} \rangle_n = 0$$

$$\langle \hat{P}^2 \rangle_n = 2mE_n = 2m \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{a^2}$$

فقط کافی است که $\langle \hat{X}^2 \rangle_n$ را بیابیم. برای این منظور داریم:

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_n = \int_0^a x^2 \left(\sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \right)^2 dx = \frac{1}{a} \int_0^a x^2 \left(1 - \cos \frac{2n\pi x}{a} \right) dx = \frac{1}{a} \left(\frac{a^3}{3} - \int_0^a x^2 \cos \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) dx \right)$$

از روش انتگرال گیری جزء به جزء داریم:

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_n = \frac{a^3}{3} - \frac{1}{a} \left[\left(\frac{ax^2}{2n\pi} \sin \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) \right) \Big|_0^a - \frac{a}{n\pi} \int_0^a x \sin \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) dx \right] = \frac{a^3}{3} + \frac{1}{n\pi} \int_0^a x \sin \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) dx$$

مجدداً از روش انتگرال گیری جزء به جزء داریم:

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_n = \frac{a^3}{3} + \frac{1}{n\pi} \left\{ \left[\frac{-a}{2n\pi} x \cos \frac{2n\pi x}{a} \right]_0^a + \left[\left(\frac{a}{2n\pi} \right)^2 \sin \left(\frac{2n\pi x}{a} \right) \right]_0^a \right\} = \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{2(n\pi)^2} \simeq \frac{a^3}{3}$$

پس:

$$\Delta x_n \simeq \sqrt{\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4}} = \frac{a}{\sqrt{12}}$$

$$\Delta p_n = \frac{\hbar n \pi}{a}$$

بنابراین:

$$\Delta x_n \Delta p_n \simeq \frac{n\pi\hbar}{\sqrt{12}}$$

تمرین ۴-۷

ذره‌ای به جرم m در چاه پتانسیل نامتناهی زیر در حال حرکت است:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < a \\ \infty & \text{هر جای دیگر} \end{cases}$$

(آ) معادله‌ی شرودینگر را حل کنید و ترازهای انرژی و توابع موج بهنجار متناظر را بیابید.

(ب) $\langle \hat{P}^2 \rangle_0$ و $\langle \hat{X}^2 \rangle_0$ را برای چهارمین حالت برانگیخته محاسبه کنید و مقدار $\Delta x \Delta p$ را نتیجه بگیرید.

حل:

(آ)

معادله‌ی شرودینگر در ناحیه‌ی $0 < x < a$ به صورت زیر است:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0 \right) \psi(x) = E \psi(x)$$

یا:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) \psi(x) = 0$$

در اینجا فقط با فرض $E > V_0$ جواب فیزیکی خواهیم داشت و داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

که در آن:

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0)$$

جواب کلی به شکل $\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$ خواهد بود. با اعمال شرط مرزی $\psi(0) = \psi(a) = 0$ داریم:

$$B = 0$$

$$ka = n\pi \quad ; \quad n = 1, 2, \dots$$

با استفاده از شرط بهنجارش خواهیم داشت:

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

پس:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$E_n = V_0 + \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}$$

در واقع این نتیجه از قبل نیز قابل انتظار بود.

(ب)

با توجه به تمرین قبلی داریم:

$$\langle \hat{X} \rangle_\Delta = \frac{a}{2}$$

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_\Delta = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2(\Delta\pi)^2} \simeq \frac{a^2}{3}$$

$$\langle \hat{P} \rangle_\Delta = 0$$

$$\langle \hat{P}^2 \rangle_\Delta = \frac{2\Delta\pi^2 \hbar^2}{a^2}$$

$$\Delta x_\Delta \Delta p_\Delta \simeq \frac{\Delta\pi\hbar}{\sqrt{12}}$$

تمرین ۴-۸

پله‌ی پتانسیل زیر را در نظر بگیرید:

$$V(x) = \begin{cases} 6\text{eV}, & x < 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

(آ) یک الکترون با انرژی ۸eV از چپ به راست در این پتانسیل در حال حرکت است. احتمال آن را که الکترون (۱) پس از رسیدن به پله در راستای اولیه خود به حرکتش ادامه دهد و (۲) در پله‌ی پتانسیل بازتابیده شود، محاسبه کنید.

(ب) اکنون فرض کنید الکترون از راست به چپ با انرژی ۳eV در حال حرکت است. (۱) مرتبه‌ی بزرگی فاصله‌ای که الکترون می‌تواند در سد نفوذ کند را تخمین بزنید. (۲) قسمت (۱) را برای یک شخص ۷۰ کیلوگرمی تکرار کنید که ابتدا با سرعت 4ms^{-1} در حال حرکت است و به طرف دیواری می‌دود که می‌توان آن را با یک پله‌ی پتانسیل با ارتفاع ۴ برابر انرژی این شخص پیش از رسیدن به پله نمایش داد.

حل:

(آ)

طبق معادله‌ی شرودینگر در مورد ویژه تابع انرژی $\psi(x)$ داریم:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V \right) \psi(x) = E \psi(x)$$

پس:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi(x) = 0 \quad ; \quad x \leq 0$$

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0 \quad ; \quad x \geq 0$$

با تعریف:

$$k = \frac{\sqrt{2m(E - V)}}{\hbar}$$

$$k' = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

داریم:

$$\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad ; \quad x \leq 0$$

$$\psi(x) = C e^{ik'x} \quad ; \quad x \geq 0$$

از پیوستگی $\psi(x)$ و $\psi'(x)$ در $x=0$ داریم:

$$A + B = C$$

$$ik(A - B) = ik'C$$

و یا به عبارتی:

$$\frac{B}{A} = \frac{k - k'}{k + k'}$$

$$\frac{C}{A} = \frac{2k}{k + k'}$$

ضریب انعکاس (احتمال انعکاس) و ضریب عبور (احتمال عبور) که آنها را با R و T نشان می‌دهیم عبارتند از:

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2 = \left(\frac{k - k'}{k' + k} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{E + V} - \sqrt{E}}{\sqrt{E + V} + \sqrt{E}} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{1 - 6} - \sqrt{1}}{\sqrt{1 - 6} + \sqrt{1}} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2} + 2\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$T = \frac{k'}{k} \left| \frac{C}{A} \right|^2 = 1 - R = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

(ب) در این حالت رفتار تابع موج برای ناحیه‌ی $x < 0$ به صورت e^{qx} خواهد بود که در آن:

$$q^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)$$

مقدار نفوذ الکترون از مرتبه $\frac{1}{q}$ خواهد بود؛ یعنی:

$$\frac{1}{q} = \left[\frac{\hbar^2}{2m(V_0 - E)} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{(1.97 / 22 \text{ eV} \cdot \text{nm})^2}{c^2 \times 2 \times 10^{-11} \frac{\text{MeV}}{c^2} (6 - 2) \text{ eV}} \right]^{\frac{1}{2}} \simeq 1/12 \text{ \AA}$$

این مقدار برای یک شخص 70 کیلوگرمی که با سرعت 4 ms^{-1} به سمت دیواری که ارتفاع آن معادل با چهار برابر انرژی شخص قبل از رسیدن به پله است، در حال حرکت می‌باشد برابر است با

$$\frac{1}{q} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(4E - E)}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m \times 3E}} = \frac{\hbar}{\sqrt{3} \sqrt{2mE}} = \frac{\hbar}{\sqrt{3} mv} = \frac{1/0.55 \times 10^{-27}}{\sqrt{3} \times 70 \times 4} = 2/22 \times 10^{-27}$$

تمرین ۹-۴

سیستی را در نظر بگیرید که تابع موج آن در زمان $t=0$ با

$$\psi(x, 0) = \frac{5}{\sqrt{50}} \phi_1(x) + \frac{4}{\sqrt{50}} \phi_2(x) + \frac{3}{\sqrt{50}} \phi_3(x)$$

داده می‌شود که در آن، $\phi_n(x)$ تابع موج n امین حالت برانگیخته برای یک نوسانگر هماهنگ با انرژی $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ است.

(آ) انرژی میانگین این سیستم را بیابید.

(ب) حالت $\psi(x, t)$ را در زمان بعدی t و مقدار میانگین انرژی را پیدا کنید؛ نتیجه را با مقدار به دست آمده در (آ) مقایسه کنید.

(پ) مقدار چشمداشتی عملگر $\hat{X}$ نسبت به حالت $\psi(x, t)$ را به دست آورید.

(یعنی، $\langle \psi(x, t) | \hat{X} | \psi(x, t) \rangle$ را پیدا کنید).

حل:

(آ)

چون $\phi_n(x)$ ویژه توابع انرژی با ویژه مقدارهای E_n هستند؛ پس:

$$\langle \hat{H} \rangle = \left| \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} \right|^2 E_0 + \left| \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} \right|^2 E_1 + \left| \frac{3}{\sqrt{\Delta_0}} \right|^2 E_2 = \frac{1}{\Delta_0} \left(2\Delta \times \frac{\hbar\omega}{2} + 16 \times \frac{3}{2} \hbar\omega + 9 \times \frac{\Delta}{2} \hbar\omega \right) = \frac{\Delta_0}{\Delta_0} \hbar\omega$$

(ب)

$\psi(x, t)$ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= e^{-\frac{iHt}{\hbar}} \psi(x, 0) = \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-iE_0 t}{\hbar}} \phi_0(x) + \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \phi_1(x) + \frac{3}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \phi_2(x) \\ &= \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{1}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_0(x) + \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{3}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_1(x) + \frac{3}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{5}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_2(x) \end{aligned}$$

پس:

$$\langle \hat{H} \rangle_t = \left| \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{1}{2}\omega t}{\hbar}} \right|^2 E_0 + \left| \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{3}{2}\omega t}{\hbar}} \right|^2 E_1 + \left| \frac{3}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{5}{2}\omega t}{\hbar}} \right|^2 E_2 = \langle \hat{H} \rangle = \frac{\Delta_0}{\Delta_0} \hbar\omega$$

درواقع $\langle \hat{H} \rangle$ در طی زمان ثابت است.

(ب)

با توجه به اینکه:

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$$

پس:

$$\hat{X}|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (a + \hat{a}^\dagger)|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle)$$

لذا:

$$\begin{aligned} \hat{X}\psi(x, t) &= \frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{1}{2}\omega t}{\hbar}} \hat{X} \phi_0(x) + \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{3}{2}\omega t}{\hbar}} \hat{X} \phi_1(x) + \frac{3}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{5}{2}\omega t}{\hbar}} \hat{X} \phi_2(x) \\ &= \frac{\hbar}{2mw} \left[\frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{1}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_1(x) + \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{3}{2}\omega t}{\hbar}} (\phi_0(x) + \sqrt{2}\phi_2(x)) + \frac{3}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{5}{2}\omega t}{\hbar}} (\sqrt{2}\phi_1(x) + \sqrt{2}\phi_3(x)) \right] \\ &= \frac{\hbar}{2mw} \left[\frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{3}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_0(x) + \left(\frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{1}{2}\omega t}{\hbar}} + \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{5}{2}\omega t}{\hbar}} \right) \phi_1(x) + \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{3}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_2(x) \right. \\ &\quad \left. + \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-\frac{-i\frac{5}{2}\omega t}{\hbar}} \phi_3(x) \right] \end{aligned}$$

حال با توجه به اینکه:

$$\langle \phi_n | \phi_m \rangle = \delta_{nm}$$

داریم:

$$\begin{aligned}
 \langle \psi(x, y) | \hat{X} | \psi(x, t) \rangle &= \frac{\hbar}{2mw} \left[\frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{i\frac{\Delta}{2}wt} \times \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-i\frac{\Delta}{2}wt} + \frac{4}{\sqrt{\Delta_0}} e^{i\frac{\Delta}{2}wt} \times \left(\frac{\Delta}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-i\frac{\Delta}{2}wt} + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-i\frac{\Delta}{2}wt} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{2}{\sqrt{\Delta_0}} e^{i\frac{\Delta}{2}wt} \times \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{\Delta_0}} e^{-i\frac{\Delta}{2}wt} \right] = \frac{\hbar}{2mw} \times \frac{1}{\Delta_0} \left(2e^{-iwt} + 2e^{iwt} + 12\sqrt{2}e^{-iwt} \right. \\
 &\quad \left. + 12\sqrt{2}e^{iwt} \right) = \frac{\hbar}{10mw} \left(4 \cos wt + 24\sqrt{2} \cos wt \right) = \frac{2}{25} \left(\Delta + 2\sqrt{2} \right) \cos wt
 \end{aligned}$$

تمرین ۴-۱۰

$\langle m | \hat{X}^\dagger | n \rangle$ و $\langle n | \hat{X}^\dagger | m \rangle$ را در نمایش N محاسبه کنید. $|m\rangle$ و $|n\rangle$ حالت‌های نوسانگر هماهنگ

هستند.

حل:

با توجه به اینکه:

$$\begin{aligned}
 \hat{X}^\dagger &= \frac{\hbar}{2mw} \left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}^{\dagger\dagger} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} \right) \\
 &= \frac{\hbar}{2mw} \left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}^{\dagger\dagger} + 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

و

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} |n\rangle = n |n\rangle$$

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n(n-1)} |n-2\rangle$$

$$\hat{a}^{\dagger\dagger} |n\rangle = \sqrt{(n+1)(n+2)} |n\rangle$$

خواهیم داشت:

$$X^\dagger = \frac{\hbar}{2mw} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sqrt{1 \times 2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & \sqrt{2 \times 3} & 0 & 0 \\ \sqrt{1 \times 2} & 0 & 5 & 0 & \sqrt{3 \times 4} & 0 \\ 0 & \sqrt{2 \times 3} & 0 & 7 & 0 & \sqrt{4 \times 5} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

برای بدست آوردن $X^\dagger$ می‌توان با ضرب کردن $X^\dagger$ در خودش ماتریس آن را بدست آورد.

تمرین ۴-۱۱

هامیلتونی یک بعدی $\hat{H} = \frac{1}{2}\hat{P}^2 + \frac{1}{2}\hat{X}^2$ را با $\hat{P} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ در نظر بگیرید.

(آ) نشان دهید که توابع موج $\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/2}$ و $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x e^{-x^2/2}$ ویژه توابع $\hat{H}$ با ویژه

مقادیرهای $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$ هستند.

(ب) مقدار ضریب‌های α و β را به گونه‌ای بیابید که

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{\pi}}} (\alpha x^2 - 1) e^{-x^2/2} \quad \text{و} \quad \psi_3(x) = \frac{1}{\sqrt{6\sqrt{\pi}}} x (1 + \beta x^2) e^{-x^2/2}$$

بر $\psi_2(x)$ عمود باشند. سپس نشان دهید که $\psi_2(x)$ و $\psi_3(x)$ به ترتیب، ویژه توابع $\hat{H}$ با ویژه

مقادیر $\frac{5}{2}$ و $\frac{7}{2}$ هستند.

حل:

(آ)

برای تحقیق اینکه $\psi_0(x)$ و $\psi_1(x)$ ویژه توابع هامیلتونی هستند، اثر هامیلتونی را بر آنها بررسی می‌کنیم:

$$\begin{aligned} H\psi_0(x) &= \left(\frac{1}{2}\hat{P}^2 + \frac{1}{2}\hat{X}^2 \right) \psi_0(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{d^2}{dx^2} + x^2 \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/2} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(x^2 e^{-x^2/2} - \frac{d}{dx} \left(-x e^{-x^2/2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(x^2 e^{-x^2/2} + e^{-x^2/2} - x^2 e^{-x^2/2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/2} \right) = \frac{1}{2} \psi_0(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H\psi_1(x) &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(x^2 e^{-x^2/2} - \frac{d}{dx} \left(e^{-x^2/2} - x^2 e^{-x^2/2} \right) \right) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(x^2 e^{-x^2/2} + x e^{-x^2/2} + 2x e^{-x^2/2} - x^2 e^{-x^2/2} \right) \\ &= \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2/2} = \frac{3}{2} \psi_1(x) \end{aligned}$$

پس $\psi_0(x)$ و $\psi_1(x)$ ویژه توابع $\hat{H}$ با ویژه مقادیر متناظر $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$ هستند.

(ب)

طبق تعریف، دو تابع $f(x)$ و $g(x)$ را متعامد گوئیم هرگاه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) g(x) dx = 0$$

پس:

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_r^*(x) \psi_r(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} (\alpha x^r - 1) e^{-\frac{x^r}{r}} \times \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^r}{r}} dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \times \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\alpha x^r - 1) e^{-x^r} dx
 \end{aligned}$$

با توجه به اینکه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^r} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^r e^{-x^r} dx = \frac{1}{r} \sqrt{\pi}$$

نتیجه می‌شود که:

$$\frac{\alpha}{r} - 1 = 0$$

یا:

$$\alpha = r$$

اما $\psi_r(x)$ و $\psi_r^*(x)$ به‌ازای تمام مقادیر β برهم عمودند زیرا $\psi_r(x)$ تابعی زوج و $\psi_r^*(x)$ تابعی فرد است. لذا در انتگرال $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_r^* \psi_r(x) dx$ ، انتگرالده تابعی فرد و بازه انتگرال‌گیری نیز متقارن است پس حاصل آن همواره صفر است و به‌طور مشابه می‌توان نشان داد که $\psi_r(x)$ و $\psi_r(x)$ نیز بر $\psi_1(x)$ عمود هستند. حال هامیلتونی را بر $\psi_r(x)$ و $\psi_r(x)$ اثر می‌دهیم:

$$\begin{aligned}
 H \psi_r(x) &= \frac{1}{r} \left(-\frac{d^r}{dx^r} + x^r \right) \left[\frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} (r x^r - 1) e^{-\frac{x^r}{r}} \right] \\
 &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \left[x^r (r x^r - 1) e^{-\frac{x^r}{r}} - \frac{d}{dx} \left(r x e^{-\frac{x^r}{r}} - x (r x^r - 1) e^{-\frac{x^r}{r}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \left[x^r (r x^r - 1) e^{-\frac{x^r}{r}} - \left(r e^{-\frac{x^r}{r}} - r x^r e^{-\frac{x^r}{r}} - r x^r e^{-\frac{x^r}{r}} + r x^r e^{-\frac{x^r}{r}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^r}{r}} (1 \cdot x^r - r) = \frac{r}{r} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^r}{r}} (r x^r - 1) = \frac{r}{r} \psi_r(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 H\psi_r(x) &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}\sqrt{\pi}} \left[x^r (1 + \beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} - \frac{d}{dx} \left[(1 + r\beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} - (x^r + \beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} \right] \right] \\
 &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}\sqrt{\pi}} \left\{ x^r (1 + \beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} - \left[\epsilon \beta x e^{-\frac{x^r}{r}} - x(1 + r\beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} - (rx + \epsilon \beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + x(x^r + \beta x^r) e^{-\frac{x^r}{r}} \right] \right\} \\
 &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^r}{r}} (x^r + \beta x^5 - \epsilon \beta x + x + r\beta x^r + rx + \epsilon \beta x^r - x^r - \beta x^5) \\
 &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}\sqrt{\pi}} x [(r - \epsilon \beta) + r\beta x^r]
 \end{aligned}$$

ملاحظه می‌شود که $\psi_r(x)$ ویژه حالت هامیلتونی نیست مگر اینکه:

$$\beta = -\frac{r}{r}$$

و در این صورت $\psi_r(x)$ ویژه حالت هامیلتونی با ویژه مقدار $\frac{r}{r}$ خواهد بود.

تمرین ۴-۱۲

هامیلتونی یک بُعدی $\hat{H} = \frac{1}{r} \hat{P}^2 + \frac{1}{r} \hat{X}^2$ را در نظر بگیرید (که در آن $\hat{P} = -i\hbar d/dx$) که تابع موج آن در زمان $t=0$ عبارت است از

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{r}} \psi_0(x) + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{1_0}} \psi_r(x),$$

$$\text{و در آن } \psi_r(x) = \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-x^r/r}, \quad \psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} x e^{-x^r/r}, \quad \psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^r/r}$$

$$\Delta x_n = \sqrt{\langle \psi_n | \hat{X}^2 | \psi_n \rangle - \langle \psi_n | \hat{X} | \psi_n \rangle^2} \quad \text{که در آن } n=0,1 \text{ را برای } \Delta x_n \Delta p_n \text{ محاسبه کنید،}$$

$$(ب) \quad \hat{a}^\dagger \psi_0(x), \hat{a}^\dagger \psi_1(x), \hat{a}^\dagger \psi_r(x) \text{ و } \hat{a} \psi_n(x) \text{ را محاسبه کنید که عملگرهای } \hat{a}^\dagger \text{ و } \hat{a} \text{ با}$$

$$\hat{a}^\dagger = (\hat{X} - d/dx)/\sqrt{r} \text{ و } \hat{a} = (\hat{X} + d/dx)/\sqrt{r} \text{ تعریف می‌شوند.}$$

حل:

(آ)

با توجه به اینکه $\psi_0(x)$ زوج و $\psi_1(x)$ فرد است لذا:

$$\langle \psi_0 | \hat{X} | \psi_0 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{X} | \psi_1 \rangle = 0.$$

$$\langle \psi_+ | \hat{P} | \psi_+ \rangle = \langle \psi_- | \hat{P} | \psi_- \rangle = 0$$

$$\langle \psi_+ | \hat{X}^2 | \psi_+ \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_+^*(x) x^2 \psi_+(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} x^2 dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\langle \psi_- | \hat{X}^2 | \psi_- \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_-^*(x) x^2 \psi_-(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\langle \psi_+ | \hat{P}^2 | \psi_+ \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_+^*(x) \left(-\frac{d^2}{dx^2} \right) \psi_+(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} \frac{d}{dx} \left(\frac{-1}{\sqrt{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{2}} \right) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left\{ \left[x e^{-x^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx \right\} = \frac{1}{2}$$

$$\langle \psi_- | \hat{P}^2 | \psi_- \rangle = - \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{d}{dx} \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right]$$

$$= - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \left[-x \left(1 - x^2 \right) - 2x \right] e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 (x^2 - 1) e^{-x^2} dx = - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{2}{3} \sqrt{\pi} - 2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) = \frac{2}{3}$$

پس:

$$\Delta x_+ \Delta p_+ = \sqrt{\langle \psi_+ | \hat{X}^2 | \psi_+ \rangle} \sqrt{\langle \psi_+ | \hat{P}^2 | \psi_+ \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\Delta x_- \Delta p_- = \sqrt{\langle \psi_- | \hat{X}^2 | \psi_- \rangle} \sqrt{\langle \psi_- | \hat{P}^2 | \psi_- \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

(ب)

$$\hat{a}^\dagger \psi_-(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{X} - \frac{d}{dx} \right) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (x + x) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{2}} = \psi_+(x)$$

$$\hat{a} \psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{X} + \frac{d}{dx} \right) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (x - x) \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{\pi}} = 0$$

$$\begin{aligned}\hat{a}^\dagger \psi_1(x) &= \frac{1}{\sqrt{r}} \left(\hat{X} - \frac{d}{dx} \right) \left(\sqrt{\frac{r}{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{r}} \right) = \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} = \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \left[x^2 e^{-\frac{x^2}{r}} - e^{-\frac{x^2}{r}} (1 - x^2) \right] \\ &= \sqrt{r} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} (rx^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{r}} = \sqrt{r} \psi_r(x)\end{aligned}$$

$$\hat{a} \psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{r}} \left(\hat{X} + \frac{d}{dx} \right) \left(\sqrt{\frac{r}{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{r}} \right) = \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \left(x^2 e^{-\frac{x^2}{r}} + e^{-\frac{x^2}{r}} (1 - x^2) \right) = \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{r}} = \psi_0(x)$$

$$\begin{aligned}\hat{a} \psi_r(x) &= \frac{1}{\sqrt{r}} \left(\hat{X} + \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} (rx^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{r}} \right) = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} \\ &\times \left\{ x(rx^2 - 1) e^{-\frac{x^2}{r}} + e^{-\frac{x^2}{r}} [rx - x(rx^2 - 1)] \right\} = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{r}} (rx^2 - x + rx - rx^2) \\ &= \sqrt{r} \sqrt{\frac{r}{\pi}} x e^{-\frac{x^2}{r}} = \sqrt{r} \psi_1(x)\end{aligned}$$

تمرین ۴-۱۳

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بعدی با دیواره‌های $x=0$

و $x=a$ در ابتدا (یعنی در $t=0$) در حالت $\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(x) + \phi_2(x)]$

است و در آن $\phi_1(x)$ و $\phi_2(x)$ به ترتیب حالت پایه و دومین حالت برانگیخته هستند.

(آ) بردار حالت $\psi(x,t)$ را برای $t > 0$ در تصویر شرودینگر به دست آورید؟

(ب) مقدار چشمداشتی $\langle \hat{X} \rangle, \langle \hat{P} \rangle, \langle \hat{X}^2 \rangle$ و $\langle \hat{p}^2 \rangle$ را برحسب $|\psi\rangle$ بیابید.

(پ) $\Delta x \Delta p$ را برآورد کنید و ثابت کنید که در اصل عدم قطعیت صدق می‌کند.

حل

$$\begin{aligned}|\psi(x,t)\rangle &= e^{-i\frac{Ht}{\hbar}} |\psi(x,0)\rangle \\ &= e^{-i\frac{Ht}{\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(x) + \phi_2(x)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} \phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}} \phi_2(x)\end{aligned}$$

توجه کنیم:

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, E_2 = 4 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

تمرین ۴-۱۴

حالت ذره‌ی در حال حرکت در یک نوسانگر هارمونیک یک بعدی با رابطه‌ی زیر داده می‌شود.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{17}}|0\rangle + \frac{3}{\sqrt{17}}|1\rangle - \frac{2}{\sqrt{17}}|2\rangle - \sqrt{\frac{3}{17}}|3\rangle$$

که $|n\rangle$ بیانگر n امین ویژه حالت بهنجار انرژی است. مقدار چشمداشتی عملگر تعداد، $\hat{N}$ و عملگر هامیلتونی را بیابید.

حل:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{17}}|0\rangle + \frac{3}{\sqrt{17}}|1\rangle - \frac{2}{\sqrt{17}}|2\rangle - \sqrt{\frac{3}{17}}|3\rangle$$

$$\langle\psi|\hat{N}|\psi\rangle = \sum |C_n|^2 n$$

$$= \frac{1}{17} \times 0 + \frac{3}{17} \times 1 + \frac{4}{17} \times 2 + \frac{3}{17} \times 3$$

$$= \frac{3}{17} + \frac{8}{17} + \frac{9}{17} = \frac{20}{17}$$

تمرین ۴-۱۵

تعداد حالت‌های مقید و انرژی‌های متناظر را برای چاه پتانسیل مربعی متناهی در حالتی که (آ) $R=7$ (یعنی، $\sqrt{ma^2 V_0 / (2\hbar^2)} = 7$) و (ب) $R=3\pi$ باشد پیدا کنید.

حل:

(آ)

طبق نمودار ۴-۸ بدای $R=7$ ، پنج حالت مقید وجود دارد که برای یافتن انرژی متناظر با هر حالت، داریم:

$$\alpha_1 \tan \alpha_1 = \sqrt{49 - \alpha_1^2}$$

$$-\alpha_1 \cot \alpha_1 = \sqrt{49 - \alpha_1^2}$$

$$\alpha_2 \tan \alpha_2 = \sqrt{49 - \alpha_2^2}$$

$$-\alpha_2 \cot \alpha_2 = \sqrt{49 - \alpha_2^2}$$

$$\alpha_3 \tan \alpha_3 = \sqrt{49 - \alpha_3^2}$$

پس از یافتن مقادیر $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ و α_4 از روابط فوق، با استفاده از رابطه $E_n = \frac{\hbar^2 \alpha_n^2}{2m a^2}$ می‌توان مقادیر E_1, E_2, E_3 و E_4 را یافت.

(ب) به‌ازای $R = 3\pi$ ، شش حالت مقید وجود دارد که انرژی متناظر با هر حالت به روشی که از قسمت (ا) به آن اشاره شد، محاسبه می‌شود.

تمرین ۴-۱۶

توپ به جرم $m = 0.12 \text{ kg}$ در حال افتادن روی میزی واقع بر $z = 0$ تحت تأثیر پتانسیل

$$V(z) = \begin{cases} V_0 & , \quad z < 0 \\ mgz & , \quad z > 0 \end{cases}$$

است که در آن، $V_0 = 3g$ و g شتاب ناشی از گرانش است. (آ) طیف انرژی‌های ممکن را با افزایش E از مقدارهای منفی بزرگ تا مقدارهای مثبت بزرگ (یعنی: پیوسته، گسسته یا غیرموجود) توصیف کنید.

(ب) مرتبه بزرگی را برای پایین‌ترین تراز انرژی تخمین بزنید.

(پ) شکل‌های کلی توابع موج $\psi_1(z)$ و $\psi_2(z)$ متناظر با پایین‌ترین دو تراز انرژی را توصیف کنید و چگالی‌های احتمال متناظر آن‌ها را رسم کنید.

حل:

با توجه به معادله‌ی شرودینگر برای $z < 0$ و $z > 0$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(z)}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) = 0 \quad ; \quad z \leq 0$$

$$\frac{d^2 \psi(z)}{dz^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - mgz) = 0 \quad ; \quad z \geq 0$$

با فرض $E < V_0$ و با تعریف‌های:

$$k = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} (V_0 - E)$$

$$x = \left(\frac{\hbar^2}{2m^2 g} \right)^{\frac{1}{3}} \frac{2m}{\hbar^2} (mgz - E)$$

خواهیم داشت:

$$\frac{d^r \psi}{dz^r} - k^r \psi(z) = 0 \quad ; \quad z \leq 0$$

$$\frac{d^r \psi(x)}{dx^r} - x \psi(x) = 0 \quad ; \quad z \geq 0$$

در این صورت داریم:

$$\psi(z) = \alpha e^{kz} + \beta e^{-kz} \quad ; \quad z \leq 0$$

$$\psi(z) = \gamma Ai(x(z)) + \delta Bi(x(z)) \quad ; \quad z \geq 0$$

در اینجا $Ai(x)$ و $Bi(x)$ توابع *Airy* هستند. به دلیل اینکه وقتی $z \rightarrow -\infty$ تابع موج باید متناهی باشد لذا: $\beta = 0$. و چون $Bi(x)$ وقتی $x \rightarrow +\infty$ واگرا می‌شود لذا: $\delta = 0$ و داریم:

$$\psi(z) = \alpha e^{kz} \quad ; \quad z \leq 0$$

$$\psi(z) = \gamma Ai(x) \quad ; \quad z \geq 0$$

برای یافتن α و γ از پیوستگی ψ و مشتق آن در $z = 0$ استفاده می‌کنیم. پس:

$$\alpha = \gamma Ai \left[- \left(\frac{\gamma}{mg^r \hbar^r} \right)^{\frac{1}{r}} E \right]$$

$$k \alpha = \gamma \left(\frac{\gamma m^r g}{\hbar^r} \right)^{\frac{1}{r}} \frac{d Ai(x)}{dx} \bigg|_{x = - \left(\frac{\gamma}{mg^r \hbar^r} \right)^{\frac{1}{r}} E}$$

از تقسیم این دو رابطه بر هم داریم:

$$\sqrt{\frac{\gamma m}{\hbar^r} (V. - E)} = \frac{\left(\frac{\gamma m^r g}{\hbar^r} \right)^{\frac{1}{r}} \frac{d Ai(x)}{dx} \bigg|_{x = - \left(\frac{\gamma}{mg^r \hbar^r} \right)^{\frac{1}{r}} E}}{Ai \left[- \left(\frac{\gamma}{mg^r \hbar^r} \right)^{\frac{1}{r}} E \right]}$$

این رابطه بیانگر آنست که E باید گسسته باشد.

برای $E > V.$ با تعریف:

$$k'^r = \frac{\gamma m}{\hbar^r} (E - V.)$$

$$\psi(z) = A e^{ikz} + B e^{-ikz} \quad ; \quad z \leq 0.$$

خواهیم داشت:

$$\psi(z) = C Ai(x) \quad ; \quad z \geq 0.$$

بنابراین با اعمال شرایط مرزی مناسب داریم:

$$A + B = C Ai \left(- \left(\frac{2}{mg^2 \hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} E \right)$$

$$ik(A - B) = C \left(\frac{2mg}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left. \frac{d Ai(x)}{dx} \right|_{x = - \left(\frac{2}{mg^2 \hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} E}$$

از این روابط نتیجه می‌گیریم که E می‌تواند پیوسته باشد.

تمرین ۴-۱۷

ذره‌ای به جرم m را که تحت تأثیر پتانسیل نوسانگر یک بعدی با $\hat{X} = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ $\hat{P} = i\sqrt{m\hbar\omega/2}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$ در حال حرکت است در نظر بگیرید.(آ) حاصل ضرب عدم قطعیت‌ها در مکان و اندازه حرکت را برای ذره‌ای در پنجمین حالت برانگیخته یعنی $(\Delta X \Delta P)_5$ محاسبه کنید.

(ب) نتیجه‌ی (آ) را با حاصل ضرب عدم قطعیت هنگامی که ذره در پایین‌ترین تراز انرژی خود است مقایسه کنید. توضیح دهید که چرا دو حاصل ضرب عدم قطعیت متفاوت هستند.

حل:

(آ)

با توجه به اینکه $\psi_5(x)$ تابعی فرد است، لذا $\langle X \rangle_5$ و $\langle P \rangle_5$ مقداری برابر صفر دارند. پس:

$$\Delta x_5 = \sqrt{\langle \hat{X}^2 \rangle_5 - \langle \hat{X} \rangle_5^2} = \sqrt{\langle \hat{X}^2 \rangle_5}$$

$$\Delta P_5 = \sqrt{\langle \hat{P}^2 \rangle_5 - \langle \hat{P} \rangle_5^2} = \sqrt{\langle \hat{P}^2 \rangle_5}$$

اما با توجه به رابطه‌ی $\langle n | \hat{X}^2 | n \rangle = \frac{\hbar^2}{2mw} (2n+1)$ داریم:

$$\langle \hat{X}^2 \rangle_5 = \frac{\hbar^2}{2mw} (2 \times 5 + 1) = \frac{11\hbar^2}{2mw}$$

$$E_n = \langle n | \hat{H} | n \rangle = \left\langle n \left| \frac{\hat{p}^2}{2m} \right| n \right\rangle + \left\langle n \left| \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2 \right| n \right\rangle$$

$$\langle n | \hat{p}^2 | n \rangle = 2mE_n - m^2 \omega^2 \langle n | \hat{x}^2 | n \rangle = 2m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) - m^2 \omega^2 \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1)$$

$$\langle n | \hat{p}^2 | n \rangle = \frac{1}{2} m \hbar \omega (2n+1)$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{1}{2} m \hbar \omega$$

$$\Delta X \Delta P = \sqrt{\frac{1}{2} \frac{\hbar^2}{m\omega} \times \frac{1}{2} m \hbar \omega} = \frac{1}{2} \hbar$$

به همین ترتیب:

(ب)

$$\Delta X \Delta P = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega} \times \frac{1}{2} m \hbar \omega} = \frac{1}{2} \hbar$$

تمرین ۴-۱۸

ذره‌ای به جرم m در یک چاه پتانسیل نامتناهی به طول a دارای تابع موج اولیه زیر است:

$$\psi(x, 0) = \frac{2}{\sqrt{3}a} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{6}{3}a} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}a} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right).$$

(ا) اگر انرژی را اندازه بگیریم، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی پیدا می‌کنیم؟ میانگین انرژی را محاسبه کنید.

(ب) تابع موج $\psi(x, t)$ را در زمان t بیابید.

احتمال یافتن ذره در زمان t در حالت $\phi(x, t) = 1/\sqrt{a} \sin(3\pi x/a) \exp(-iE_3 t/\hbar)$ را تعیین کنید.

(پ) چگالی احتمال $\rho(x, t)$ و چگالی جریان $\vec{J}(x, t)$ را محاسبه کنید.

ثابت کنید که $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \vec{J}(x, t) = 0$.

حل:
(۱)

می‌دانیم که $\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ ویژه تابع هامیلتونی با ویژه مقدار $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ برای ذره در

جعبه است. پس:

$$\begin{aligned}\psi(x,0) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \\ &= \sqrt{\frac{2}{a}} \phi_1(x) + \sqrt{\frac{2}{a}} \phi_2(x) + \sqrt{\frac{2}{a}} \phi_3(x)\end{aligned}$$

ملاحظه می‌شود که $\psi(x,0)$ بهنجار نیست. پس اگر آن را بهنجار کرده و با $\psi_N(x,0)$ نمایش دهیم، داریم:

$$\psi_N(x,0) = \sqrt{\frac{14}{11}} \psi(x,0) = \frac{2}{\sqrt{11}} \phi_1(x) + \sqrt{\frac{3}{11}} \phi_2(x) + \frac{2}{\sqrt{11}} \phi_3(x)$$

بنابراین در اندازه‌گیری انرژی، مقادیر E_1 ، E_2 و E_3 با احتمال $\frac{4}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ و $\frac{4}{11}$ به دست می‌آیند و:

$$\langle \hat{H} \rangle = \sum_n P_n(E_n) E_n = \frac{4}{11} E_1 + \frac{3}{11} E_2 + \frac{4}{11} E_3 = \frac{1}{11} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (4 + 3 \times 2^2 + 4 \times 3^2) = \frac{26}{11} \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2}$$

(ب)

$$\psi(x,t) = \frac{2}{\sqrt{11}} e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} \phi_1(x) + \sqrt{\frac{3}{11}} e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}} \phi_2(x) + \frac{2}{\sqrt{11}} e^{-i\frac{E_3 t}{\hbar}} \phi_3(x)$$

بنابراین احتمال پیدا کردن سیستم در حالت $\phi_r(x) e^{-i\frac{E_r t}{\hbar}}$ بدون اینکه در طی زمان تغییر کند همان $\frac{4}{11}$ است.

(پ)

طبق تعریف $\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2$ و $\vec{J} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \Delta \psi)$ می‌باشد. پس:

$$\rho(x,t) = \left(\frac{2}{\sqrt{11}} e^{i\frac{E_1 t}{\hbar}} f_1(x) + \sqrt{\frac{3}{11}} e^{i\frac{E_2 t}{\hbar}} f_2(x) + \frac{2}{\sqrt{11}} e^{i\frac{E_3 t}{\hbar}} f_3(x) \right)^2$$

$$P_r = |C_r|^2$$

$$= \frac{1}{11} \left(4 \phi_1^2(x) + 3 \sqrt{3} e^{\frac{it}{\hbar}(E_1 - E_2)} \phi_1(x) \phi_2(x) + 4 e^{\frac{it}{\hbar}(E_1 - E_3)} \phi_1(x) \phi_3(x) \right)$$

$$\begin{aligned}
& + r \phi_r^*(x) + r \sqrt{r} e^{-\frac{it}{\hbar}(E_1 - E_r)} \phi_1(x) \phi_r(x) + r \sqrt{r} e^{\frac{it}{\hbar}(E_r - E_1)} \phi_r(x) \phi_1(x) \\
& \left[+ r \phi_r^*(x) + r e^{-\frac{it}{\hbar}(E_1 - E_r)} \phi_1(x) \phi_r(x) + r \sqrt{r} e^{\frac{it}{\hbar}(E_r - E_1)} \phi_r(x) \phi_1(x) \right] \\
& = \frac{1}{11} \left\{ r \phi_1^*(x) + r \phi_r^*(x) + r \phi_1^*(x) + r \sqrt{r} \phi_1(x) \phi_1(x) \cos \left[\frac{(E_1 - E_r)t}{\hbar} \right] \right. \\
& \quad \left. + r \phi_1(x) \phi_r(x) \cos \left[\frac{(E_1 - E_r)t}{\hbar} \right] + r \sqrt{r} \phi_r(x) \phi_r(x) \cos \left[\frac{(E_r - E_1)t}{\hbar} \right] \right\}
\end{aligned}$$

$$J_x = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left(\psi^* \frac{d\psi}{dx} \right)$$

$$\frac{d}{dx} \psi(x, t) = \frac{r}{\sqrt{11}} e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} \frac{d\phi_1(x)}{dx} + \sqrt{\frac{r}{11}} e^{-\frac{iE_r t}{\hbar}} \frac{d\phi_r(x)}{dx} + \frac{r}{\sqrt{11}} e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} \frac{d\phi_r(x)}{dx}$$

$$\psi^*(x, t) = \frac{r}{\sqrt{11}} e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}} \phi_1(x) + \sqrt{\frac{r}{11}} e^{\frac{iE_r t}{\hbar}} \phi_r(x) + \frac{r}{\sqrt{11}} e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}} \phi_r(x)$$

$$\begin{aligned}
J_x &= \frac{\hbar}{m} \frac{1}{11} \left[r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_1)t}{\hbar} \right] \phi_r(x) \frac{d\phi_1(x)}{dx} + r \sin \left[\frac{(E_r - E_1)t}{\hbar} \right] \phi_r(x) \frac{d\phi_1(x)}{dx} \right. \\
& \quad \left. + r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_1 - E_r)t}{\hbar} \right] \phi_1(x) \frac{d\phi_r(x)}{dx} + r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_r)t}{\hbar} \right] \phi_r(x) \frac{d\phi_r(x)}{dx} \right. \\
& \quad \left. + r \sin \left[\frac{(E_1 - E_r)t}{\hbar} \right] \phi_1(x) \frac{d\phi_r(x)}{dx} + r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_r)t}{\hbar} \right] \phi_r(x) \frac{d\phi_r(x)}{dx} \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla} \cdot \vec{J} &= \frac{dJ_x}{dx} = \frac{1}{11} \frac{\hbar}{m} \left\{ r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_1)t}{\hbar} \right] \left(\frac{d\phi_r}{dx} \frac{d\phi_1}{dx} + \phi_r \frac{d^2 \phi_1}{dx^2} - \frac{d\phi_1}{dx} \frac{d\phi_r}{dx} - \phi_1 \frac{d^2 \phi_r}{dx^2} \right) \right. \\
& \quad \left. + r \sin \left[\frac{(E_r - E_1)t}{\hbar} \right] \left(\frac{d\phi_r}{dx} \frac{d\phi_1}{dx} + \phi_r \frac{d^2 \phi_1}{dx^2} - \frac{d\phi_1}{dx} \frac{d\phi_r}{dx} - \phi_1 \frac{d^2 \phi_r}{dx^2} \right) \right. \\
& \quad \left. + r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_r)t}{\hbar} \right] \left(\frac{d\phi_r}{dx} \frac{d\phi_r}{dx} + \phi_r \frac{d^2 \phi_r}{dx^2} - \frac{d\phi_r}{dx} \frac{d\phi_r}{dx} - \phi_r \frac{d^2 \phi_r}{dx^2} \right) \right\} \\
&= \frac{1}{11} \frac{\hbar}{m} \left\{ r \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_1)t}{\hbar} \right] \left(-\frac{\pi^r}{a^r} \phi_r \phi_1 + \frac{\pi^r}{a^r} \phi_1 \phi_r \right) \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \left(-\frac{\pi^r}{a^r} \phi_l \phi_r + \frac{\pi^r}{a^r} \phi_l \phi_r \right) \\
& \left\{ + \frac{1}{2} \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \left(-\frac{\pi^r}{a^r} \phi_l \phi_r + \frac{\pi^r}{a^r} \phi_l \phi_r \right) \right\} \\
& = \frac{1}{11} \frac{\hbar \pi^r}{m a^r} \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r + \frac{1}{2} \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r \right\} \\
& + \frac{1}{2} \sqrt{r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r \\
\frac{\partial p}{\partial t} & = \frac{1}{11} \left\{ -\frac{1}{2} \sqrt{r} \times \frac{E_r - E_l}{\hbar} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r - \frac{1}{2} \times \frac{E_r - E_l}{\hbar} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r \right\} \\
& \left\{ -\frac{1}{2} \sqrt{r} \times \frac{E_r - E_l}{\hbar} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r \right\} = \frac{1}{11} \left\{ -\frac{1}{2} \sqrt{r} \frac{\pi^r \hbar^r}{r m a^r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r \right. \\
& \left. - \frac{1}{2} \times \frac{\pi^r \hbar^r}{r m a^r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r - \frac{1}{2} \sqrt{r} \times \frac{\pi^r \hbar^r}{r m a^r} \sin \left[\frac{(E_r - E_l)t}{\hbar} \right] \phi_l \phi_r \right\} \\
& = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}
\end{aligned}$$

پس:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

تمرین ۴-۱۹

ذره‌ای را در یک چاه پتانسیل نامتناهی در نظر بگیرید که تابع موج آن با رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ax(a^r - x^r), & 0 < x < a, \\ 0, & \text{هر جای دیگر} \end{cases}$$

و در آن A یک ثابت حقیقی است.

(آ) A را طوری بیابید که $\psi(x)$ بهنجار باشد.

(ب) عدم قطعیت‌های موقعیت و تکانه، (Δp و Δx) و حاصل ضرب $\Delta x \Delta p$ را محاسبه کنید.

(پ) احتمال یافتن $\Delta^2 \pi^2 \hbar^2 / (r m a^r)$ در اندازه‌گیری انرژی را محاسبه کنید.

حل:

(i)

شرط بهنجارش آنست که احتمال یافتن ذره در تمام فضا برابر یک باشد؛ پس:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_0^a x^2 (a^2 - x^2)^2 dx = A^2 \int_0^a (a^4 x^2 - 2a^2 x^4 + x^6) dx$$

$$= A^2 \left(\frac{a^4}{3} - \frac{2a^4}{5} + \frac{a^4}{7} \right) = A^2 a^4 \left(\frac{35 - 42 + 30}{105} \right) = \frac{1}{105} A^2 a^4$$

در نتیجه:

$$A = \frac{1}{\sqrt{a^4}} \sqrt{\frac{105}{2}}$$

(ب)

می‌دانیم که ویژه توابع هامیلتونی ذره در جعبه‌ی $\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ با ویژه مقادیر

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

احتمال اینکه در اندازه‌گیری انرژی مقدار $\frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ حاصل

شود عبارتست از:

$$P_n(E_n) = |\langle \phi_n | \psi \rangle|^2$$

اما:

$$\langle \phi_n | \psi \rangle = \int_0^a dx \phi_n^*(x) \psi(x) = \int_0^a dx \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) A x (a^2 - x^2)$$

$$= A \sqrt{\frac{2}{a}} \left[a^2 \int_0^a x \sin \frac{n\pi x}{a} dx - \int_0^a x^3 \sin \frac{n\pi x}{a} dx \right]$$

$$= A \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{-a^2}{(n\pi)^2} (-1)^n$$

در نتیجه:

$$P_n(E_n) = A^2 \left(\frac{2}{a} \right) \frac{a^4}{(n\pi)^4} = \frac{105}{105} \times \frac{105}{105} = \frac{945}{(n\pi)^4}$$

(پ)

از رابطی $\Delta \hat{A} = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}$ استفاده می‌کنیم:

$$\langle \hat{X} \rangle = \int_{-a}^a A^r x^r (a^r - x^r)^r x dx = A^r \int_{-a}^a (a^r x^r - r a^r x^\delta + x^\nu) dx = A^r \left(\frac{a^\lambda}{4} - \frac{r a^\lambda}{6} + \frac{a^\lambda}{8} \right) = \frac{A^r a^\lambda}{24}$$

$$\langle \hat{X}^r \rangle = \int_{-a}^a A^r x^r (a^r - x^r)^r x^r dx = A^r \int_{-a}^a (a^r x^r - r a^r x^\delta + x^\nu) dx = A^r \left(\frac{a^\lambda}{5} - \frac{r a^\lambda}{7} + \frac{a^\lambda}{9} \right) = \frac{\lambda A^r a^\lambda}{215}$$

$$\Delta x = \left[\frac{\lambda a^\lambda}{215} \frac{105}{\lambda a^\nu} - \left(\frac{105}{\lambda a^\nu} \frac{a^\lambda}{24} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{a}{64} \sqrt{\frac{421}{3}}$$

$$\langle \hat{P} \rangle = \int_{-a}^a \psi^*(x) \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \psi(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} \langle \hat{P}^r \rangle &= \int_{-a}^a \psi^*(x) \left(\frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \right)^r \psi(x) dx = -\hbar^r \int_{-a}^a A^r x (a^r - x^r) \frac{d}{dx} (a^r - r x^r) dx = 6 A^r \hbar^r \int_{-a}^a x^r (a^r - x^r) dx \\ &= 6 A^r \hbar^r \left(\frac{a^\delta}{3} - \frac{a^\delta}{5} \right) = 6 \hbar^r \left(\frac{105}{\lambda a^\nu} \right) \frac{r a^\delta}{15} = \frac{21}{2} \frac{\hbar^r}{a^r} \end{aligned}$$

$$\Delta P = \sqrt{\frac{21}{2}} \frac{\hbar}{a}$$

پس:

$$\Delta x \Delta P = \frac{a}{64} \sqrt{\frac{421}{3}} \sqrt{\frac{21}{2}} \frac{\hbar}{a} = \frac{1}{64} \sqrt{\frac{2947}{2}}$$

تمرین ۴-۲۰

عبارت نسبیتی برای انرژی یک ذره آزاد به صورت $E^r = m^r c^r + p^r c^r$ است.
 (آ) معادله‌ی شرودینگر متناظر را به وسیله‌ی کوانتیده کردن عبارت انرژی بنویسید (یعنی E و P را با عملگرهای متناظرشان جابجا کنید). این معادله را معادله‌ی کلاین-گوردون می‌نامند.
 (ب) جواب‌های متناظر با یک ذره آزاد در حال حرکت در راستای محور x را پیدا کنید.

حل:

(آ)

معادله‌ی شرودینگر در حالت کلی به صورت زیر است:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = H \psi(\vec{x}, t)$$

اما در اینجا:

$$H = \sqrt{m^r \dot{c}^r + \hat{P}^r \dot{c}^r} + V(\hat{X}) = \sqrt{m^r \dot{c}^r + \left(\frac{\hbar}{i} \dot{v}^r\right)^r} \dot{c}^r + V(\hat{X}) = \sqrt{m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r} + V(\hat{X})$$

پس:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \left(\sqrt{m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r} + V(\hat{X}) \right) \psi(\vec{x}, t)$$

(ب)

معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان برای ذره‌ی آزاد $(V(\hat{X}) = 0)$ به صورت زیر درمی‌آید:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{x}, t)}{\partial t} = \left(\sqrt{m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r} \right) \psi(\vec{x}, t)$$

به روش جداسازی متغیرها و با انتخاب:

$$\psi(\vec{x}, t) = \psi(\vec{x}, \circ) T(t)$$

داریم:

$$i\hbar \psi(\vec{x}, \circ) \frac{dT(t)}{dt} = T(t) \left(\sqrt{m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r} \right) \psi(\vec{x}, \circ)$$

با تقسیم طرفین این رابطه بر $T(t) \psi(\vec{x}, \circ)$ داریم:

$$E = i\hbar \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{\left(\sqrt{m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r} \right) \psi(\vec{x}, \circ)}{\psi(\vec{x}, \circ)}$$

پس

$$T(t) = e^{-i \frac{Et}{\hbar}}$$

$$\left(m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r \right)^{\frac{1}{r}} \psi(\vec{x}, \circ) = E \psi(\vec{x}, \circ)$$

معادله‌ی اخیر را می‌توان به شکل زیر نیز نوشت:

$$\left(m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r v^r \right) \psi(\vec{x}, \circ) = E^r \psi(\vec{x}, \circ)$$

در یک بعد داریم:

$$\left(m^r \dot{c}^r - \hbar^r \dot{c}^r \frac{d^r}{dx^r} \right) \psi(x, \circ) = E^r \psi(x, \circ)$$

یا:

$$\frac{d^r}{dx^r} \psi(x, \circ) + \frac{E^r - m^r \dot{c}^r}{\hbar^r \dot{c}^r} \psi(x, \circ) = 0$$

با تعریف $k^2 = \frac{E^2 - m^2 c^2}{\hbar^2 c^2}$ داریم:

$$\psi(x,0) = A_+ e^{ikx} + A_- e^{-ikx}$$

و در نتیجه:

$$\psi(x,t) = A_+ e^{i\left(kx - \frac{Et}{\hbar}\right)} + A_- e^{-i\left(kx + \frac{Et}{\hbar}\right)}$$

تمرین ۴-۲۱

(آ) انرژی E_c (گرانشی) کلاسیک ذره‌ی ساکن به جرم m را در ارتفاع h بالای سطح زمین به دست آورید. (انرژی پتانسیل را در سطح زمین صفر بگیرید).

(ب) اصل عدم قطعیت را برای تخمین انرژی حالت پایه‌ی E ذره‌ی معرفی شده در (آ) به کار ببرید. توجه کنید که ذره تحت گرانش است. E_c و E را مقایسه کنید.

(پ) اگر $h = 3m$ مقدارهای عددی E_c و تصحیح کوانتوم مکانیکی $(E - E_c)$ را برای یک نوترون و سپس برای ذره‌ای به جرم $m = 0.01 \text{ kg}$ به دست آورید. در مورد اهمیت تصحیح کوانتومی در هر دو حالت اظهار نظر کنید.

حل:

(آ)

از نظر کلاسیکی انرژی این ذره ثابت برابر mgh است.

(ب)

در اینجا اصل عدم قطعیت در مکان ذره از مرتبه‌ی h است، یعنی:

$$\Delta x = h.$$

پس اصل عدم قطعیت حداقلِ تکانه‌ی ذره $\frac{\hbar}{2\Delta x} \simeq \frac{\hbar}{2h}$ است. لذا انرژی کل به عنوان تابعی از h عبارتست از:

$$E(h) = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{2h} \right)^2 + mgh.$$

فرض می‌کنیم که E در $h = h'$ کمترین مقدار خود را دارد؛ پس:

$$0 = E'(h') = \frac{dE}{dh} \Big|_{h=h'} = \frac{1}{2m} \frac{\hbar^2}{h'^3} - \frac{1}{h'^2} + mg$$

در نتیجه:

$$h' = \frac{\hbar^2}{4m^2g}$$

$$E_{\min} = E(h') = \frac{1}{2m} \frac{\hbar^2}{4} \frac{1}{h'} + mgh' = \frac{\hbar^2 + 4m^2gh'}{4mh'} = \frac{\hbar^2 + 2\hbar^2}{4m \left(\frac{\hbar^2}{4m^2g} \right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{3\hbar^2}{4m} \left(\frac{4m^2g}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{3}{4} \left(\frac{\hbar^2}{m^{\frac{1}{2}}} \frac{4m^2g}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4} \left(4\hbar m^{\frac{1}{2}}g \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4} m^{\frac{1}{2}} (4\hbar g)^{\frac{1}{2}}$$

(ب)

اگر m_n جرم نوترون و m جرم ذره 0.1 کیلوگرمی باشد، داریم:

$$m_n gh = 1/975 \times 10 \times 3 = 5/02 \times 10^{-26}$$

$$E_{neu} = \frac{3}{4} \left(1/975 \times 10^{-27} \right)^{\frac{1}{2}} \left(4 \times 1/055 \times 10^{-24} \times 10 \right)^{\frac{1}{2}} = 1/163 \times 10^{-21}$$

پس E_e و E_n مربوط به نوترون تقریباً هم‌مرتبه هستند.

$$mgh = 0.1 \times 10 \times 3 = 0.3$$

$$E_e = \frac{3}{4} \left(0.1 \right)^{\frac{1}{2}} \left(4 \times 1/055 \times 10^{-24} \times 10 \right)^{\frac{1}{2}} = 2/06 \times 10^{-22}$$

لذا E_e در مقایسه با E_n برای یک ذره‌ی کلاسیکی بسیار ناچیز است. بنابراین در مقیاس میکروسکوپی لحاظ کردن اثرات کوانتومی حایز اهمیت است.

تمرین ۴-۲۲

ترازهای انرژی و تابع موج‌های یک سیستم دو ذره‌ای به جرم‌های m_1 و m_2 را که برهم کنش آنها با پتانسیل چاه مربعی نامتناهی زیر توصیف می‌شود، پیدا کنید:

$$V(x_i) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x_i \leq a, \\ +\infty & \text{هر جای دیگر} \end{cases}$$

x_i موقعیت i امین ذره است (یعنی x_i ، بیانگر x_1 یا x_2 است).

حل:

در اینجا هامیلتونی به صورت زیر است:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{P}_2^2}{2m_2} + V(\hat{X}_1, \hat{X}_2)$$

همان طور که در متن کتاب توضیح داده شده است، با تعاریف زیر:

$$P = P_1 + P_2, \quad X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M}$$

$$p = \frac{m_2 P_1 - m_1 P_2}{M}, \quad x = x_1 - x_2$$

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

خواهیم داشت:

$$\hat{H} = \frac{p^2}{2M} + \frac{P^2}{2\mu} + V(x)$$

به طوری که:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad 0 \leq x \leq a \\ +\infty & ; \quad \text{جاهای دیگر} \end{cases}$$

لذا ویژه توابع هامیلتونی عبارتند از:

$$\psi(x_1, x_2) = \psi(X, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{\pm i k x}$$

که در آن k عددی حقیقی با طیفی پیوسته و n عدد صحیح مثبت است و انرژی برابر است با:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2M} + \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

هامیلتونی سیستم به صورت زیر است:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{P}_2^2}{2m_2} + V(\hat{x}_1) + V(\hat{x}_2) = \frac{P_1^2}{2m_1} + V(x_1) + \frac{P_2^2}{2m_2} + V(x_2) = H_1 + H_2$$

به طور کلی هرگاه بتوان هامیلتونی را به شکل $\hat{H} = \sum_i H_i$ نوشت در این صورت انرژی سیستم E و

ویژه توابع $\psi(x_1, x_2, \dots, x_1, \dots)$ آن را می توان به صورت زیر بیان کرد:

$$E = \sum_i E_i$$

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_1, \dots) = \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \dots \psi_i(x_i) \dots$$

که در آن E_i انرژی مربوط به ذره i ام و $\psi_i(x_i)$ ویژه تابع هامیلتونی مربوط به ذره i ام است. پس در اینجا:

$$\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_1 \pi x_1}{a}\right) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_2 \pi x_2}{a}\right)$$

$$E_{n_1, n_2} = E_{n_1} + E_{n_2} = \frac{n_1^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_1 a^2} + \frac{n_2^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_2 a^2}$$

که در این روابط n_1 و n_2 اعداد صحیح مثبت هستند.

تمرین ۴-۲۳

ذره‌ای به جرم m تحت پتانسیل دافع دلتا $V(x) = V_0 \delta(x)$ است که در آن $V_0 > 0$ دارای بعد انرژی $\times$ فاصله است. ضرایب بازتاب و عبور، R و T را بیابید.

حل:

معادله‌ی شرودینگر بیانگر آنست که معادله‌ی دیفرانسیل حاکم بر ویژه تابع انرژی $\psi(x)$ به صورت زیر است:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0 \delta(x)) \psi(x) = 0$$

با فرض $x \neq 0$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

با تعریف $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ داریم:

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx} & ; x \leq 0 \\ C e^{ikx} & ; x \geq 0 \end{cases}$$

از پیوستگی $\psi(x)$ در $x = 0$ داریم:

$$A + B = C$$

از گسستگی مشتق $\psi(x)$ در $x = 0$ داریم:

$$\int_{x=0^-}^{x=0^+} \frac{d}{dx} \left(\frac{d\psi}{dx} \right) dx - \frac{2mE}{\hbar^2} \int_{x=0^-}^{x=0^+} dx - \frac{2mV_0}{\hbar^2} \int_{x=0^-}^{x=0^+} \delta(x) \psi(x) dx = 0$$

یا

$$\left[\frac{d\psi}{dx} \right]_{x=0^-}^{x=0^+} + 0 - \frac{2mV}{\hbar^2} \psi(0) = 0$$

$$ikC - ik(A - B) = \frac{2mV}{\hbar^2} C$$

در نتیجه:

$$ik(A + B) - ik(A - B) = \frac{2mV}{\hbar^2} (A + B)$$

از حل این معادله نتیجه می‌شود:

$$\frac{B}{A} = \frac{1}{\frac{ik\hbar^2}{mV} - 1}$$

در نتیجه:

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2 = \frac{1}{\frac{k^2\hbar^2}{m^2V} + 1} = \frac{m^2V^2}{k^2\hbar^2 + m^2V^2}$$

$$T = 1 - R = \frac{k^2\hbar^2}{k^2\hbar^2 + m^2V^2}$$

تمرین ۴-۲۴

ذره‌ای به جرم m به وسیله‌ی پتانسیل دلتای دوگانه $V(x) = V_0\delta(x-a) + V_0\delta(x+a)$ که در آن، $V_0 > 0$ است پراکنده می‌شود.

(آ) ضریب عبور را برای ذره در انرژی $E > 0$ پیدا کنید.

(ب) هنگامی که V_0 خیلی بزرگ باشد (یعنی، $V_0 \rightarrow \infty$)، انرژی‌های متناظر با حالت تشدید (یعنی $T=1$) را پیدا کنید و آن‌ها را با انرژی‌های یک چاه پتانسیل مربعی نامتناهی به پهنای $2a$ مقایسه کنید.

حل:

(آ)

با توجه به معادله‌ی شرودینگر، ویژه تابع هامیلتونی در رابطه‌ی زیر صدق می‌کند:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0\delta(x-a) - V_0\delta(x+a))\psi(x) = 0$$

به جز در $x = \pm a$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

با تعریف $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ داریم:

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{ikx} + B e^{-ikx} & ; \quad x \leq -a \\ C e^{ikx} + D e^{-ikx} & ; \quad -a \leq x \leq +a \\ E e^{ikx} & ; \quad x \geq a \end{cases}$$

حال شرط مرزی پیوستگی تابع موج در $x = \pm a$ را اعمال می‌کنیم:

$$A e^{-ika} + B e^{ika} = C e^{-ika} + D e^{ika} \quad *$$

$$C e^{ika} + D e^{-ika} = E e^{ika}$$

از گسستگی تابع موج در $x = \pm a$ داریم:

$$\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=-a+\varepsilon} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=-a-\varepsilon} = \frac{2mV}{\hbar^2} \psi(-a)$$

$$\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=a+\varepsilon} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=a-\varepsilon} = \frac{2mV}{\hbar^2} \psi(+a)$$

یا به‌طور معادل:

$$ik(C e^{-ika} - D e^{ika}) - ik(A e^{-ika} - B e^{ika}) = \frac{2mV}{\hbar^2} (A e^{-ika} + B e^{ika}) \quad **$$

$$ikE e^{ika} - ik(C e^{ika} - D e^{-ika}) = \frac{2mV}{\hbar^2} E e^{ika}$$

معادله‌ی اخیر را بازنویسی می‌کنیم:

$$ik(C e^{ika} - D e^{-ika}) = E e^{ika} \left(ik - \frac{2mV}{\hbar^2} \right)$$

از طرفی داریم:

$$ik[C e^{ika} + D e^{-ika}] = ikE e^{ika}$$

از جمع و تفریق دو رابطه‌ی اخیر داریم:

$$C = \left(1 + \frac{imV}{k\hbar^2} \right)^{-1} E, \quad D = \frac{-imV}{k\hbar^2} e^{ika} E$$

این روابط را در رابطه‌ی ** جایگزین می‌کنیم:

$$Ee^{-ika} + \frac{imV}{k\hbar^2} Ee^{-ika} + \frac{imV}{k\hbar^2} e^{ika} E - Ae^{-ika} + Be^{ika} = \frac{-imV}{k\hbar^2} Ae^{-ika} - \frac{imV}{k\hbar^2} Be^{ika}$$

یا:

$$Be^{ika} \left(1 + \frac{imV}{k\hbar^2} \right) = Ae^{-ika} \left(1 - \frac{imV}{k\hbar^2} \right) - E \left(e^{-ika} + \frac{imV}{k\hbar^2} e^{-ika} + \frac{imV}{k\hbar^2} e^{ika} \right)$$

مقدار B را از رابطه‌ی اخیر یافته و در رابطه‌ی * جایگزین می‌کنیم:

$$Ae^{-ika} + Ae^{-ika} \frac{1 - \frac{imV}{k\hbar^2}}{1 + \frac{imV}{k\hbar^2}} - E \frac{e^{-ika} + \frac{imV}{k\hbar^2} e^{-ika} + \frac{imV}{k\hbar^2} e^{ika}}{1 + \frac{imV}{k\hbar^2}} =$$

$$\left(1 + \frac{imV}{k\hbar^2} \right) E e^{-ika} - \frac{imV}{k\hbar^2} e^{ika} E$$

در نتیجه:

$$\frac{E}{A} = \frac{1}{1 - \left(\frac{mV}{k\hbar^2} \right)^2 + \left(\frac{mV}{k\hbar^2} \right)^2 \cos(ka) + i \frac{mV}{k\hbar^2} \left(2 + \frac{mV}{k\hbar^2} \sin(ka) \right)}$$

$$T = \left| \frac{E}{A} \right|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{mV}{k\hbar^2} \right)^2 \left[\frac{mV}{k\hbar^2} \sin(ka) + \cos(ka) \right]^2}$$

تمرین ۴-۲۵

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که تحت پتانسیل دلتای پاد متقارن

$$V(x) = V_0 \delta(x+a) - V_0 \delta(x-a)$$

قرار دارد ($V_0 > 0$).

(آ) نشان دهید که همواره یک و فقط یک حالت مقید وجود دارد و عبارت مربوط به انرژی را بیابید.

(ب) ضریب عبور T را پیدا کنید.

حل:

(آ)

از معادله‌ی شرودینگر داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V \delta(x+a) + V \delta(x-a)) \psi(x) = 0.$$

به‌جز در $x = \pm a$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} |E| \psi(x) = 0.$$

چون به دنبال حالات مقید هستیم، انرژی E را منفی در نظر گرفته‌ایم. با تعریف $k = \frac{2m|E|}{\hbar^2}$ داریم:

$$\psi(x) = \begin{cases} A e^{kx} & ; x \leq -a \\ B e^{kx} + C e^{-kx} & ; -a \leq x \leq a \\ D e^{-kx} & ; x \geq a \end{cases}$$

از پیوستگی تابع موج در $x = \pm a$ داریم:

$$A e^{-ka} = B e^{-ka} + C e^{ka} \quad *$$

$$B e^{ka} + C e^{-ka} = D e^{-ka}$$

با استفاده از معادله دیفرانسیل شرودینگر، گسستگی $\frac{d\psi(x)}{dx}$ در $x = \pm a$ نتیجه می‌دهد که:

$$\psi'(-a+\varepsilon) - \psi'(-a-\varepsilon) = \frac{2mV}{\hbar^2} \psi(-a)$$

$$\psi'(a+\varepsilon) - \psi'(a-\varepsilon) = -\frac{2mV}{\hbar^2} \psi(a)$$

یا:

$$k(B e^{-ka} - C e^{ka}) - kA e^{-ka} = \frac{2mV}{\hbar^2} A e^{-ka} \quad **$$

$$-k D e^{-ka} - k(B e^{ka} - C e^{-ka}) = \frac{-2mV}{\hbar^2} D e^{-ka}$$

از معادله‌ی اخیر نتیجه می‌شود که:

$$k(B e^{ka} - C e^{-ka}) = D e^{-ka} \left(\frac{2mV}{\hbar^2} - k \right)$$

از طرفی:

$$k(B e^{ka} + C e^{-ka}) = k D e^{-ka}$$

از جمع و تفریق دو رابطه‌ی اخیر داریم:

$$B = \frac{mV}{k\hbar^2} e^{-\tau ka} D, \quad C = \left(1 - \frac{mV}{k\hbar^2}\right) D$$

این روابط را در رابطه $**$ جایگزین می‌کنیم:

$$A e^{-ka} \left(1 + \frac{\tau mV}{k\hbar^2}\right) = \left[\frac{mV}{k\hbar^2} e^{-\tau ka} - \left(1 - \frac{mV}{k\hbar^2}\right) e^{ka} \right] D$$

با توجه به رابطه $*$ داریم:

$$\frac{\frac{mV}{k\hbar^2} e^{-\tau ka} - \left(1 - \frac{mV}{k\hbar^2}\right) e^{ka}}{1 + \frac{\tau mV}{k\hbar^2}} D = \frac{mV}{k\hbar^2} e^{-\tau ka} D + \left(1 - \frac{mV}{k\hbar^2}\right) e^{ka} D$$

یا:


$$\begin{aligned} \frac{mV}{k\hbar^2} e^{-\tau ka} - e^{ka} + \frac{mV}{k\hbar^2} e^{ka} &= \frac{mV}{k\hbar^2} e^{-\tau ka} + \tau \left(\frac{mV}{k\hbar^2}\right)^{\tau} e^{-\tau ka} + e^{ka} - \frac{mV}{k\hbar^2} e^{ka} \\ &+ \frac{\tau mV}{k\hbar^2} e^{ka} - \tau \left(\frac{mV}{k\hbar^2}\right)^{\tau} e^{ka} \end{aligned}$$

از ساده سازی این معادله نتیجه می‌شود که:

$$1 - \left(\frac{k\hbar^2}{mV}\right)^{\tau} = e^{-\tau ka}$$

از حل این معادله به روش عددی و یا رسم نمودار، فقط یک مقدار برای k به دست می‌آید و طبق

رابطه $E = -\frac{k^2 \hbar^2}{2m}$ تنها یک مقدار برای E حاصل می‌شود.



ذره‌ای به جرم m در معرض پتانسیل دلتای

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x \leq 0 \\ V_0 \delta(x-a) & x > 0 \end{cases}$$

قرار دارد که در آن $V_0 > 0$.
 (آ) توابع موج متناظر با حالت‌های $0 < x < a$ و $x > a$ را بیابید.
 (ب) ضریب عبور را پیدا کنید.

حل:

چون برای $x \leq 0$ پتانسیل نامتناهی است لذا تابع موج برای این ناحیه صفر است. برای ناحیه $x \geq 0$ تابع موج $\psi(x)$ در معادله‌ی زیر (که از معادله‌ی شرودینگر استخراج می‌شود) صدق می‌کند:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0 \delta(x-a)) \psi(x) = 0$$

به جز در ناحیه‌ی $x = a$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

با فرض مثبت بودن E و با تعریف $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ داریم:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad x \leq 0 \\ C \sin kx & ; \quad 0 \leq x \leq a \\ A e^{-ikx} + B e^{ikx} & ; \quad x \geq a \end{cases}$$

در اینجا فرض کرده‌ایم که ذره از سمت راست بر پتانسیل فرود می‌آید و در ضمن، شرط صفر بودن $\psi(x)$ در $x = 0$ را نیز لحاظ کرده‌ایم.

حال شرط مرزی پیوستگی $\psi(x)$ در $x = a$ را اعمال می‌کنیم:

$$C \sin ka = A e^{-ika} + B e^{ika}$$

از گسستگی مشتق تابع موج در $x = a$ داریم:

$$\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=a^+} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=a^-} = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi(a)$$

یا:

$$ik(-A e^{-ika} + B e^{ika}) - k C \cos ka = \frac{2mV_0}{\hbar^2} (A e^{-ika} + B e^{ika}) = \frac{2mV_0}{\hbar^2} C \sin ka$$

با استفاده از رابطه $B e^{ika} = C \sin ka - A e^{-ika}$ ؛ داریم:

$$ik(-A e^{-ika} + C \sin ka - A e^{-ika}) - K C \cos ka = \frac{2mV}{\hbar^2} C \sin ka$$

یا:

$$-2iA e^{-ika} = C \left(e^{-ika} + \frac{2mV}{k\hbar^2} \sin ka \right)$$

یا:

$$\frac{C}{A} = \frac{-2i}{1 + \frac{2mV}{k\hbar^2} e^{ika} \sin ka}$$

با توجه به اینکه:

$$\psi(x) = C \sin kx = \frac{C}{2i} (e^{ikx} - e^{-ikx}) ; 0 \leq x \leq a$$

پس ضریب عبور T عبارتست از:

$$T = \frac{\frac{\hbar k}{m} |C|^2}{\frac{\hbar k}{m} |A|^2} = \frac{|C|^2}{|A|^2}$$

پس:

$$T = \frac{1}{\left(1 + \frac{2mV}{k\hbar^2} e^{ika} \sin ka \right) \left(1 + \frac{2mV}{k\hbar^2} e^{-ika} \sin ka \right)} = \frac{1}{1 + 4 \left(\frac{mV}{k\hbar^2} \right)^2 \sin^2(ka) + \frac{2mV}{k\hbar^2} \sin(2ka)}$$

تمرین ۴-۲۷

ذره‌ای به جرم m علاوه بر این که به حرکت در یک چاه پتانسیل مربعی نامتناهی به اندازه‌ی $2a$ با دیوارهایی در $x = -a$ و $x = a$ محدود شده، در معرض یک پتانسیل دلتای جاذب به صورت زیر قرار گرفته است:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 \delta(x) & -a < x < a \\ \infty & \text{هر جای دیگر} \end{cases}$$

که $V_0 > 0$ است.(آ) تابع موج ذره متناظر با جواب زوج را وقتی $E > 0$ است بیابید.

(ب) ترازهای انرژی متناظر با جواب زوج را بیابید.

حل:

(۱) در ناحیه‌ی $|x| \geq a$ واضح است که به دلیل نامتناهی بودن پتانسیل، $\psi(x)$ باید صفر باشد. در ناحیه‌ی $-a \leq x \leq a$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V \delta(x)) \psi(x) = 0$$

با فرض $x \neq 0$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

که در رابطه‌ی فوق $K = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ می‌باشد. شرط صفر بودن $\psi(x)$ در $x = \pm a$ ایجاب می‌کند که:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & ; |x| \geq a \\ A \sin k(x+a) & ; -a \leq x \leq 0 \\ B \sin k(x-a) & ; 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

چون به دنبال جواب‌های زوج هستیم پس: $B = -A$.

از گسستگی مشتق تابع موج در $x = 0$ داریم:

$$\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=0^+} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=0^-} = \frac{2mV}{\hbar^2} \psi(0)$$

$$A k \cos ka - A k \cos ka = \frac{2mV}{\hbar^2} A \sin ka$$

یا:

$$\tan ka = -\frac{k\hbar^2}{mV}$$

رابطه‌ی اخیر، رابطه‌ای است که از حل آن، انرژی به دست می‌آید. در ضمن A را نیز می‌توان از شرط بهنجارش یافت:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-a}^0 A^2 \sin^2 k(x+a) dx + \int_0^a A^2 \sin^2 k(x-a) dx \\ &= \frac{A^2}{2} \left\{ \int_{-a}^0 [1 - \cos 2k(x+a)] dx + \int_0^a [1 - \cos 2k(x-a)] dx \right\} \\ &= \frac{A^2}{2} \left(a - \frac{1}{2k} [\sin 2k(x+a)]_{-a}^0 + a - \frac{1}{2k} [\sin 2k(x-a)]_0^a \right) = \frac{A^2}{2} \left(2a - \frac{2}{2k} \sin(2ka) \right) \end{aligned}$$

پس:

$$A = \left[a - \frac{1}{2k} \sin(2ka) \right]^{-\frac{1}{2}}$$

تمرین ۴-۲۸

ذره‌ای به جرم m ضمن محدود بودن به حرکت در یک چاه پتانسیل مربعی نامتناهی به اندازه $2a$ با دیوارهایی در $x = -a$ و $x = +a$ ، در معرض یک پتانسیل دلتای جاذب:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 \delta(x) & -a < x < a \\ \infty & \text{هر جای دیگر} \end{cases}$$

قرار دارد که در آن $V_0 > 0$.

(آ) تابع موج ذره را که متناظر با جواب‌های فرد است برای حالتی که $E > 0$ بیابید.

(ب) ترازهای انرژی متناظر با جواب‌های فرد را بیابید.

حل:

با توجه به تمرین ۴-۲۷ چون به دنبال جواب‌های فرد هستیم، داریم:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & ; |x| \geq a \\ A \sin k(x+a) & ; -a \leq x \leq a \\ a \sin(x-a) & ; 0 \leq x \leq a \end{cases}$$

از طرفی:

$$Ak \cos ka - ak \cos ka = \frac{2mV_0}{\hbar^2} A \sin ka$$

پس:

$$\sin ka = 0$$

یا:

$$ka = n\pi$$

;

$$n = 1, 2, \dots$$

در نتیجه:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

و:

$$A = \sqrt{\frac{1}{a}}$$

تمرین ۴-۲۹

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که تحت اثر یک پتانسیل دلتای جاذب

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 \delta(x) & x > -a \\ \infty & x < -a \end{cases}$$

در حال حرکت است و در آن $V_0 > 0$ است. درباره‌ی وجود حالت‌های مقید بر حسب V_0 و a بحث کنید.

حل:

برای ناحیه‌ی $x \leq -a$ به دلیل نامتناهی بودن پتانسیل، تابع موج باید صفر باشد و برای ناحیه‌ی $x \geq 0$ داریم:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0 \delta(x)) \psi(x) = 0$$

به‌ازای $x \neq 0$ با فرض منفی بودن انرژی داریم:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} - k^2 \psi(x) = 0$$

که در اینجا $k = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$ می‌باشد. با اعمال شرط مرزی $\psi(-a) = \psi(+\infty) = 0$ داریم:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq -a \\ A \sinh k(x+a) & ; -a \leq x \leq 0 \\ B e^{-kx} & ; x \geq 0 \end{cases}$$

از پیوستگی $\psi(x)$ در $x = 0$ داریم:

$$A \sinh(ka) = B$$

از گسستگی مشتق تابع موج در $x = 0$ داریم:

$$\left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=0^+} - \left. \frac{d\psi}{dx} \right|_{x=0^-} = \frac{-2mV_0}{\hbar^2} \psi(0)$$

$$-kB - Ak \cosh(ka) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} B = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} A \sinh(ka)$$

یا:

$$-kA \sinh(ka) - Ak \cosh(ka) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} a \sinh(ka)$$

یا:

$$\cot h(ka) = \frac{2mV}{\hbar^2 k} - 1$$


با تعریف $\gamma = ka$ داریم:

$$\gamma \cot h\gamma = \frac{2mVa}{\hbar^2} - \gamma$$

ویژه مقادیر انرژی از تقاطع منحنی‌های $h(\gamma) = \gamma \cot h\gamma$ و $u(\gamma) = \frac{2mVa}{\hbar^2} - \gamma$ به دست می‌آید.

همانطوری که در شکل نشان داده شده است اگر $a < \frac{2mV}{\hbar^2}$ هیچ حالت مقیدی وجود نخواهد داشت.

چون دو منحنی $h(\gamma)$ و $u(\gamma)$ هیچ نقطه‌ی مشترکی ندارند. اما اگر $a > \frac{2mV}{\hbar^2}$ ، منحنی‌ها فقط یک بار همدیگر را قطع می‌کنند و بنابراین یک حالت مقید وجود خواهد داشت.



تمرین ۴-۳۰

سیستمی متشکل از دو نوسانگر هماهنگ یکسان (با یک بسامد زاویه‌ای ω) را در نظر بگیرید.

(آ) ترازهای انرژی را در حالتی که نوسانگرها مستقل از هم (غیربرهم‌کنشی) هستند پیدا کنید.

(ب) ترازهای انرژی را در حالتی که نوسانگرها به وسیله‌ی یک برهم‌کنش $-\lambda \hat{X}_1 \hat{X}_2$ جفت شده‌اند بیابید که در آن λ یک ثابت است.

(پ) فرض کنید که $\lambda \ll m\omega^2$ (حد جفت‌شدگی ضعیف)، آنگاه یک عبارت تقریبی از مرتبه‌ی اول $\lambda/m\omega^2$ برای انرژی به دست آمده در قسمت ب بیابید.

حل:

(آ)

هامیلتونی سیستم به شکل زیر است:

$$H = H_1 + H_2 = \frac{\hat{P}_1^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}_1^2 + \frac{\hat{P}_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{X}_2^2 - \lambda \hat{X}_1 \hat{X}_2$$

پس انرژی سیستم عبارتست از:

$$E_{n_1, n_2} = \hbar \omega \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) + \hbar \omega \left(n_2 + \frac{1}{2} \right) = \hbar \omega (n_1 + n_2 + 1)$$

که در رابطه‌ی فوق n_1 و n_2 اعداد صحیح نامنفی هستند.

(ب)

در این حالت، هامیلتونی سیستم به صورت زیر است:

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{X}_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{X}_2^2 - \lambda \hat{X}_1 \hat{X}_2$$

با تعریف:

$$X = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}$$

داریم:

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial x}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial}{\partial y} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial x}{\partial x_1} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial x}{\partial x_1} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial x}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial}{\partial y} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial x}{\partial x_2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial x}{\partial x_2} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{+1}{\sqrt{2}} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \Rightarrow$$

$$\hat{x}^2 + \hat{y}^2 = \frac{\hat{X}_1^2 + \hat{X}_2^2 + 2\hat{X}_1\hat{X}_2}{2} + \frac{\hat{X}_1^2 + \hat{X}_2^2 - 2\hat{X}_1\hat{X}_2}{2} = \hat{X}_1^2 + \hat{X}_2^2$$

$$\hat{X}_1 \hat{X}_r = \frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{x} - \hat{y}}{\sqrt{2}} = \frac{\hat{x}^2 - \hat{y}^2}{2}$$

پس:

$$\begin{aligned} H &= \frac{-\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (\hat{x}^2 + \hat{y}^2) - \frac{\lambda}{2} (\hat{x}^2 - \hat{y}^2) \\ &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \left(w^2 - \frac{\lambda}{m} \right) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \left(w^2 + \frac{\lambda}{m} \right) \end{aligned}$$

در نتیجه انرژی سیستم عبارتست از:

$$E = \hbar \sqrt{w^2 - \frac{\lambda}{m}} \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) + \hbar \sqrt{w^2 + \frac{\lambda}{m}} \left(n_r + \frac{1}{2} \right)$$

که در این رابطه، n_r و n_1 اعداد صحیح نامنفی هستند.

(پ)

به ازای مقادیر کوچک x داریم:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x$$

پس به ازای $\frac{\lambda}{m\omega^2} \ll 1$ خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} E &= \hbar \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) \omega \sqrt{1 - \frac{\lambda}{m\omega^2}} + \hbar \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \omega \sqrt{1 + \frac{\lambda}{m\omega^2}} \\ &\simeq \hbar \left(n_1 + \frac{1}{2} \right) \omega \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m\omega^2} \right) + \hbar \left(n_r + \frac{1}{2} \right) \omega \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m\omega^2} \right) \\ &= \hbar \omega \left(n_1 + n_r + \frac{\lambda}{2m\omega^2} (n_r - n_1) + 1 \right) \end{aligned}$$

تمرین ۴-۳۱

ذره‌ای در ابتدا در حالت پایه‌ی خود درون یک جعبه‌ی پتانسیل یک بعدی بی‌نهایت با دیواره‌هایی در $x=0$ و $x=a$ قرار دارد. اگر دیواره‌ی $x=a$ ناگهان به $x=3a$ منتقل شود، احتمال یافتن ذره را در موارد زیر محاسبه کنید:

(آ) حالت پایه‌ی جعبه‌ی جدید

(ب) نخستین حالت برانگیخته‌ی جعبه‌ی جدید

(پ) احتمال یافتن ذره در نخستین حالت برانگیخته‌ی جعبه‌ی جدید، با فرض این که ذره ابتدا در اولین

حالت برانگیخته‌ی جعبه‌ی قدیم باشد.

حل:

(آ)

حالت پایه‌ی جعبه‌ی قدیمی عبارتست از:

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

اما حالت پایه‌ی جعبه‌ی جدید عبارتست از:

$$\phi(x) = \sqrt{\frac{2}{ra}} \sin\left(\frac{\pi x}{ra}\right)$$

اگر تعریف کنیم:

$$C_1 = \int_0^a \phi_1^*(x) \psi_1(x) dx$$

احتمال مطلوب عبارتست از:

$$P_1 = |C_1|^2$$

حال به یافتن C_1 می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} C_1 &= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{ra}} \left(\sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi x}{ra} \right) dx = \frac{1}{a\sqrt{r}} \int_0^a \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{ra}\right) - \cos\left(\frac{4\pi x}{ra}\right) \right] dx \\ &= \frac{1}{a\sqrt{r}} \left\{ \frac{ra}{2\pi} \left[\sin\left(\frac{2\pi x}{ra}\right) \right]_0^a - \frac{ra}{4\pi} \left[\sin\left(\frac{4\pi x}{ra}\right) \right]_0^a \right\} = \frac{1}{a\sqrt{r}} \left[\frac{ra}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{r} - \frac{ra}{4\pi} \sin \frac{4\pi}{r} \right] \\ &= \frac{1}{a\sqrt{r}} \left(\frac{ra}{2\pi} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{ra}{4\pi} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{6+3}{8\pi} = \frac{9}{8\pi} \end{aligned}$$

$$P_1 = \left(\frac{9}{8\pi} \right)^2 = \frac{81}{64\pi^2}$$

(ب)

در اینجا داریم:

$$P_r = |C_r|^2$$

به‌طوری‌که:

$$C_r = \int_0^a \phi_r^*(x) \psi_1(x) dx = \int_0^a \sqrt{\frac{2}{ra}} \sin\left(\frac{r\pi x}{ra}\right) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{a\sqrt{r}} \int_0^a \left[\cos\left(\frac{\pi x}{ra}\right) - \cos\left(\frac{5\pi x}{ra}\right) \right] dx$$

$$= \frac{1}{a\sqrt{2}} \left\{ \frac{2a}{\pi} \left[\sin \left(\frac{\pi x}{2a} \right) \right]^2 - \frac{2a}{\Delta\pi} \left[\sin \left(\frac{\Delta\pi x}{2a} \right) \right]^2 \right\} = \frac{1}{a\sqrt{2}} \left(\frac{2a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi}{2} - \frac{2a}{\Delta\pi} \sin^2 \frac{\Delta\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{a\sqrt{2}} \left(\frac{2a}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2a}{\Delta\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{2a}{a\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2\pi} \left(1 + \frac{1}{\Delta} \right) = \frac{2}{2\pi\Delta} = \frac{1}{\Delta\pi}$$

پس:

$$P_r = \frac{\lambda_1}{2\Delta\pi^2}$$

(پ)

در اینجا داریم:

$$P_r = |C_r|^2$$

به طوری که:

$$C_r = \int_0^a \phi_r^*(x) \psi_r(x) dx = \int_0^a \sqrt{\frac{2}{2a}} \sin \left(\frac{r\pi x}{2a} \right) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left(\frac{r\pi x}{a} \right) dx$$

$$= \frac{1}{a\sqrt{2}} \int_0^a \left[\cos \left(\frac{4\pi x}{2a} \right) - \cos \left(\frac{\lambda\pi x}{2a} \right) \right] dx = \frac{1}{a\sqrt{2}} \left[\frac{2a}{4\pi} \sin \left(\frac{4\pi x}{2a} \right) - \frac{2a}{\lambda\pi} \sin \left(\frac{\lambda\pi x}{2a} \right) \right]_0^a$$

$$= \frac{1}{a\sqrt{2}} \left(\frac{2a}{4\pi} \frac{-\sqrt{2}}{2} - \frac{2a}{\lambda\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{a\sqrt{2}} \frac{-9a\sqrt{2}}{16\pi} = \frac{-9}{16\pi}$$

$$P_r = \left(\frac{-9}{16\pi} \right)^2 = \frac{\lambda_1}{256\pi^2}$$

تمرین ۴-۳۲

ذره‌ای در ابتدا در حالت پایه‌ی خود و در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بعدی $\hat{V}(x) = \frac{1}{2}k\hat{x}^2$ قرار دارد. اگر ثابت فنر ناگهان دو برابر شود، احتمال یافتن ذره را در حالت پایه‌ی پتانسیل جدید محاسبه کنید.

حل:

با توجه به اینکه در نوسانگر هارمونیک $w = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ، بنابراین اگر k دو برابر شود مقدار w ، $\sqrt{2}$ برابر خواهد شد. اگر حالت پایه‌ی قدیم را با $\psi_r(x)$ و حالت پایه‌ی جدید را با $\phi_r(x)$ نشان دهیم، داریم:

$$\psi_+(x) = \left(\frac{mw}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(\frac{-mw x^2}{2\hbar}\right), \quad \phi_+(x) = \left(\frac{mw\sqrt{2}}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(\frac{-mw\sqrt{2} x^2}{2\hbar}\right)$$

اگر تعریف کنیم:

$$C_+ = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_+^*(x) \psi_+(x) dx$$

در این صورت احتمال مطلوب برابر است با:

$$P_+ = |C_+|^2$$

حال C_+ را می‌یابیم:

$$\begin{aligned} C_+ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{mw}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2}} \exp\left[\frac{-mw(1+\sqrt{2})x^2}{2\hbar}\right] dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{mw}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{2\hbar\pi}{mw(1+\sqrt{2})}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{2}{1+\sqrt{2}}\right)^{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

پس:

$$P_+ = \frac{2 \times 2^{\frac{1}{4}}}{1+\sqrt{2}} = 2^{\frac{1}{4}}(\sqrt{2}-1) \approx 0.96$$

تمرین ۴-۳۳

الکترونی را در چاه پتانسیل بی‌نهایت

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ +\infty & \text{هر جای دیگر} \end{cases}$$

قرار دارد که در آن $a = 10^{-10} \text{ m}$

(آ) ترازهای انرژی پایین‌ترین سه حالت، را (برحسب eV) و طول موج‌های متناظر با الکترون را محاسبه کنید.

(ب) بسامد تابشی را که سبب می‌شود الکترون از تراز انرژی پایه به سومین تراز انرژی برانگیخته بجهد، محاسبه کنید.

(پ) هنگامی که الکترون به تراز پایه‌ی خود برمی‌گردد، بسامدهای فوتون‌های گسیل شده چه مقدار هستند؟

(ت) چگالی‌های احتمال را برای این سه حالت مشخص و آن‌ها را رسم کنید.

حل:

(آ)

برای ذره در جعبه‌ی انرژی E_n ، ویژه توابع ϕ_n و طول موج λ_n از روابط زیر به دست می‌آیند:

$$\phi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad \lambda_n = \frac{2a}{n}$$

پس:

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2 c^2}{2mc^2 a^2} = \frac{10 \times (197/327 \text{ eV} \cdot \text{nm})^2}{2 \times 0.511 \times 10^6 \text{ eV} \times (10^{-1} \text{ nm})^2} \simeq 28/1 \text{ eV}$$

$$E_r = 4E_1 = 152/1 \text{ eV}, \quad E_r = 9E_1 = 242/1 \text{ eV}$$

$$\lambda_1 = 2a = 2 \times 10^{-10} \text{ m} = 2 \text{ \AA}, \quad \lambda_r = \frac{\lambda_1}{2} = 1 \text{ \AA}, \quad \lambda_r = \frac{\lambda_1}{3} = \frac{2}{3} \text{ \AA}$$

(ب)

فرکانس مطلوب از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$w = \frac{E_r - E_1}{\hbar}$$

پس:

$$w = \frac{16E_1 - E_1}{\hbar} = \frac{15E_1}{\hbar} = \frac{15 \times 28/1 \text{ eV}}{197/327 \text{ eV} \cdot \text{nm}} = \frac{15 \times 28/1 \times 10^9 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{197/327 \times 10^{-9} \text{ m}} \simeq 8/7 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(پ)

فرکانس فوتون گسیل شده از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$w_{n-1} = \frac{E_n - E_1}{\hbar} = \frac{(n^2 - 1)E_1}{\hbar} = 5/8 (n^2 - 1) \times 10^{14} \text{ Hz}$$


(ت)

چگالی احتمال برای هر تابع موج اختیاری $\psi(x)$ برابر است با:

$$P = |\psi(x)|^2 \Rightarrow P_1 = |\psi_1(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$P_r = |\psi_r(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{r\pi x}{a}\right)$$

$$P_r = |\psi_r(x)|^2 = \frac{\gamma}{a} \sin^2 \left(\frac{\gamma \pi x}{a} \right)$$



تمرین ۴-۳۴

الکترونی را در نظر بگیرید که محدود به حرکت در یک چاه مربعی نامتناهی با پهنای $a = 10^{-10} \text{ m}$ است.


(آ) مقادیر دقیق انرژی را برای پایین‌ترین یازده حالت (برحسب eV) بیابید.

(ب) معادله‌ی شرودینگر را به صورت عددی حل کنید و انرژی‌های پایین‌ترین یازده حالت را بیابید و آن‌ها را با نتایج دقیق به دست آمده در قسمت (آ) مقایسه کنید. توابع موج پایین‌ترین پنج حالت را رسم کنید.

حل:

(آ)

(ب)



فصل پنجم

اندازه حرکت زاویه‌ای

تمرین ۵-۱

(آ) روابط جابه‌جایی زیر را ثابت کنید.

$$[\hat{Y}, \hat{L}_y] = 0, \quad [\hat{Y}, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{X}, \quad [\hat{Y}, \hat{L}_x] = -i\hbar \hat{Z}$$

$$[\hat{Z}, \hat{L}_z] = 0, \quad [\hat{Z}, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{Y}, \quad [\hat{Z}, \hat{L}_y] = -i\hbar \hat{X}$$

(ب) با استفاده از جایگشت دوری xyz نتیجه‌های (آ) را برای نتیجه‌گیری عبارت‌هایی برای

$$[\hat{X}, \hat{L}_x], [\hat{X}, \hat{L}_y], [\hat{X}, \hat{L}_z] \text{ به کار ببرید.}$$

(پ) نتایج (آ) و (ب) را برای محاسبه‌ی $[\hat{R}^2, \hat{L}_x], [\hat{R}^2, \hat{L}_y], [\hat{R}^2, \hat{L}_z]$ به کار ببرید، که در آن

$$\hat{R}^2 = \hat{X}^2 + \hat{Y}^2 + \hat{Z}^2$$

حل:

مستقیماً به سراغ محاسبات می‌رویم:

(آ)

$$\begin{aligned} [\hat{Y}, \hat{L}_y] &= [\hat{Y}, \hat{Z}\hat{P}_x - \hat{X}\hat{P}_z] = [\hat{Y}, \hat{Z}\hat{P}_x] - [\hat{Y}, \hat{X}\hat{P}_z] \\ &= [\hat{Y}, \hat{Z}]\hat{P}_x + \hat{Z}[\hat{Y}, \hat{P}_x] - [\hat{Y}, \hat{X}]\hat{P}_z - \hat{X}[\hat{Y}, \hat{P}_z] = 0. \end{aligned}$$

به‌همین ترتیب:

$$[\hat{Z}, \hat{L}_z] = 0$$

$$\begin{aligned}
 [\hat{Y}, \hat{L}_z] &= [\hat{Y}, \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x] = [\hat{Y}, \hat{X}\hat{P}_y] - [\hat{Y}, \hat{Y}\hat{P}_x] \\
 &= [\hat{Y}, \hat{X}]\hat{P}_y + \hat{X}[\hat{Y}, \hat{P}_y] - [\hat{Y}, \hat{Y}]\hat{P}_x - \hat{Y}[\hat{Y}, \hat{P}_x] = \hat{X}[\hat{Y}, \hat{P}_y] = i\hbar\hat{X}
 \end{aligned}$$

به همین ترتیب:

$$\begin{aligned}
 [\hat{Z}, \hat{L}_x] &= i\hbar\hat{Y} \\
 [\hat{Y}, \hat{L}_x] &= [\hat{Y}, \hat{Y}\hat{P}_z - \hat{Z}\hat{P}_y] = [\hat{Y}, \hat{Y}\hat{P}_z] - [\hat{Y}, \hat{Z}\hat{P}_y] \\
 &= [\hat{Y}, \hat{Y}]\hat{P}_z + \hat{Y}[\hat{Y}, \hat{P}_z] - [\hat{Y}, \hat{Z}]\hat{P}_y - \hat{Z}[\hat{Y}, \hat{P}_y] = -\hat{Z}[\hat{Y}, \hat{P}_y] = -i\hbar\hat{Z}
 \end{aligned}$$

به همین ترتیب:

$$[\hat{Z}, \hat{L}_y] = -i\hbar\hat{X}$$

(ب)

$$[\hat{X}, \hat{L}_x] = 0$$

$$[\hat{X}, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{Z}$$

$$[\hat{X}, \hat{L}_z] = -i\hbar\hat{Y}$$

(ب)

$$\begin{aligned}
 [\hat{R}^r, \hat{L}_x] &= [\hat{X}^r + \hat{Y}^r + \hat{Z}^r, \hat{L}_x] = [\hat{X}^r, \hat{L}_x] + [\hat{Y}^r, \hat{L}_x] + [\hat{Z}^r, \hat{L}_x] \\
 &= [\hat{Y}^r, \hat{L}_x] + [\hat{Z}^r, \hat{L}_x] = \hat{Y}[\hat{Y}, \hat{L}_x] + [\hat{Y}, \hat{L}_x]\hat{Y} + \hat{Z}[\hat{Z}, \hat{L}_x] + [\hat{Z}, \hat{L}_x]\hat{Z} \\
 &= \hat{Y}(-i\hbar\hat{Z}) + (-i\hbar\hat{Z})\hat{Y} + \hat{Z}(i\hbar\hat{Y}) + (i\hbar\hat{Y})\hat{Z} = 0
 \end{aligned}$$

و به همین ترتیب:

$$[\hat{R}^r, \hat{L}_y] = [\hat{R}^r, \hat{L}_z] = 0$$

تمرین ۲-۵

(آ) روابط جابه‌جایی زیر را ثابت کنید.

$$[\hat{P}_y, \hat{L}_y] = 0, \quad [\hat{P}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{P}_x, \quad [\hat{P}_y, \hat{L}_x] = -i\hbar\hat{P}_z$$

$$[\hat{P}_z, \hat{L}_z] = 0, \quad [\hat{P}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{P}_y, \quad [\hat{P}_z, \hat{L}_y] = -i\hbar\hat{P}_x$$

(ب) نتایج (آ) را برای $[\hat{P}_x, \hat{L}_x]$ ، $[\hat{P}_x, \hat{L}_y]$ و $[\hat{P}_x, \hat{L}_z]$ با استفاده از یک جایگشت دوری به کار ببرید.

(پ) نتایج (آ) و (ب) را برای محاسبه $[\hat{P}^2, \hat{L}_x]$ ، $[\hat{P}^2, \hat{L}_y]$ و $[\hat{P}^2, \hat{L}_z]$ به کار ببرید که در آن $\hat{P}^2 = \hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_z^2$.

حل: مستقیماً به سراغ محاسبات می‌رویم:

(i)

$$\begin{aligned} [\hat{P}_y, \hat{L}_y] &= [\hat{P}_y, \hat{Z}\hat{P}_x - \hat{X}\hat{P}_z] = [\hat{P}_y, \hat{Z}\hat{P}_x] - [\hat{P}_y, \hat{X}\hat{P}_z] \\ &= [\hat{P}_y, \hat{Z}]\hat{P}_x + \hat{Z}[\hat{P}_y, \hat{P}_x] - [\hat{P}_y, \hat{X}]\hat{P}_z - \hat{X}[\hat{P}_y, \hat{P}_z] = 0 \end{aligned}$$

و به همین ترتیب:

$$\begin{aligned} [\hat{P}_z, \hat{L}_z] &= i\hbar\hat{P}_y \\ [\hat{P}_y, \hat{L}_z] &= [\hat{P}_y, \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x] = [\hat{P}_y, \hat{X}\hat{P}_y] - [\hat{P}_y, \hat{Y}\hat{P}_x] \\ &= [\hat{P}_y, \hat{X}]\hat{P}_y + \hat{X}[\hat{P}_y, \hat{P}_y] - [\hat{P}_y, \hat{Y}]\hat{P}_x - \hat{Y}[\hat{P}_y, \hat{P}_x] = -[\hat{P}_y, \hat{Y}]\hat{P}_x = +i\hbar\hat{P}_x \end{aligned}$$

و به همین ترتیب:

$$\begin{aligned} [\hat{P}_z, \hat{L}_x] &= 0 \\ [\hat{P}_y, \hat{L}_x] &= [\hat{P}_y, \hat{Y}\hat{P}_z - \hat{Z}\hat{P}_y] = [\hat{P}_y, \hat{Y}\hat{P}_z] - [\hat{P}_y, \hat{Z}\hat{P}_y] \\ &= [\hat{P}_y, \hat{Y}]\hat{P}_z + \hat{Y}[\hat{P}_y, \hat{P}_z] - [\hat{P}_y, \hat{Z}]\hat{P}_y - \hat{Z}[\hat{P}_y, \hat{P}_y] = [\hat{P}_y, \hat{Y}]\hat{P}_z = -i\hbar\hat{P}_z \end{aligned}$$

و به همین ترتیب:

$$[\hat{P}_z, \hat{L}_y] = -i\hbar\hat{P}_x \quad (\text{ب})$$

$$\begin{aligned} [\hat{P}_x, \hat{L}_x] &= 0 \\ [\hat{P}_x, \hat{L}_y] &= i\hbar\hat{P}_z \\ [\hat{P}_x, \hat{L}_z] &= -i\hbar\hat{P}_y \end{aligned} \quad (\text{پ})$$

$$\begin{aligned} [\hat{P}^2, \hat{L}_x] &= [\hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2 + \hat{P}_z^2, \hat{L}_x] = [\hat{P}_x^2, \hat{L}_x] + [\hat{P}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{P}_z^2, \hat{L}_x] \\ &= \hat{P}_y [\hat{P}_y, \hat{L}_x] + [\hat{P}_y, \hat{L}_x] \hat{P}_y + \hat{P}_z [\hat{P}_z, \hat{L}_x] + [\hat{P}_z, \hat{L}_x] \hat{P}_z \\ &= \hat{P}_y (-i\hbar\hat{P}_z) + (-i\hbar\hat{P}_z) \hat{P}_y + \hat{P}_z (i\hbar\hat{P}_y) + (i\hbar\hat{P}_y) \hat{P}_z = 0 \end{aligned}$$

و به همین ترتیب:

$$[\hat{p}_x, \hat{L}_y] = [\hat{p}_x, \hat{L}_z] = 0$$

تمرین ۳-۵

اگر $\hat{L}_\pm$ و $\hat{R}_\pm$ به وسیله $\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$ و $\hat{R}_\pm = \hat{X} \pm i\hat{Y}$ تعریف شوند، جابه‌جاگرهای زیر را اثبات کنید:

$$[\hat{L}_\pm, \hat{R}_\pm] = \pm 2\hbar \hat{Z} \quad (\text{آ})$$

$$[\hat{L}_\pm, \hat{R}_\mp] = 0 \quad (\text{ب})$$

حل:

با استفاده از نتایج تمرین ۱-۵ داریم:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_\pm, \hat{R}_\pm] &= [\hat{L}_x \pm i\hat{L}_y, \hat{X} \pm i\hat{Y}] = [\hat{L}_x, \hat{X}] \pm i[\hat{L}_x, \hat{Y}] \pm i[\hat{L}_y, \hat{X}] - [\hat{L}_y, \hat{Y}] \\ &= \pm i[\hat{L}_x, \hat{Y}] \pm i[\hat{L}_y, \hat{X}] = \pm i(i\hbar \hat{Z} - i\hbar \hat{Z}) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\hat{L}_\pm, \hat{R}_\mp] &= [\hat{L}_x \pm i\hat{L}_y, \hat{X} \mp i\hat{Y}] = \mp i[\hat{L}_x, \hat{Y}] \pm i[\hat{L}_y, \hat{X}] = \mp i(i\hbar \hat{Z}) \pm i(-i\hbar \hat{Z}) \\ &= \pm \hbar \hat{Z} \pm \hbar \hat{Z} = \pm 2\hbar \hat{Z} \end{aligned}$$

تمرین ۴-۵

اگر $\hat{L}_\pm$ و $\hat{R}_\pm$ به وسیله $\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$ و $\hat{R}_\pm = \hat{X} \pm i\hat{Y}$ تعریف شوند، جابه‌جاگرهای زیر را اثبات کنید:

$$[\hat{L}_\pm, \hat{Z}] = \mp \hbar \hat{R}_\pm \quad (\text{آ})$$

$$[\hat{L}_z, \hat{R}_\pm] = \pm \hbar \hat{R}_\pm \quad (\text{ب})$$

$$[\hat{L}_z, \hat{Z}] = 0 \quad (\text{پ})$$

حل:

با استفاده از نتایج تمرین ۱-۵ داریم:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_\pm, \hat{Z}] &= [\hat{L}_x \pm i\hat{L}_y, \hat{Z}] = [\hat{L}_x, \hat{Z}] \pm i[\hat{L}_y, \hat{Z}] \\ &= -i\hbar \hat{Y} \pm i(i\hbar \hat{X}) = \mp \hbar (\hat{X} \pm i\hat{Y}) = \mp \hbar \hat{R}_\pm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\hat{L}_z, \hat{R}_\pm] &= [\hat{L}_z, \hat{X} \pm i\hat{Y}] = [\hat{L}_z, \hat{X}] \pm i[\hat{L}_z, \hat{Y}] \\ &= i\hbar \hat{Y} \pm i(-i\hbar \hat{X}) = \pm \hbar (\hat{X} \pm i\hat{Y}) = \pm \hbar \hat{R}_\pm \end{aligned}$$

$$[\hat{L}_z, \hat{Z}] = [\hat{X}\hat{p}_y - \hat{Y}\hat{p}_x, \hat{Z}]$$

تمرین ۵-۵

دو رابطه‌ی مقابل را اثبات کنید: $\hat{R} \cdot \hat{L} = 0$ و $\hat{P} \cdot \hat{L} = 0$.

حل:

$$\begin{aligned}\hat{R} \cdot \hat{L} &= \hat{X} \hat{L}_x + \hat{Y} \hat{L}_y + \hat{Z} \hat{L}_z = \hat{X} (\hat{Y} \hat{P}_z - \hat{Z} \hat{P}_y) + \hat{Y} (\hat{Z} \hat{P}_x - \hat{X} \hat{P}_z) + \hat{Z} (\hat{X} \hat{P}_y - \hat{Y} \hat{P}_x) \\ &= (\hat{X} \hat{Y} - \hat{Y} \hat{X}) \hat{P}_z + (\hat{Z} \hat{X} - \hat{X} \hat{Z}) \hat{P}_y + (\hat{Y} \hat{Z} - \hat{Z} \hat{Y}) \hat{P}_x \\ &= [\hat{X}, \hat{Y}] \hat{P}_z + [\hat{Z}, \hat{X}] \hat{P}_y + [\hat{Y}, \hat{Z}] \hat{P}_x = 0 \\ \hat{P} \cdot \hat{L} &= \hat{P}_x \hat{L}_x + \hat{P}_y \hat{L}_y + \hat{P}_z \hat{L}_z = \hat{P}_x (\hat{Y} \hat{P}_z - \hat{Z} \hat{P}_y) + \hat{P}_y (\hat{Z} \hat{P}_x - \hat{X} \hat{P}_z) + \hat{P}_z (\hat{X} \hat{P}_y - \hat{Y} \hat{P}_x) \\ &= \hat{P}_x \hat{Y} \hat{P}_z - \hat{P}_x \hat{Z} \hat{P}_y + \hat{P}_y \hat{Z} \hat{P}_x - \hat{P}_y \hat{X} \hat{P}_z + \hat{P}_z \hat{X} \hat{P}_y - \hat{P}_z \hat{Y} \hat{P}_x = 0\end{aligned}$$

تمرین ۶-۵

هامیلتونی ناشی از برهم‌کنش ذره‌ای با اسپین $\vec{S}$ با یک میدان مغناطیسی با $\hat{H} = -\hat{S} \cdot \vec{B}$ داده می‌شود که در آن $\vec{S}$ اسپین است. جابه‌جاگر $[\vec{S}, \hat{H}]$ را محاسبه کنید.

حل:

ابتدا $[\hat{S}_x, \hat{H}]$ را حساب می‌کنیم:

$$\begin{aligned}[\hat{S}_x, \hat{H}] &= -[\hat{S}_x, \hat{S} \cdot \vec{B}] = -[\hat{S}_x, \hat{S}_x B_x + \hat{S}_y B_y + \hat{S}_z B_z] \\ &= -[\hat{S}_x, \hat{S}_x B_x] - [\hat{S}_x, \hat{S}_y B_y] - [\hat{S}_x, \hat{S}_z B_z] \\ &= -[\hat{S}_x, \hat{S}_x] B_x - \hat{S}_x [\hat{S}_x, B_x] - [\hat{S}_x, \hat{S}_y] B_y - \hat{S}_y [\hat{S}_x, B_y] - [\hat{S}_x, \hat{S}_z] B_z - \hat{S}_z [\hat{S}_x, B_z] \\ &\text{چون } \vec{B} \text{ در حالت کلی تابعی از } x, y, z \text{ و } t \text{ است، لذا:}\end{aligned}$$

$$[\hat{S}_x, B_x] = [\hat{S}_x, B_y] = [\hat{S}_x, B_z] = 0$$

پس:

$$[\hat{S}_x, \hat{H}] = -[\hat{S}_x, \hat{S}_y] B_y - [\hat{S}_x, \hat{S}_z] B_z = -i\hbar \hat{S}_z B_y + i\hbar \hat{S}_y B_z = i\hbar (\hat{S}_y B_z - \hat{S}_z B_y) = i\hbar (\hat{S} \times \vec{B})_x$$

به همین ترتیب داریم:

$$[\hat{S}_y, \hat{H}] = i\hbar (\hat{S} \times \vec{B})_y$$

$$[\hat{S}_z, \hat{H}] = i\hbar (\hat{S} \times \vec{B})_z$$

$$[\hat{\vec{S}}, \hat{H}] = i\hbar \hat{\vec{S}} \times \vec{B}$$

پس:

تمرین ۵-۷

رابطه‌ی زیر را ثابت کنید:

$$[\hat{L}_z, \cos \phi] = i\hbar \sin \phi$$

که در آن ϕ زاویه‌ی سمتی است.

حل:

برای محاسبه $[\hat{L}_z, \cos \phi]$ ، اثر آن را روی تابع موج خوشرفتار $\psi(r, \theta, \phi)$ به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_z, \cos \phi] \psi(r, \theta, \phi) &= \hat{L}_z (\cos \phi \psi(r, \theta, \phi)) - \cos \phi (\hat{L}_z \psi(r, \theta, \phi)) \\ &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\cos \phi \psi(r, \theta, \phi) - \cos \phi \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi(r, \theta, \phi)}{\partial \phi} \right) \\ &= \frac{\hbar}{i} \left[-\sin \phi \psi(r, \theta, \phi) + \cos \phi \frac{\partial \psi(r, \theta, \phi)}{\partial \phi} - \cos \phi \frac{\partial \psi(r, \theta, \phi)}{\partial \phi} \right] \\ &= \frac{-\hbar}{i} \sin \phi \psi(r, \theta, \phi) \end{aligned}$$

پس:

$$\{[\hat{L}_z, \cos \phi] - i\hbar \sin \phi\} \psi(r, \theta, \phi) = 0$$

چون $\psi(r, \theta, \phi)$ کاملاً دلخواه است، پس:

$$[\hat{L}_z, \cos \phi] - i\hbar \sin \phi = 0$$

یا:

$$[\hat{L}_z, \cos \phi] = i\hbar \sin \phi$$

تمرین ۵-۸

رابطه‌ی زیر را ثابت کنید:

$$[\hat{L}_z, \sin(r\phi)] = r i \hbar (\sin^r \phi - \cos^r \phi)$$

که در آن ϕ زاویه‌ی سمتی است. (راهنمایی: $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$)

حل:

مانند تمرین قبل عمل می‌کنیم:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_z, \sin(r\phi)] \psi(r, \theta, \phi) &= \hat{L}_z (\sin(r\phi) \psi(r, \theta, \phi)) - \sin(r\phi) (\hat{L}_z \psi(r, \theta, \phi)) \\ &= \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi} [\sin(r\phi) \psi(r, \theta, \phi)] - \sin(r\phi) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial \psi(r, \theta, \phi)}{\partial \phi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\hbar}{i} \left[r \cos(r\phi) \psi(r, \theta, \phi) + \sin(r\phi) \frac{\partial \psi(r, \theta, \phi)}{\partial \phi} - \sin(r\phi) \frac{\partial \psi(r, \theta, \phi)}{\partial \phi} \right] \\
&= -r i \hbar \cos(r\phi) \psi(r, \theta, \phi) = r i \hbar (\sin^r \phi - \cos^r \phi) \psi(r, \theta, \phi)
\end{aligned}$$

پس:

$$[\hat{L}_z, \sin(r\phi)] = r i \hbar (\sin^r \phi - \cos^r \phi)$$

تمرین ۹-۵

با استفاده از ویژگی‌های $\hat{J}_+$ و $\hat{J}_-$ ، $|j, \pm j\rangle$ و $|j, \pm m\rangle$ را به صورت تابعی از اثر $\hat{J}_\pm$ به ترتیب روی حالت‌های $|j, \pm m\rangle$ و $|j, \pm j\rangle$ محاسبه کنید.

حل:

می‌دانیم:

$$J_+ |j, m\rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle = \hbar \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+1)!}{(j-m-1)!(j+m)!}} |j, m+1\rangle$$

پس:

$$\begin{aligned}
J_+^r |j, m\rangle &= \hbar \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+1)!}{(j-m-1)!(j+m)!}} \hbar \sqrt{\frac{(j-m-1)!(j+m+2)!}{(j-m-2)!(j+m+1)!}} |j, m+2\rangle \\
&= \hbar^r \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+2)!}{(j+m)!(j-m-2)!}} |j, m+2\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
J_+^r |j, m\rangle &= \hbar^r \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+2)!}{(j+m)!(j-m-2)!} \frac{(j-m-2)!(j+m+3)!}{(j-m-3)!(j+m+2)!}} |j, m+3\rangle \\
&= \hbar^r \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+3)!}{(j+m)!(j-m-3)!}} |j, m+3\rangle
\end{aligned}$$

$$J_+^N |j, m\rangle = \hbar^N \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+N)!}{(j+m)!(j-m-N)!}} |j, m+N\rangle \quad *$$

$$J_+^{j-m} |j, m\rangle = \hbar^{j-m} \sqrt{\frac{(j-m)!(j+m+j-m)!}{(j+m)!(j-m-j+m)!}} |j, m+j-m\rangle$$

$$= \hbar^{j-m} \sqrt{\frac{(j-m)!(2j)!}{(j+m)!}} |j, j\rangle$$

پس:

$$|j, j\rangle = \hbar^{m-j} \sqrt{\frac{(j+m)!}{(2j)!(j-m)!}} J_+^{j-m} |j, m\rangle$$

از طرفی می دانیم که:

$$J_- |j, m\rangle = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle = \hbar \sqrt{\frac{(j+m)!(j-m+1)!}{(j-m)!(j+m-1)!}} |j, m-1\rangle$$

$$J_-^r |j, m\rangle = \hbar^r \sqrt{\frac{(j-m+1)!(j+m)!(j-m+2)!(j+m-1)!}{(j-m)!(j+m-1)!(j-m+1)!(j+m-2)!}} |j, m-r\rangle$$

$$= \hbar^r \sqrt{\frac{(j+m)!(j-m+r)!}{(j-m)!(j+m-r)!}} |j, m-r\rangle$$

$$J_-^r |j, m\rangle = \hbar^r \sqrt{\frac{(j+m)!(j-m+r)!(j+m-r)!(j-m+r)!}{(j-m)!(j+m-r)!(j-m+r)!(j+m-r)!}} |j, m-r\rangle$$

$$= \hbar^r \sqrt{\frac{(j+m)!(j-m+r)!}{(j-m)!(j+m-r)!}} |j, m-r\rangle$$

$$J_-^N |j, m\rangle = \hbar^N \sqrt{\frac{(j+m)!(j-m+N)!}{(j-m)!(j+m-N)!}} |j, m-N\rangle \quad **$$

$$J_-^{j+m} |j, m\rangle = \hbar^{j+m} \sqrt{\frac{(j+m)!(j-m+j+m)!}{(j-m)!(j+m-j-m)!}} |j, m-j-m\rangle$$

$$= \hbar^{j+m} \sqrt{\frac{(2j)!(j+m)!}{(j-m)!}} |j, -j\rangle$$

پس:

$$|j, -j\rangle = \hbar^{-j-m} \sqrt{\frac{(j-m)!}{(rj)!(j+m)!}} J_-^{j+m} |j, m\rangle$$

از رابطه‌ی * داریم:

$$\begin{aligned} J_+^{j\pm m} |j, -j\rangle &= \hbar^{j\pm m} \sqrt{\frac{(j+j)!(j-j+j\pm m)!}{(j-j)!(j+j-j\mp m)!}} |j, -j+j\pm m\rangle \\ &= \hbar^{j\pm m} \sqrt{\frac{(rj)!(j\pm m)!}{(j\mp m)!}} |j, \pm m\rangle \end{aligned}$$

پس:

$$|j, \pm m\rangle = \hbar^{-j\mp m} \sqrt{\frac{(j\mp m)!}{(rj)!(j\pm m)!}} J_+^{j\pm m} |j, -j\rangle$$

از رابطه‌ی ** نیز داریم:

$$J_-^{j\mp m} |j, +j\rangle = \hbar^{j\mp m} \sqrt{\frac{(j+j)!(j-j+j\mp m)!}{(j-j)!(j+j-j\pm m)!}} |j, j-j\pm m\rangle = \hbar^{j\mp m} \sqrt{\frac{(rj)!(j\mp m)!}{(j\pm m)!}} |j, \pm m\rangle$$

پس:

$$|j, \pm m\rangle = \hbar^{-j\pm m} \sqrt{\frac{(j\pm m)!}{(rj)!(j\mp m)!}} J_-^{j\mp m} |j, j\rangle$$

تمرین ۵-۱۰

عملگر $\hat{A} = \frac{1}{r}(\hat{J}_x \hat{J}_y + \hat{J}_y \hat{J}_x)$ را در نظر بگیرید.

(آ) مقدار چشم‌داشتی $\hat{A}$ و $\hat{A}^2$ را برحسب حالت $|j, m\rangle$ محاسبه کنید.

(ب) نتیجه‌ی (آ) را برای یافتن عبارت مربوط به $\hat{A}^2$ برحسب $\hat{J}_x^2, \hat{J}_y^2, \hat{J}_z^2, \hat{J}_+^2$ و $\hat{J}_-^2$ به کار

ببرید.

حل:

(آ)

از تعریف داریم:

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle j, m | \hat{A} | j, m \rangle = \left\langle j, m \left| \frac{1}{r} (\hat{J}_x \hat{J}_y + \hat{J}_y \hat{J}_x) \right| j, m \right\rangle$$

از رابطه‌ی ۵۷-۵ و ۵۸-۵ داریم:

$$\hat{J}_x |j, m\rangle = \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle + \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle \right]$$

$$\hat{J}_y |j, m\rangle = \frac{\hbar}{2i} \left[\sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle - \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle \right]$$

از روابط اول نتیجه می شود که:

$$\langle j, m | \hat{J}_x = \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{(j-m)(j+m+1)} \langle j, m+1 | + \sqrt{(j+m)(j-m+1)} \langle j, m-1 | \right]$$

از دو رابطه ی اخیر نتیجه می شود:

$$\langle j, m | \hat{J}_x \hat{J}_y |j, m\rangle = \frac{\hbar^2}{4i} [(j-m)(j+m+1) - (j+m)(j-m+1)]$$

پس:

$$\langle j, m | \hat{J}_y \hat{J}_x |j, m\rangle = \frac{\hbar^2}{-4i} [(j-m)(j+m+1) - (j+m)(j-m+1)]$$

پس:

$$\langle \hat{A} \rangle = \frac{1}{\gamma} \langle j, m | \hat{J}_x \hat{J}_y + \hat{J}_y \hat{J}_x |j, m\rangle = 0$$

اما:

$$\langle \hat{A}^2 \rangle = \langle j, m | \hat{A}^2 |j, m\rangle$$

$$\begin{aligned} \hat{J}_y \hat{J}_x |j, m\rangle &= \frac{\hbar}{2} \left[\sqrt{(j-m)(j+m+1)} \hat{J}_y |j, m+1\rangle + \sqrt{(j+m)(j-m+1)} \hat{J}_y |j, m-1\rangle \right] \\ &= \frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2i} \left\{ \sqrt{(j-m)(j+m+1)} \left[\sqrt{(j-m-1)(j+m+2)} |j, m+2\rangle \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \sqrt{(j+m+1)(j-m)} |j, m\rangle \right] + \sqrt{(j+m)(j-m+1)} \right. \\ &\quad \left. \times \left[\sqrt{(j-m+1)(j+m)} |j, m\rangle - \sqrt{(j+m-1)(j-m+2)} |j, m-2\rangle \right] \right\} \\ &= \frac{\hbar^2}{4i} \left[\sqrt{(j-m-1)(j-m)(j+m+1)(j+m+2)} |j, m+2\rangle + 2m |j, m\rangle \right. \\ &\quad \left. - \sqrt{(j+m)(j-m+1)(j+m-1)(j-m+2)} |j, m-2\rangle \right] \end{aligned}$$

اما با توجه به $[J_x, J_y] = i\hbar J_z$ داریم:

$$\hat{A} = \frac{\hat{J}_y \hat{J}_x + i\hbar \hat{J}_z + \hat{J}_y \hat{J}_x}{2} = \hat{J}_y \hat{J}_x + \frac{i\hbar}{2} \hat{J}_z$$

$$\hat{A}^2 |j, m\rangle = \frac{\hbar^2}{4i} \left[\sqrt{(j-m-1)(j-m)(j+m+1)(j+m+2)} |j, m+2\rangle \right]$$

$$\begin{aligned}
& -\sqrt{(j+m)(j-m+1)(j+m-1)(j-m+2)}|j, m-2\rangle \\
\langle j, m|\hat{A} = & \frac{\hbar^2}{-4i} \left[\sqrt{(j-m-1)(j-m)(j+m+1)(j+m+2)}\langle j, m+2| \right. \\
& \left. -\sqrt{(j+m)(j-m+1)(j+m-1)(j-m+2)}\langle j, m-2| \right]
\end{aligned}$$

پس:

$$\begin{aligned}
\langle \hat{A}^2 \rangle &= \frac{\hbar^4}{16} [(j-m-1)(j-m)(j+m+1)(j+m+2) + (j+m)(j-m+1)(j+m-1)(j-m+2)] \\
&= \frac{\hbar^4}{16} [(j^2 - 2mj + m^2 - j + m)(j^2 + 2mj + m^2 + 2j + 2m + 2) \\
&\quad + (j^2 + 2mj + m^2 - j - m)(j^2 - 2mj + m^2 + 2j - 2m + 2)] \\
&= \frac{\hbar^4}{16} [j^4 + 2mj^2 + m^2j^2 + 2j^2 + 2mj^2 + 2j^2 - 2mj^2 - 4m^2j^2 - 2m^2j - 6mj^2 - 6m^2j \\
&\quad - 4mj + m^2j^2 + 2m^2j + m^4 + 2m^2j + 2m^2 + 2m^2 - j^2 - 2mj^2 - m^2j - 2j^2 - 2mj \\
&\quad - 2j + mj^2 + 2m^2j + m^2 + 2mj + 2m^2 + 2m + j^2 - 2mj^2 + m^2j^2 + 2j^2 - 2mj^2 + 2j^2 \\
&\quad + 2mj^2 - 4m^2j^2 + 2m^2j + 6mj^2 - 6m^2j + 4mj + m^2j^2 - 2m^2j + m^4 + 2m^2j - 2m^2 \\
&\quad + 2m^2 - j^2 + 2mj^2 - m^2j - 2j^2 + 2mj - 2j - mj^2 + 2m^2j - m^2 - 2mj + 2m^2 - 2m] \\
&= \frac{2\hbar^4}{16} (j^4 + m^2j^2 + 2j^2 + 2j^2 - 4m^2j^2 - 6m^2j + m^2j^2 + m^4 + 2m^2j + 2m^2 - j^2 - m^2j \\
&\quad - 2j^2 - 2j + 2m^2j + 2m^2) = \frac{\hbar^4}{8} (j^4 - 2m^2j^2 + 2j^2 - j^2 - 2m^2j + m^4 + 2m^2 - 2j)
\end{aligned}$$

تمرین ۵-۱۱

تابع موج زیر را در نظر بگیرید:

$$\psi(\theta, \varphi) = r \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi} - r(1 - \cos^2 \theta) e^{2i\varphi}$$

(آ) $\psi(\theta, \varphi)$ را بر حسب هماهنگ‌های کروی بنویسید.

(ب) عبارت به دست آمده در (آ) را بر حسب مختصات دکارتی بنویسید.

(پ) آیا $\psi(\theta, \varphi)$ ویژه حالتی از $\hat{L}^2$ یا $\hat{L}_z$ است؟(ت) احتمال اندازه گیری $2\hbar$ برای مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای مداری را بیابید.

حل:

(آ)

با توجه به اینکه:

$$Y_{r,1}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} e^{i\varphi} \sin \theta \cos \theta, \quad Y_{r,2}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} e^{2i\varphi} \sin^2 \theta$$

پس:

$$\psi(\theta, \varphi) = -r\sqrt{\frac{8\pi}{15}} Y_{r,1}(\theta, \varphi) - r\sqrt{\frac{32\pi}{15}} Y_{r,2}(\theta, \varphi)$$

(ب)

بر حسب مختصات کارترین داریم:

$$\psi(x, y, z) = \frac{r(x + iy)}{x^2 + y^2 + z^2} + \frac{r(x^2 - y^2 \pm 2ixy)}{x^2 + y^2 + z^2}$$

(پ)

اثر $\hat{L}^2$ را بر روی $\psi(\theta, \varphi)$ می‌یابیم:

$$\hat{L}^2 \psi(\theta, \varphi) = -r\sqrt{\frac{8\pi}{15}} \hat{L}^2 Y_{r,1}(\theta, \varphi) - r\sqrt{\frac{32\pi}{15}} \hat{L}^2 Y_{r,2}(\theta, \varphi) = 6\hbar^2 \psi(\theta, \varphi)$$

پس $\psi(\theta, \varphi)$ ویژه حالت $\hat{L}^2$ است با ویژه مقدار $6\hbar^2$.حال اثر $\hat{L}_z$ بر روی $\psi(\theta, \varphi)$ را بررسی می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \hat{L}_z \psi(\theta, \varphi) &= -r\sqrt{\frac{8\pi}{15}} \hat{L}_z Y_{r,1}(\theta, \varphi) - r\sqrt{\frac{32\pi}{15}} \hat{L}_z Y_{r,2}(\theta, \varphi) \\ &= -r\sqrt{\frac{8\pi}{15}} \hbar Y_{r,1}(\theta, \varphi) - r\sqrt{\frac{32\pi}{15}} (2\hbar) Y_{r,2}(\theta, \varphi) \end{aligned}$$

پس $\psi(\theta, \varphi)$ ویژه حالت $\hat{L}_z$ نیست.

(ت)

با توجه به اینکه $\psi(\theta, \varphi)$ بهنجار نیست، پس احتمال مطلوب عبارت است از:

$$P_{m=2} = \frac{\left(-r\sqrt{\frac{32\pi}{15}}\right)^2}{\left(-r\sqrt{\frac{8\pi}{15}}\right)^2 + \left(-r\sqrt{\frac{32\pi}{15}}\right)^2} = \frac{4 \times 32\pi}{15}{9 \times \frac{8\pi}{15} + 4 \times \frac{32\pi}{15}} = 0.64$$

تمرین ۵-۱۲

نشان دهید که $\hat{L}_z (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \sin \varphi \cos \varphi) = 2\hbar e^{2i\varphi}$ ، که در آن φ زاویه‌ی سمتی است.

حل:

$$\hat{L}_z (\cos^r \varphi - \sin^r \varphi + r i \sin \varphi \cos \varphi) = \hat{L}_z (\cos(r\varphi) + i \sin(r\varphi)) = L_z (e^{r i \varphi}) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \varphi} (e^{r i \varphi}) \\ = r \hbar e^{r i \varphi}$$

تمرین ۵-۱۳

عبارت‌هایی برای هماهنگ‌های کروی

$$Y_{r,\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{21}{64\pi}} \sin \theta (\Delta \cos^r \theta - 1) e^{\pm i \varphi} \quad \text{و} \quad Y_{r,0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{7}{16\pi}} (\Delta \cos^r \theta - r \cos \theta) \\ \text{بر حسب مختصات دکارتی } x, y, z \text{ بیابید.}$$

حل:

با توجه به اینکه:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

داریم:

$$Y_{r,0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{7}{16\pi}} \left(\frac{\Delta z^r}{r^r} - \frac{r z}{r} \right) = \sqrt{\frac{7}{16\pi}} \frac{z \Delta z^r - r^2}{r^r} \\ Y_{r,\pm 1}(\theta, \varphi) = \mp \sqrt{\frac{21}{64\pi}} \sin \theta (\cos \varphi \pm i \sin \varphi) (\Delta \cos^r \theta - 1) = \mp \sqrt{\frac{21}{64\pi}} \left(\frac{x}{r} \pm i \frac{y}{r} \right) \left(\frac{\Delta z^r}{r^r} - 1 \right) \\ = \mp \sqrt{\frac{21}{64\pi}} \frac{(x \pm i y) (\Delta z^r - r^r)}{r^r}$$

تمرین ۵-۱۴

(آ) نشان دهید که مقادیر چشمداشتی بی‌آیند، میان حالت‌های $|l, m\rangle$ روابط $\langle \hat{L}_x \rangle = \langle \hat{L}_y \rangle = 0$ و

$$\langle \hat{L}_x^2 \rangle = \langle \hat{L}_y^2 \rangle = \frac{1}{2} [l(l+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2]$$

(ب) نامساوی $\Delta L_x \Delta L_y \geq \hbar^2 m / 2$ را ثابت کنید که در آن

حل:

(آ)

$$\langle \hat{L}_x \rangle = \langle l, m | \hat{L}_x | l, m \rangle = \langle l, m | \frac{1}{2} (\hat{L}_+ + \hat{L}_-) | l, m \rangle = \frac{1}{2} [\langle l, m | \hat{L}_+ | l, m \rangle + \langle l, m | \hat{L}_- | l, m \rangle]$$

$$= \frac{1}{2} C_{lm}^+ \langle l, m | l, m+1 \rangle + \frac{1}{2} C_{lm}^- \langle l, m | l, m-1 \rangle = 0.$$

$$\langle \hat{L}_y \rangle = \langle l, m | \hat{L}_y | l, m \rangle = \left\langle l, m \left| \frac{1}{2i} (\hat{L}_+ - \hat{L}_-) \right| l, m \right\rangle = 0.$$

اما از آنجا که جهت x و y هیچ ارجحیتی برهم ندارند، می توان گفت:

$$\langle \hat{L}_x \rangle = \langle \hat{L}_y \rangle$$

پس:

$$\langle L^2 \rangle = \langle l, m | L^2 | l, m \rangle = l(l+1) \hbar^2 = \langle l, m | \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 | l, m \rangle = 2 \langle \hat{L}_x^2 \rangle + m^2 \hbar^2$$

پس:

$$\langle \hat{L}_x^2 \rangle = \langle \hat{L}_y^2 \rangle = \frac{1}{2} [l(l+1) \hbar^2 - m^2 \hbar^2]$$

(ب)

$$\Delta L_x = \sqrt{\langle \hat{L}_x^2 \rangle - \langle L_x \rangle^2} = \sqrt{\langle \hat{L}_x^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2} [l(l+1) \hbar^2 - m^2 \hbar^2]} = \Delta L_y$$

پس:

$$\Delta L_x \Delta L_y = (\Delta L_x)^2 = \frac{1}{2} [l(l+1) - m^2] \hbar^2 \geq \frac{1}{2} [m(m+1) - m^2] \hbar^2 = \frac{\hbar^2 m}{2}$$

تمرین ۵-۱۵

ذره ای به جرم m در انتهای یک میله ی صلب به طول R و جرم ناچیز ثابت شده است. انتهای دیگر میله در صفحه ی xy حول یک تکیه گاه واقع در مبدأ می چرخد که محور آن در جهت x است.

(آ) انرژی کل سیستم را بر حسب اندازه حرکت زاویه ای L آن بنویسید.

(ب) معادله ی شرودینگر مستقل از زمان سیستم را بنویسید. (راهنمایی: در مختصات کروی، تنها φ تغییر می کند).

(پ) مسأله را برای ترازهای انرژی ممکن سیستم بر حسب m و گشتاور لختی $I = mR^2$ حل کنید.

(ت) توضیح دهید چرا انرژی نقطه ای صفر وجود ندارد.

حل:

هامیلتونی این سیستم عبارت است از:

$$\hat{H} = \frac{L_z^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

معادله‌ی ویژه مقداری به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{-\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\varphi^2} \psi(\varphi) = E\psi(\varphi)$$

یا:

$$\frac{d^2 \psi(\varphi)}{d\varphi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2} \psi(\varphi) = 0$$

با تعریف $k = \sqrt{\frac{2IE}{\hbar^2}}$ داریم:

$$\psi(\varphi) = e^{\pm ik\varphi}$$

چون تحت تبدیل $\varphi \rightarrow \varphi + 2\pi$ ؛ $\psi(\varphi)$ نباید تغییر کند نتیجه می‌شود که k باید عدد صحیح باشد.

در نتیجه:

$$E_m = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

از آنجا که حالت با انرژی صفر یک حالت فیزیکی قابل قبول است (این حالت معادل است با موردی که ذره بر روی محور z ها قرار دارد) لذا انرژی نقطه‌ی صفر وجود ندارد.

تمرین ۵-۱۶

سیستمی را در نظر بگیرید که با حالت

$$\psi(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2}{\lambda}} Y_{11}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} Y_{10}(\theta, \varphi) + A Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

توصیف می‌شود و در آن A یک ثابت حقیقی است.

(آ) A را طوری محاسبه کنید که $|\psi\rangle$ بهنجار باشد.

(ب) $\hat{L}_+ \psi(\theta, \varphi)$ را بیابید.

(پ) مقادیر چشمداشتی $\hat{L}_x$ و $\hat{L}_z$ را در حالت $|\psi\rangle$ حساب کنید.

(ت) احتمال مربوط به اندازه‌گیری مقدار صفر برای مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای را بیابید.

(ث) $\langle \Phi | \hat{L}_z | \psi \rangle$ و $\langle \Phi | \hat{L}_- | \psi \rangle$ را محاسبه کنید که در آن

$$\Phi(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{\lambda}{15}} Y_{21}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{4}{15}} Y_{20}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{2}{15}} Y_{2-1}(\theta, \varphi)$$

حل:

(آ)

شرط بهنجارش $|\psi\rangle$ آن است که:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

پس:

$$\left(\sqrt{\frac{r}{\lambda}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{\lambda}}\right)^2 + |A|^2 = 1$$

لذا با فرض حقیقی و مثبت بودن A داریم:

$$A = \sqrt{\frac{r}{\lambda}} = \frac{\sqrt{r}}{r}$$

(ب)

$$\begin{aligned}\hat{L}_+ \psi(\theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{r}{\lambda}} \hat{L}_+ Y_{1,1}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \hat{L}_+ Y_{1,0}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{r}{\lambda}} \hat{L}_+ Y_{1,-1}(\theta, \varphi) \\ &= 0 + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \hbar \sqrt{(1-0)(1+0+1)} Y_{1,1}(\theta, \varphi) + \sqrt{\frac{r}{\lambda}} \hbar \sqrt{(1+1)(1-1+1)} Y_{1,0}(\theta, \varphi) \\ &= \hbar \left(\frac{1}{r} Y_{1,1}(\theta, \varphi) + Y_{1,0}(\theta, \varphi) \right)\end{aligned}$$

(پ)

$$\begin{aligned}\hat{L}_z^2 &= \langle\psi|\hat{L}_z^2|\psi\rangle = \langle\psi|r\hbar^2|\psi\rangle = r\hbar^2 \langle\psi|\psi\rangle = r\hbar^2 \\ \langle\hat{L}_z\rangle &= \left\langle \frac{1}{r} (\hat{L}_+ + \hat{L}_-) \right\rangle = \frac{1}{r} [\langle\psi|L_+|\psi\rangle + \langle\psi|L_-|\psi\rangle] = \frac{1}{r} [\langle\psi|L_+|\psi\rangle + \langle\psi|L_+|\psi\rangle^*] \\ &= \text{Re}(\langle\psi|L_+|\psi\rangle) = \hbar \left(\frac{1}{r} \sqrt{\frac{r}{\lambda}} + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \right)\end{aligned}$$

(ت)

$$P_{m=1} = \left(\sqrt{\frac{1}{\lambda}}\right)^2 = \frac{1}{\lambda}$$

(ث)

$$L_z |\psi\rangle = \sqrt{\frac{r}{\lambda}} L_z |1,1\rangle + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} L_z |1,0\rangle + \sqrt{\frac{r}{\lambda}} L_z |1,-1\rangle$$

$$= \sqrt{\frac{3}{\lambda}} \hbar |1,1\rangle + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} \hbar |1,0\rangle + \sqrt{\frac{4}{\lambda}} (-\hbar) |1,-1\rangle = \hbar \left(\sqrt{\frac{3}{\lambda}} |1,1\rangle - \sqrt{\frac{4}{\lambda}} |1,-1\rangle \right)$$

پس:

$$\langle \phi | L_z | \psi \rangle = \sqrt{\frac{\lambda}{15}} \hbar \sqrt{\frac{3}{\lambda}} = \frac{\hbar}{\sqrt{5}} = \frac{\hbar \sqrt{5}}{5}$$

$$L_- | \psi \rangle = \sqrt{\frac{3}{\lambda}} L_- |1,1\rangle + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} L_- |1,0\rangle + \sqrt{\frac{4}{\lambda}} L_- |1,-1\rangle = \sqrt{\frac{3}{\lambda}} C_{1,1}^- |1,0\rangle + \sqrt{\frac{1}{\lambda}} C_{1,0}^- |1,-1\rangle$$

$$\langle \phi | L_- | \psi \rangle = \sqrt{\frac{4}{15}} \sqrt{\frac{3}{\lambda}} C_{1,1}^- = \sqrt{\frac{1}{15}} \hbar \sqrt{1(1+1)-1(1-1)} = \hbar \frac{\sqrt{5}}{5}$$

تمرین ۵-۱۷

(آ) با استفاده از روابط جابه‌جایی اندازه حرکت زاویه‌ای، اعتبار اتحاد (ژاکوبی) را نشان دهید:

$$[\hat{J}_x, [\hat{J}_y, \hat{J}_z]] + [\hat{J}_y, [\hat{J}_z, \hat{J}_x]] + [\hat{J}_z, [\hat{J}_x, \hat{J}_y]] = 0$$

(ب) اتحاد زیر را ثابت کنید:

$$[\hat{J}_x^2, \hat{J}_y^2] = [\hat{J}_y^2, \hat{J}_z^2] = [\hat{J}_z^2, \hat{J}_x^2]$$

(پ) عبارت‌های $\hat{L}_+ \hat{L}_- Y_{lm}(\theta, \varphi)$ و $\hat{L}_- \hat{L}_+ Y_{lm}(\theta, \varphi)$ را محاسبه کنید و سپس جابه‌جاگر $[\hat{L}_+ \hat{L}_-, \hat{L}_- \hat{L}_+] Y_{lm}(\theta, \varphi)$ را نتیجه بگیرید.

حل:

(آ)

از رابطه‌ی $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k$ استفاده می‌کنیم:

$$[\hat{J}_x, [\hat{J}_y, \hat{J}_z]] + [\hat{J}_y, [\hat{J}_z, \hat{J}_x]] + [\hat{J}_z, [\hat{J}_x, \hat{J}_y]] = [\hat{J}_x, i\hbar \hat{J}_x] + [\hat{J}_y, i\hbar \hat{J}_y] + [\hat{J}_z, i\hbar \hat{J}_z] \\ = i\hbar [\hat{J}_x, \hat{J}_x] + i\hbar [\hat{J}_y, \hat{J}_y] + i\hbar [\hat{J}_z, \hat{J}_z] = 0$$

(ب)

می‌دانیم که:

$$[\hat{J}_i^2, \hat{J}_j^2] = 0$$

پس:

$$0 = [\hat{J}_i^2, \hat{J}_i^2 + \hat{J}_j^2 + \hat{J}_k^2] = [\hat{J}_i^2, \hat{J}_j^2] + [\hat{J}_i^2, \hat{J}_k^2]$$

در نتیجه:

$$[\hat{J}_i^z, \hat{J}_j^z] = [\hat{J}_k^z, \hat{J}_i^z]$$

یا به عبارتی:

$$[\hat{J}_x^z, \hat{J}_y^z] = [\hat{J}_z^z, \hat{J}_x^z] = [\hat{J}_y^z, \hat{J}_z^z]$$

(پ)

از روابط ۲۹-۵ و ۳۰-۵ داریم:

$$\hat{L}_+ \hat{L}_- Y_{lm}(\theta, \varphi) = (\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + \hbar \hat{L}_z) Y_{lm}(\theta, \varphi) = (l(l+1) - m^2 + m) \hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$\hat{L}_- \hat{L}_+ Y_{lm}(\theta, \varphi) = (\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar \hat{L}_z) Y_{lm}(\theta, \varphi) = (l(l+1) - m^2 - m) \hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

پس:

$$\begin{aligned} [L_+ L_-, \hat{L}_- \hat{L}_+] Y_{lm}(\theta, \varphi) &= \hat{L}_+ \hat{L}_- (\hat{L}_- \hat{L}_+ Y_{lm}(\theta, \varphi)) - \hat{L}_- \hat{L}_+ (\hat{L}_+ \hat{L}_- Y_{lm}(\theta, \varphi)) \\ &= \hat{L}_+ \hat{L}_- [(l(l+1) - m^2 - m) \hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi)] \\ &\quad - \hat{L}_- \hat{L}_+ [(l(l+1) - m^2 + m) \hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi)] \\ &= \hbar^2 \{ [l(l+1) - m^2 - m][l(l+1) - m^2 + m] \\ &\quad - [l(l+1) - m^2 + m][l(l+1) - m^2 - m] \} Y_{lm}(\theta, \varphi) = 0 \end{aligned}$$

تمرین ۵-۱۸

ذره‌ای را در نظر بگیرید که تابع موج آن عبارت است از:

$$\psi(x, y, z) = A[(x+z)y + z^2] / r^3 - A/3$$

و در آن A یک ثابت است.(آ) آیا ψ ویژه حالتی از $\hat{L}^2$ است؟ اگر بله، ویژه مقدار متناظر چیست؟ آیا ψ ویژه حالت $\hat{L}_z$ نیز هست؟(ب) ثابت A را طوری بیابید که ψ بهنجار باشد.(پ) احتمال‌های مربوط به اندازه‌گیری مقدارهای گوناگون $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ را بیابید و سپس مقدار چشم‌داشتی $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ را محاسبه کنید.(ت) $\langle \psi | \hat{L}_\pm | \psi \rangle$ را محاسبه کنید و آن‌گاه $\langle \psi | \hat{L}_\pm | \psi \rangle$ را نتیجه بگیرید.

حل:

(ا) $\psi(x, y, z)$ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\psi(x, y, z) = A \left(\frac{xy}{r^2} + \frac{zy}{r^2} + \frac{rz^2 - r^2}{3r^2} \right)$$

با توجه به جدول ۲-۵ داریم:

$$\frac{xy}{r^2} = \frac{1}{4i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (Y_{22} - Y_{2-2}), \quad \frac{yz}{r^2} = \frac{-1}{2i} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} (Y_{21} + Y_{2-1}), \quad \frac{rz^2 - r^2}{r^2} = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} Y_{20}$$

پس:

$$\psi(\theta, \varphi) = A \left[\frac{1}{4i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (Y_{22} - Y_{2-2}) - \frac{1}{2i} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} (Y_{21} + Y_{2-1}) + \frac{1}{3} \sqrt{\frac{16\pi}{5}} Y_{20} \right]$$

لذا ψ ویژه تابع $\hat{L}^2$ است، زیرا:

$$\hat{L}^2 \psi(\theta, \varphi) = 2(2+1) \hbar^2 \psi(\theta, \varphi) = 6\hbar^2 \psi(\theta, \varphi)$$

و ویژه مقدار مربوطه $6\hbar^2$ می‌باشد. اما ψ ویژه تابع $\hat{L}_z$ نیست، زیرا:

$$\begin{aligned} \hat{L}_z \psi(\theta, \varphi) &= A \left[\frac{1}{4i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (2\hbar Y_{22} - (-2\hbar) Y_{2-2}) - \frac{1}{2i} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} (\hbar Y_{21} - \hbar Y_{2-1}) + \frac{1}{3} \sqrt{\frac{16\pi}{5}} (0) Y_{20} \right] \\ &= A\hbar \frac{1}{2i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (Y_{22} + Y_{2-2}) \end{aligned}$$

(ب)

شرط بهنجارش آنست که:

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1$$

چون $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ ها راست هنجار هستند، پس داریم:

$$\begin{aligned} 1 &= |A|^2 \left[\left| \frac{1}{4i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} \right|^2 + \left| \frac{-1}{2i} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \right|^2 + \left| \frac{-1}{2i} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \right|^2 + \left| \frac{1}{3} \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \right|^2 \right] \\ &= |A|^2 \left(\frac{2}{16} \frac{32\pi}{15} + \frac{2}{9} \frac{8\pi}{15} + \frac{1}{9} \frac{16\pi}{15} \right) = \frac{68\pi |A|^2}{135} \end{aligned}$$

اگر A را حقیقی و مثبت فرض کنیم داریم:

$$A = \left(\frac{135}{68\pi} \right)^{\frac{1}{2}}$$

(پ) چون ψ ویژه تابع $\hat{L}^2$ با ویژه مقدار $6\hbar^2$ است لذا در اندازه گیری $\hat{L}^2$ فقط مقدار $6\hbar^2$ به دست می آید و احتمال آن نیز یک است. در اندازه گیری L_z یکی از مقادیر $m\hbar$ (که در آن $m = 0, \pm 1, \pm 2$) با احتمالات زیر به دست می آید:

$$P_0 = |A|^2 \left(\frac{1}{3} \sqrt{\frac{16\pi}{15}} \right)^2 = \frac{135}{68\pi} \frac{16\pi}{135} = \frac{4}{17}$$

$$P_{\pm 1} = |A|^2 \left(\frac{1}{3i} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \right)^2 = \frac{135}{68\pi} \frac{8\pi}{135} = \frac{2}{17}$$

$$P_{\pm 2} = |A|^2 \left(\frac{1}{4i} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} \right)^2 = \frac{135}{68\pi} \frac{32\pi}{16 \times 15} = \frac{9}{34}$$

مقدار چشمداشتی $\hat{L}^2$ همان $6\hbar^2$ است و در مورد $\langle \hat{L}_z \rangle$ داریم:

$$\begin{aligned} \langle \hat{L}_z \rangle &= \langle \psi | \hat{L}_z | \psi \rangle = 0 \times \hbar P_0 + \hbar P_1 + (-\hbar) P_{-1} + 2\hbar P_2 + (-2\hbar) P_{-2} \\ &= 0 \times \hbar \left(\frac{4}{17} \right) + \hbar \left(\frac{2}{17} \right) - \hbar \left(\frac{2}{17} \right) + 2\hbar \left(\frac{9}{34} \right) - 2\hbar \left(\frac{9}{34} \right) \end{aligned}$$

پس:

$$\langle \hat{L}_z \rangle = 0$$

(ت)

ابتدا به محاسبه $L_{\pm} |\psi\rangle$ می پردازیم. برای این منظور $|\psi\rangle$ را می توان به صورت زیر نوشت:

$$|\psi\rangle = -i\sqrt{\frac{9}{34}} |2, 2\rangle + i\sqrt{\frac{9}{34}} |2, -2\rangle + i\sqrt{\frac{2}{17}} |2, 1\rangle + i\sqrt{\frac{2}{17}} |2, -1\rangle + \sqrt{\frac{4}{17}} |2, 0\rangle$$

پس با توجه به اینکه:

$$L_{\pm} |l, m\rangle = \hbar \sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)} |l, m \pm 1\rangle$$

داریم:

$$\begin{aligned} L_+ |\psi\rangle &= i\sqrt{\frac{9}{34}} \hbar \sqrt{(2+2)(2-2+1)} |2, -1\rangle + i\sqrt{\frac{2}{17}} \hbar \sqrt{(2-1)(2+1+1)} |2, 2\rangle \\ &\quad + i\sqrt{\frac{2}{17}} \hbar \sqrt{(2+1)(2-1+1)} |2, 0\rangle + \sqrt{\frac{4}{17}} \hbar \sqrt{(2-0)(2+0+1)} |2, 1\rangle \\ &= 2i\sqrt{\frac{9}{34}} \hbar |2, -1\rangle + 2i\sqrt{\frac{2}{17}} \hbar |2, 2\rangle + 2i\sqrt{\frac{2}{17}} \hbar |2, 0\rangle + 2\hbar \sqrt{\frac{6}{17}} |2, 1\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L_- |\psi\rangle &= -i\sqrt{\frac{9}{34}}\hbar\sqrt{(2+2)(2-2+1)}|2,1\rangle + i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar\sqrt{(2+1)(2-1+1)}|2,0\rangle \\
 &\quad + i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar\sqrt{(2-1)(2+1+1)}|2,-2\rangle + \sqrt{\frac{4}{17}}\hbar\sqrt{(2+0)(2-0+1)}|2,-1\rangle \\
 &= -2i\sqrt{\frac{9}{34}}\hbar|2,1\rangle + 2i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar|2,0\rangle + 2i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar|2,-2\rangle + 2\hbar\sqrt{\frac{6}{17}}|2,-1\rangle
 \end{aligned}$$

پس:

$$\begin{aligned}
 \langle\psi|L_+|\psi\rangle &= 2i\sqrt{\frac{9}{34}}\hbar\left(-i\sqrt{\frac{2}{17}}\right) + 2i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar\left(i\sqrt{\frac{9}{34}}\right) + 2i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar\sqrt{\frac{4}{17}} + 2\hbar\sqrt{\frac{6}{17}}\left(-i\sqrt{\frac{2}{17}}\right) \\
 &= \frac{6\hbar}{17} - \frac{6\hbar}{17} + \frac{4i\sqrt{2}\hbar}{17} - \frac{4i\sqrt{2}\hbar}{17} = 0 \\
 \langle\psi|L_-|\psi\rangle &= -2i\sqrt{\frac{9}{34}}\hbar\left(-i\sqrt{\frac{2}{17}}\right) + 2i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar\sqrt{\frac{4}{17}} + 2i\sqrt{\frac{2}{17}}\hbar\left(-i\sqrt{\frac{9}{34}}\right) + 2\hbar\sqrt{\frac{6}{17}}\left(-i\sqrt{\frac{2}{17}}\right) \\
 &= \frac{-6\hbar}{17} + \frac{4i\sqrt{2}\hbar}{17} + \frac{6\hbar}{17} - \frac{4i\sqrt{2}\hbar}{17} = 0
 \end{aligned}$$

تمرین ۵-۱۹

سیستمی را در نظر بگیرید که در حالت زیر است:

$$\psi(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2}{13}}Y_{2-2} + \sqrt{\frac{2}{13}}Y_{2-1} + \sqrt{\frac{2}{13}}Y_{20} + \sqrt{\frac{2}{13}}Y_{21} + \sqrt{\frac{2}{13}}Y_{22}$$

(آ) اگر اندازه‌گیری شود، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی به دست خواهند آمد؟

(ب) اگر پس از اندازه‌گیری $\hat{L}_z$ مقدار $l_z = 2\hbar$ را بیابیم، عدم قطعیت‌های ΔL_x و ΔL_y و حاصل ضرب آن‌ها $\Delta L_x \Delta L_y$ را بیابید.(پ) $\langle\psi|\hat{L}_x|\psi\rangle$ و $\langle\psi|\hat{L}_y|\psi\rangle$ را بیابید.حل:
(آ)در اندازه‌گیری L_z یکی از مقادیر $m\hbar$ (که در آن $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$) با احتمالات زیر به دست می‌آید:

$$P_0 = \left(\sqrt{\frac{2}{13}}\right)^2 = \frac{2}{13}$$

$$P_{\pm 2} = \left(\sqrt{\frac{2}{13}}\right)^2 = \frac{2}{13}$$

$$p_{\pm 2} = \left(\sqrt{\frac{2}{13}} \right)^2 = \frac{2}{13}$$

(ب)

چون در اندازه گیری L_z مقدار $2\hbar$ به دست آمده است لذا حالت سیستم به Y_{22} تغییر خواهد کرد. در نتیجه طبق تمرین ۵-۱۴ خواهیم داشت:

$$\Delta L_x \Delta L_y = \frac{\hbar^2}{2} [2(2+1) - 2^2] = 4\hbar^2$$

(پ)

ابتدا $\langle \psi | L_{\pm} | \psi \rangle$ را می یابیم.

$$\begin{aligned} L_{\pm} \psi &= \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{(2 \pm 2)(2 \mp 2 + 1)} Y_{2, 2 \pm 1} + \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{(2 \pm 2)(2 \mp 2 + 1)} Y_{2, 2 \pm 1} \\ &+ \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{(2 \mp 0)(2 \pm 0 + 1)} Y_{2, \pm 1} + \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{(2 \mp 2)(2 \pm 2 + 1)} Y_{2, 2 \pm 1} \\ &+ \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{(2 \mp 2)(2 \pm 2 + 1)} Y_{2, 2 \pm 1} \end{aligned}$$

پس:

$$\langle \psi | L_+ | \psi \rangle = \sqrt{\frac{2}{13}} \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{6} + \sqrt{\frac{2}{13}} \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{6} = \frac{12}{13} \hbar$$

$$\langle \psi | L_- | \psi \rangle = \sqrt{\frac{2}{13}} \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{6} + \sqrt{\frac{2}{13}} \sqrt{\frac{2}{13}} \hbar \sqrt{6} = \frac{12}{13} \hbar$$

پس:

$$\langle \psi | L_x | \psi \rangle = \left\langle \psi \left| \frac{1}{2} (L_+ + L_-) \right| \psi \right\rangle = \frac{2 \times \frac{12}{13} \hbar}{2} = \frac{12}{13} \hbar$$

$$\langle \psi | L_y | \psi \rangle = \left\langle \psi \left| \frac{1}{2i} (L_+ - L_-) \right| \psi \right\rangle = 0$$

تمرین ۵-۲۰

(آ) ویژه مقدارهای انرژی یک چرخنده متقارن حول محور دوران را محاسبه کنید و تبهنگی هر تراز انرژی را بیابید (یعنی برای هر مقدار از عدد کوانتومی سمتی m ، پیدا کنید که حالت $|l, m\rangle$ متناظر با همان انرژی وجود دارد). خاطرنشان می کنیم که هامیلتونی یک چرخنده متقارن - محور به صورت زیر است:

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2}{2I_1} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_2}$$

که در آن I_1 و I_2 گشتاور لختی هستند.

(ب) از قسمت (آ) ویژه مقدارهای انرژی را برای ترازهای گوناگون $l=3$ نتیجه بگیرید.

(پ) در حالت یک چرخنده‌ی صلب (یعنی $I_1 = I_2 = I$) عبارت انرژی و رابطه‌ی تبهگنی متناظر را بیابید.

(ت) عدد کوانتومی مداری l و تبهگنی انرژی متناظر را برای یک چرخنده‌ی صلب که بزرگی تکانه‌ی زاویه‌ای کل آن $\sqrt{56}\hbar$ است محاسبه کنید.

حل:
(آ)

هامیلتونی را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2}{2I_1} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_2} = \frac{\hat{L}^2}{2I_1} + \left(\frac{1}{2I_2} - \frac{1}{2I_1} \right) \hat{L}_z^2 = \frac{\hat{L}^2}{2I_1} + \frac{I_1 - I_2}{2I_1 I_2} \hat{L}_z^2$$

پس ویژه حالت‌های هامیلتونی همان ویژه حالت‌های همزمان $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ یعنی $|l, m\rangle$ ها هستند. پس:

$$E_{l,m} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I_1} + \frac{I_1 - I_2}{2I_1 I_2} m^2 \hbar^2$$

واضح است که به ازای هر مقدار m برای یک l مشخص، حالت‌های $|l, \pm m\rangle$ دارای انرژی یکسانی بوده و تبهگن هستند.

(ب)

می‌دانیم که به ازای $l=3$ ، $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ را خواهد داشت. پس:

$$E_{r,m} = \frac{6\hbar^2}{I_1} + \frac{I_1 - I_2}{2I_1 I_2} m^2 \hbar^2$$

و لذا:

$$E_{r,0} = \frac{6\hbar^2}{I_1}$$

$$E_{r,\pm 1} = \frac{(11I_2 + I_1)\hbar^2}{2I_1 I_2}$$

$$E_{r,\pm 2} = \frac{(8I_2 + 4I_1)\hbar^2}{2I_1 I_2}$$

$$E_{r,\pm r} = \frac{(2I_r + 9I_1)\hbar^2}{2I_1 I_r}$$

(پ)

در حالت $I_1 = I_r$ داریم:

$$E_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I_1}$$

واضح است که به ازای هر l مشخص، تبهگنی $(2l+1)$ گانه داریم. زیرا به ازای هر l ، m مقادیر $0, \pm 1, \dots, \pm l$ را اختیار می کند.

(ت)

با توجه به اینکه:

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2$$

داریم:

$$\Delta E \hbar^2 = l(l+1)\hbar^2$$

از رابطی اخیر واضح است که:

$$l=7$$

بنابراین تبهگنی ۱۵ گانه وجود دارد.

تمرین ۵-۲۱

سیستمی را در نظر بگیرید که اندازه حرکت زاویه ای کل آن $j=1$ است. در این جا می خواهیم $\hat{J}_y$ را اندازه بگیریم که ماتریس آن به صورت زیر است:

$$\hat{J}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

(آ) با اندازه گیری $\hat{J}_y$ چه مقدارهای ممکن به دست خواهیم آورد؟(ب) اگر سیستم در حالت $J_y = \hbar$ باشد $\langle \hat{J}_z \rangle$ و $\langle \hat{J}_z^2 \rangle$ را محاسبه کنید.(پ) قسمت (ب) را برای $\langle \hat{J}_x \rangle$ و $\langle \hat{J}_x^2 \rangle$ تکرار کنید.

حل:

(آ)

واضح است که به ازای $j=1$ ، J_y می تواند مقادیر $\pm \hbar$ و 0 را اختیار کند.

(ب)

ابتدا حالت سیستم را که همان $|j_y = \hbar\rangle$ است به دست می‌آوریم:
برای این منظور تعریف می‌کنیم:

$$|j_y = \hbar\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

پس داریم:

$$J_y |j_y = \hbar\rangle = \hbar |j_y = \hbar\rangle$$

یا:

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \hbar \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

در نتیجه:

$$-ib = a\sqrt{2}$$

$$ia - ic = b\sqrt{2}$$

$$ib = c\sqrt{2}$$

این روابط همراه با شرط بهنجارش $\langle j_y = \hbar | j_y = \hbar \rangle = 1$ نتیجه می‌دهند که:

$$|j_y = \hbar\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

پس:

$$\langle \hat{J}_z \rangle = \langle j_y = \hbar | \hat{J}_z | j_y = \hbar \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{2} & -1 \end{pmatrix} \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

این نتیجه از ابتدا نیز قابل انتظار بود. زیرا همانطور که مقدار چشمداشتی $\hat{J}_y$ با استفاده از ویژه حالت‌های $\hat{J}_z$ صفر است باید مقدار چشمداشتی $\hat{J}_z$ با استفاده از ویژه حالت‌های $\hat{J}_y$ نیز صفر باشد. به همین ترتیب و با توجه به تمرین ۵-۱۴ داریم:

$$\langle j_z^r \rangle = \frac{1}{r} \left[1(1+1) \hbar^r - 1^r \hbar^r \right] = \frac{\hbar^r}{r}$$

که این با محاسبه به روش زیر نیز قابل حل است:

$$\langle j_z^r \rangle = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} 1 & -i\sqrt{r} & -1 \end{pmatrix} \hbar^r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{r} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{r} \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^r}{r}$$

(ب)

مانند قسمت (ب) داریم:

$$\langle J_x \rangle = 0, \quad \langle J_x^r \rangle = \frac{\hbar^r}{r}$$

و

$$\Delta J_x = \sqrt{\langle J_x^r \rangle - \langle J_x \rangle^r} = \frac{\hbar}{\sqrt{r}} = \frac{\hbar\sqrt{r}}{r}$$

تمرین ۵-۲۲

با اعمال عملگرهای نردبانی $\hat{L}_{\pm}$ روی $Y_{r\pm 1}(\theta, \varphi)$ محاسبه کنید.

حل:

با توجه به اینکه:

$$L_{\pm} = \pm \hbar e^{\pm i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] \quad \text{و} \quad Y_{r\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{r!}{64\pi}} \sin \theta (\Delta \cos^r \theta - 1) e^{\pm i\varphi}$$

داریم:

$$\begin{aligned} L_{\pm} Y_{r\pm 1} &= \pm \hbar e^{\pm i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] \left[\mp \sqrt{\frac{r!}{64\pi}} \sin \theta (\Delta \cos^r \theta - 1) e^{\pm i\varphi} \right] = \pm \hbar e^{\pm i\varphi} \left[\mp \sqrt{\frac{r!}{64\pi}} \right] \\ &\times \left[\cos \theta (\Delta \cos^r \theta - 1) e^{\pm i\varphi} - 1 \cdot \sin^r \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi} \pm i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \theta (\Delta \cos^r \theta - 1) (\pm i e^{\pm i\varphi}) \right] \\ &= \mp \hbar e^{\pm i\varphi} \sqrt{\frac{r!}{64\pi}} (-1 \cdot \sin^r \theta \cos \theta) \\ &= \hbar \sqrt{(r \mp 1)(r \pm 1 + 1)} Y_{r\pm r} \end{aligned}$$

تمرین ۵-۲۳

سیستمی با تکانه‌ی زاویه‌ای کل $j=1$ را در نظر بگیرید. می‌خواهیم اندازه‌گیری‌هایی روی

$$\hat{J}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

انجام دهیم.

- (آ) مقدارهای ممکن که با اندازه‌گیری $\hat{J}_z$ به دست خواهیم آورد چه هستند؟
 (ب) $\langle \hat{J}_x \rangle$ ، $\langle \hat{J}_x^2 \rangle$ و ΔJ_x را محاسبه کنید اگر سیستم در حالت $j_z = -\hbar$ باشد.
 (پ) قسمت (ب) را برای $\langle \hat{J}_y \rangle$ ، $\langle \hat{J}_y^2 \rangle$ و ΔJ_y تکرار کنید.

حل:

به طریق مشابه تمرین ۵-۲۱ داریم:

(آ)

در اندازه‌گیری J_z مقادیر $\pm \hbar$ و ۰ به دست می‌آیند.

(ب)

$$\langle J_x \rangle = 0, \quad \langle J_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2}, \quad \Delta J_x = \frac{\hbar\sqrt{2}}{2}$$

(پ)

$$\langle J_y \rangle = 0, \quad \langle J_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2}, \quad \Delta J_y = \frac{\hbar\sqrt{2}}{2}$$

تمرین ۵-۲۴

سیستمی را در نظر بگیرید که در حالت

$$\psi(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \frac{z}{r} + \frac{1}{\sqrt{3\pi}} \frac{x}{r}$$

است.

(آ) $\psi(x, y, z)$ را بر حسب هماهنگ‌های کروی بیان کنید. سپس $\hat{L}_z \psi(x, y, z)$ و $\hat{L}_x \psi(x, y, z)$ را

محاسبه کنید. آیا $\psi(x, y, z)$ یک ویژه حالت $\hat{L}_x$ یا $\hat{L}_z$ است؟

(ب) $\hat{L}_\pm \psi(x, y, z)$ و $\langle \psi | \hat{L}_\pm | \psi \rangle$ را محاسبه کنید.

(پ) اگر اندازه‌گیری مؤلفه‌ی z تکانه زاویه‌ای مداری انجام شود، احتمال‌های متناظر با یافتن نتایج

۰، $\hbar$ و $-\hbar$ را بیابید.

حل:

(I)

با توجه به جدول ۵-۲ داریم:

$$\begin{aligned}\psi(x, y, z) &= \frac{1}{\sqrt{12}} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{1,0}(x, y, z) + \frac{1}{\sqrt{12}} \frac{-1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{3}} (Y_{1,1} - Y_{1,-1}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{12}} Y_{1,0}(x, y, z) - \frac{\sqrt{2}}{3} Y_{1,1} + \frac{\sqrt{2}}{3} Y_{1,-1}\end{aligned}$$

پس:

$$\hat{L}^2 \psi(x, y, z) = 1(1+1) \hbar^2 \psi(x, y, z) = 2\hbar^2 \psi(x, y, z)$$

$$\begin{aligned}L_z \psi(x, y, z) &= \frac{1}{\sqrt{12}} L_z Y_{1,0}(x, y, z) - \frac{\sqrt{2}}{3} L_z Y_{1,1} + \frac{\sqrt{2}}{3} L_z Y_{1,-1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\hbar Y_{1,0}) - \frac{\sqrt{2}}{3} (\hbar Y_{1,1}) + \frac{\sqrt{2}}{3} (-\hbar Y_{1,-1}) = \frac{-\hbar\sqrt{2}}{3} Y_{1,1} - \frac{\hbar\sqrt{2}}{3} Y_{1,-1}\end{aligned}$$

واضح است که $\psi(x, y, z)$ ویژه حالت $\hat{L}^2$ است (با ویژه مقدار $2\hbar^2$) اما ویژه حالت $\hat{L}_z$ نیست. (ب)

در ادامه با $\psi_N(x, y, z)$ که همان $\psi(x, y, z)$ بهنجار شده است کار می‌کنیم:

$$\psi_N(x, y, z) = N\psi(x, y, z) = \frac{6}{\sqrt{19}} \left(\frac{1}{\sqrt{12}} Y_{1,0} - \frac{\sqrt{2}}{3} Y_{1,1} + \frac{\sqrt{2}}{3} Y_{1,-1} \right) = \sqrt{\frac{3}{19}} Y_{1,0} - \sqrt{\frac{8}{19}} Y_{1,1} + \sqrt{\frac{8}{19}} Y_{1,-1}$$

حال به محاسبه $\hat{L}_\pm |\psi\rangle$ می‌پردازیم:

$$\hat{L}_\pm |\psi\rangle = \sqrt{\frac{3}{19}} \hbar \sqrt{(1 \mp 1)(1 \pm 1 + 1)} Y_{1,\pm 1} - \sqrt{\frac{8}{19}} \hbar \sqrt{(1 \mp 1)(1 \pm 1 + 1)} Y_{1,\pm 1} + \sqrt{\frac{8}{19}} \hbar \sqrt{(1 \pm 1)(1 \mp 1 + 1)} Y_{1,\pm 1}$$

پس:

$$L_+ \psi(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{6}{19}} \hbar Y_{1,1} + \sqrt{\frac{16}{19}} Y_{1,0} \hbar$$

$$L_- \psi(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{6}{19}} \hbar Y_{1,-1} - \sqrt{\frac{16}{19}} Y_{1,0} \hbar$$

و لذا:

$$\langle \psi | L_+ | \psi \rangle = -\sqrt{\frac{8}{19}} \times \sqrt{\frac{6}{19}} \hbar + \sqrt{\frac{3}{19}} \times \sqrt{\frac{16}{19}} \hbar = 0$$

$$\langle \psi | L_- | \psi \rangle = \sqrt{\frac{3}{19}} \times -\sqrt{\frac{16}{19}} \hbar + \sqrt{\frac{8}{19}} \times \sqrt{\frac{6}{19}} \hbar = 0$$

(پ)

$$P_z = \left(\sqrt{\frac{3}{19}} \right)^2 = \frac{3}{19}$$

$$P_{\pm 1} = \left(\mp \sqrt{\frac{8}{19}} \right)^2 = \frac{8}{19}$$

تمرین ۵-۲۵

سیستمی را در نظر بگیرید که تابع موج آن با رابطه‌ی زیر داده می‌شود

$$\psi(\theta, \varphi) = \frac{1}{2} Y_{00}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{11}(\theta, \varphi) + \frac{1}{2} Y_{1-1}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sqrt{6}} Y_{22}(\theta, \varphi)$$

(آ) آیا $\psi(\theta, \varphi)$ بهنجار است؟

(ب) آیا $\psi(\theta, \varphi)$ ویژه‌حالتی از $\hat{L}^2$ یا $\hat{L}_z$ است؟

(پ) $\hat{L}_{\pm} \psi(\theta, \varphi)$ و $\langle \psi | \hat{L}_{\pm} | \psi \rangle$ را محاسبه کنید.

(ت) اگر اندازه‌گیری روی مؤلفه‌ی z تکانه‌ی زاویه‌ای مداری انجام شود، احتمال‌های متناظر با یافتن نتایج $0, \hbar, \hbar, -\hbar$ و $2\hbar$ را بیابید.

حل:

(ا)

$\psi(\theta, \varphi)$ بهنجار است زیرا:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^2 = 1$$

(ب)

$\psi(\theta, \varphi)$ ویژه حالت $\hat{L}^2$ است و نیز ویژه حالت $\hat{L}_z$ ، زیرا:

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 \psi(\theta, \varphi) &= \frac{1}{2} L^2 Y_{00} + \frac{1}{\sqrt{2}} L^2 Y_{11} + \frac{1}{2} L^2 Y_{1-1} + \frac{1}{\sqrt{6}} L^2 Y_{22} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0(0+1) \hbar^2 Y_{00} + \frac{1}{\sqrt{2}} 1(1+1) \hbar^2 Y_{11} + \frac{1}{2} 1(1+1) \hbar^2 Y_{1-1} + \frac{1}{\sqrt{6}} 2(2+1) \hbar^2 Y_{22} \\ &= \hbar^2 \left(\sqrt{2} Y_{11} + Y_{1-1} + \sqrt{6} Y_{22} \right) \end{aligned}$$

$$\hat{L}_z \psi(\theta, \varphi) = \frac{1}{2} \cdot 0 \hbar Y_{00} + \frac{1}{\sqrt{2}} \hbar Y_{11}(\theta, \varphi) + \frac{1}{2} (-\hbar) Y_{1-1} + \frac{1}{\sqrt{6}} (2\hbar) Y_{22}(\theta, \varphi)$$

$$= \hbar \left[\frac{1}{\sqrt{r}} Y_{11}(\theta, \varphi) - \frac{1}{r} Y_{1-1} + \sqrt{2} Y_{22}(\theta, \varphi) \right]$$

(پ)

ابتدا $\hat{L}_{\pm} |\psi\rangle$ را می‌یابیم:

$$\begin{aligned} L_{\pm} |\psi\rangle &= \frac{1}{r} L_{\pm} Y_{..} + \frac{1}{\sqrt{r}} L_{\pm} Y_{11} + \frac{1}{r} L_{\pm} Y_{1,-1} + \frac{1}{\sqrt{r}} L_{\pm} Y_{22} \\ &= \hbar \left(0 + \frac{1}{\sqrt{r}} \sqrt{(1 \mp 1)(1 \pm 1 + 1)} Y_{1,1 \pm 1} + \frac{1}{r} \sqrt{(1 \pm 1)(1 \mp 1 + 1)} Y_{1,-1 \pm 1} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\sqrt{r}} \sqrt{(2 \mp 2)(2 \pm 2 + 1)} Y_{2,2 \pm 1} \right) \end{aligned}$$

پس:

$$\langle \psi | L_{\pm} | \psi \rangle = 0$$

(ت)

با توجه به اینکه Y_{lm} ها ویژه توابع $\hat{L}_z$ هستند لذا:

$$P_r = \left(\frac{1}{r} \right)^r = \frac{1}{r}$$

$$P_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right)^r = \frac{1}{r}$$

$$P_{-1} = \left(\frac{1}{r} \right)^r = \frac{1}{r}$$

$$P_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right)^r = \frac{1}{r}$$

تمرین ۵-۲۶

با استفاده از عبارت $\hat{L}_-$ در مختصات کروی دو رابطه‌ی زیر را اثبات کنید:

$$[\hat{L}_-, e^{-i\varphi} \sin \theta] = 0 \quad \text{و} \quad [\hat{L}_-, \cos \theta] = \hbar e^{-i\varphi} \sin \theta$$

حل:

با توجه به اینکه:

$$\hat{L}_- = -\hbar e^{-i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right]$$

اثر $[\hat{L}_-, \cos \theta]$ و $[\hat{L}_-, e^{-i\varphi} \sin \theta]$ را روی تابع موج دلخواه و خوش رفتار $\psi(\theta, \varphi)$ می‌یابیم:

$$\begin{aligned}
\left[\hat{L}_-, e^{-i\varphi} \sin \theta \right] \psi(\theta, \varphi) &= \left[-\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), e^{-i\varphi} \sin \theta \right] \psi(\theta, \varphi) = \\
&= -\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \left(e^{-i\varphi} \sin \theta \psi(\theta, \varphi) \right) \\
&= -e^{-i\varphi} \sin \theta \left[-\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right] \psi(\theta, \varphi) \\
&= -\hbar e^{-i\varphi} \left[e^{-i\varphi} \left(\cos \theta \psi(\theta, \varphi) + \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) \right. \\
&\quad \left. - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \left(-i e^{-i\varphi} \right) \sin \theta \psi(\theta, \varphi) + e^{-i\varphi} \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right] \\
&\quad + \hbar e^{-i\varphi} \sin \theta \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \\
&= -\hbar e^{-i\varphi} \left[\psi \cos \theta + \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - \psi \cos \theta - i \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right. \\
&\quad \left. - \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} + i \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right] = 0.
\end{aligned}$$

پس با توجه به اینکه $\psi(\theta, \varphi)$ کاملاً اختیاری است؛ لذا:

$$\left[\hat{L}_-, e^{-i\varphi} \sin \theta \right] = 0.$$

حال $\left[\hat{L}_-, \cos \theta \right] \psi(\theta, \varphi)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
\left[\hat{L}_-, \cos \theta \right] \psi(\theta, \varphi) &= \left[-\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), \cos \theta \right] \psi(\theta, \varphi) = -\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \\
&\quad \times \left(\cos \theta \psi(\theta, \varphi) \right) - \cos \theta \left(-\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right) \psi(\theta, \varphi) \\
&= -\hbar e^{-i\varphi} \left[\left(-\sin \theta \psi(\theta, \varphi) + \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \right. \\
&\quad \left. + \hbar \cos \theta e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} - i \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \right] \\
&= -\hbar e^{-i\varphi} \left[-\psi \sin \theta + \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} - i \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} - \cos \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} + i \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right] \\
&= \left(\hbar e^{-i\varphi} \sin \theta \right) \psi
\end{aligned}$$

پس:

$$\left[\hat{L}_-, \cos \theta \right] = \hbar e^{-i\varphi} \sin \theta$$

تمرین ۵-۲۷

ذره‌ای را با اندازه حرکت زاویه‌ای $l=1$ در نظر بگیرید.

(آ) ویژه مقدارها و ویژه بردارهای $|1, m_x\rangle$ از $\hat{L}_x$ را بیابید.

(ب) حالت $|1, m_x=1\rangle$ را به عنوان یک برهم‌نهی خطی از ویژه حالت‌های $\hat{L}_z$ بیان کنید. (راهنمایی: نخست باید ویژه حالت‌های L_x را پیدا کنید و مشخص کنید کدام یک از آن‌ها متناظر با ویژه مقدار $m_x=1$ است. این ویژه بردار در پایه z بسط داده خواهد شد).

(پ) احتمال اندازه‌گیری $m_z=1$ هنگامی که ذره در ویژه حالت $|1, m_x=1\rangle$ است، چقدر می‌باشد؟ احتمال متناظر با اندازه‌گیری $m_z=0$ چیست؟

(ت) فرض کنید که اندازه‌گیری مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای انجام شود و نتیجه $m_z=1$ به دست آید. اکنون مؤلفه‌ی x تکانه‌ی زاویه‌ای را اندازه می‌گیریم. نتایج ممکن و احتمال‌های آن چه هستند؟

حل:

(آ)

با توجه به مسئله‌ی حل شده ۵-۸ در متن کتاب داریم:

$$m_z = 0, \pm \hbar$$

و نیز با توجه به اینکه $\theta = \frac{\pi}{2}$ و $\varphi = 0$ داریم:

$$|1, m_x = -1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - \cos \frac{\pi}{2} \\ -\frac{2}{\sqrt{2}} \sin \frac{\pi}{2} \\ 1 + \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|1, m_x = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|1, m_x = +1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \cos \frac{\pi}{2} \\ \frac{2}{\sqrt{2}} \sin \frac{\pi}{2} \\ 1 - \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

(ب)

$$|1, m_x = +1\rangle = \frac{1}{2}|1, 1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1, 0\rangle + \frac{1}{2}|1, -1\rangle$$

(پ)

$$P_{+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$P_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

(ت)

در اندازه‌گیری m_z یکی از مقادیر ۰ یا ± 1 حاصل می‌شود و احتمال متناظر با آنها در تشابه با قسمت (پ) عبارتند از:

$$P_0 = \frac{1}{2}, \quad P_{\pm 1} = \frac{1}{4}$$

تمرین ۵-۲۸

سیستمی را در نظر بگیرید که در ویژه حالت تکانه‌ای زاویه‌ای زیر $|l, m\rangle$ معلوم است:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|1, -1\rangle + A|1, 0\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}|1, 1\rangle$$

و در آن A یک ثابت حقیقی می‌باشد.

(آ) A را طوری محاسبه کنید که $|\psi\rangle$ بهنجار باشد.

(ب) مقادیر چشم‌داشتی $\hat{L}_x$ ، $\hat{L}_y$ ، $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ را در حالت $|\psi\rangle$ محاسبه کنید.

(پ) احتمال وابسته به اندازه‌گیری $\hbar$ برای مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای را بیابید.

(ت) $\langle 1, m | \hat{L}_+^2 | \psi \rangle$ و $\langle 1, m | \hat{L}_-^2 | \psi \rangle$ را محاسبه کنید.

حل:
(آ)

با توجه به اینکه $|l, m\rangle$ ها راست هنجار هستند داریم:

$$1 = \langle \psi | \psi \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + A^2 + \left(\sqrt{\frac{2}{5}}\right)^2 = \frac{3}{5} + A^2$$

پس:

$$A = \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{V}}$$

(ب)

با توجه به اینکه $|l, m\rangle$ ها ویژه حالت‌های همزمان $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ هستند پس:

$$\langle \hat{L}^2 \rangle = 1(1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$$

$$\langle \hat{L}_z \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{V}}\right)^2 (-\hbar) + \frac{4}{V}(\hbar) + \left(\sqrt{\frac{2}{V}}\right)^2 (+\hbar) = \frac{\hbar}{V}$$

برای محاسبه $\langle \hat{L}_x \rangle$ و $\langle \hat{L}_y \rangle$ ابتدا $\langle L_{\pm} \rangle$ را می‌یابیم. برای این منظور از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$L_{\pm}|l, m\rangle = \hbar\sqrt{(l \mp m)(l \pm m + 1)}|l, m \pm 1\rangle$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} L_{\pm}|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{V}}L_{\pm}|1, -1\rangle + AL_{\pm}|1, 0\rangle + \sqrt{\frac{2}{V}}L_{\pm}|1, 1\rangle \\ &= \hbar\left[\frac{1}{\sqrt{V}}\sqrt{(1 \pm 1)(1 \mp 1 + 1)}|1, -1 \pm 1\rangle + A\sqrt{(1 \mp 0)(1 \pm 0 + 1)}|1, 0 \pm 1\rangle\right. \\ &\quad \left.+ \sqrt{\frac{2}{V}}\sqrt{(1 \mp 1)(1 \pm 1 + 1)}|1, 1 \pm 1\rangle\right] \end{aligned}$$

$$\langle L_+ \rangle = \langle \psi | L_+ | \psi \rangle = \frac{\hbar\sqrt{2}}{\sqrt{V}}A + \hbar A\sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{V}} = \hbar A\sqrt{\frac{2}{V}}(1 + \sqrt{2})$$

$$\langle L_- \rangle = \langle \psi | L_- | \psi \rangle = \hbar A\sqrt{2}\frac{1}{\sqrt{V}} + \hbar\sqrt{\frac{2}{V}}\sqrt{2}A = \hbar A\sqrt{\frac{2}{V}}(1 + \sqrt{2})$$

پس:

$$\langle \hat{L}_x \rangle = \frac{\langle L_+ \rangle + \langle L_- \rangle}{2} = \hbar A\sqrt{\frac{2}{V}}(1 + \sqrt{2}) = \hbar\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{V}}\right)\sqrt{\frac{2}{V}}(1 + \sqrt{2}) = \pm\frac{\sqrt{2}\hbar}{V}(1 + \sqrt{2})$$

$$\langle \hat{L}_y \rangle = \frac{\langle L_+ \rangle - \langle L_- \rangle}{2i} = 0$$

(پ)

$$P_{+1} = \left(\sqrt{\frac{2}{V}}\right)^2 = \frac{2}{V}$$

(ت)

$$\hat{L}_+ |\psi\rangle = \hat{L}_+ \left[\sqrt{\frac{2}{V}} \hbar |1,0\rangle + A \sqrt{2} |1,1\rangle \right] = \sqrt{\frac{2}{V}} \hbar \sqrt{(1-0)(1+0+1)} |1,1\rangle = \frac{2}{\sqrt{V}} \hbar^2 |1,1\rangle$$

$$\hat{L}_- |\psi\rangle = \hat{L}_- \left[\hbar \sqrt{2} A |1,-1\rangle + \frac{2}{\sqrt{V}} \hbar |1,0\rangle \right] = \frac{2}{\sqrt{V}} \hbar \sqrt{(1+0)(1-0+1)} |1,-1\rangle = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{V}} \hbar^2 |1,-1\rangle$$

بنابراین:

$$\langle 1, m | \hat{L}_+ | \psi \rangle = \frac{2}{\sqrt{V}} \hbar^2 \delta_{1,m} \quad , \quad \langle 1, m | \hat{L}_- | \psi \rangle = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{V}} \hbar^2 \delta_{-1,m}$$

تمرین ۵-۲۹

ذره‌ای را با اندازه حرکت زاویه‌ای $j = 3/2$ در نظر بگیرید.(آ) ماتریس‌های نشان‌دهنده‌ی عملگرهای $\hat{J}_x$ ، $\hat{J}_y$ ، $\hat{J}_z$ و $\hat{J}^2$ را در پایه‌ی $\left\{ \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle \right\}$ بیابید.(ب) با استفاده از این ماتریس‌ها نشان دهید که $\hat{J}_x$ ، $\hat{J}_y$ و $\hat{J}_z$ در جابه‌جاگر $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z$ صدق می‌کنند.(پ) مقادیر میانگین $\hat{J}_x$ و $\hat{J}_x^2$ را بر حسب حالت $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ محاسبه کنید.(ت) $\Delta J_x \Delta J_y$ را بر حسب حالت $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ محاسبه کنید و ثابت کنید که این حاصل ضرب در اصل

عدم قطعیت هایزنبرگ صدق می‌کند.

حل:

(آ)

با توجه به اینکه:

$$\hat{J}^2 \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle = \frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) \hbar^2 \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle = \frac{15}{4} \hbar^2 \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle$$

$$\hat{J}_z \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle = m \hbar \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle$$

لذا:

$$\left\langle \frac{r}{2}, m' \left| \hat{j}_z \right| \frac{r}{2}, m \right\rangle = \frac{15}{4} \hbar \delta_{mm'}$$

$$\left\langle \frac{r}{2}, m' \left| \hat{j}_x \right| \frac{r}{2}, m \right\rangle = m \hbar \delta_{mm'}$$

پس:

$$\hat{j}_z = \frac{15}{4} \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{j}_x = \hbar \begin{pmatrix} \frac{r}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

و با توجه به رابطه‌ی ۷۰-۵ و ۷۱-۵ داریم:

$$\hat{j}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{j}_y = \frac{\hbar}{2i} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ -\sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

(ب)

$$[\hat{j}_x, \hat{j}_y] = \hat{j}_x \hat{j}_y - \hat{j}_y \hat{j}_x = \frac{\hbar^2}{4i} \left[\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ -\sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ -\sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ +\sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & +2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\hbar^2}{4i} \left(\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2\sqrt{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2\sqrt{2} & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ -2\sqrt{2} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2\sqrt{2} & 0 & -2 \end{pmatrix} \right) \\
 &= \frac{-i\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = i\hbar^2 \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-3}{2} \end{pmatrix} = i\hbar J_z
 \end{aligned}$$

(ب)

واضح است که حالت داده شده در واقع همان $\left| \frac{3}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle$ است؛ پس با توجه به روابط ۵-۲۰۲ و ۵-۲۰۸ داریم:

$$\langle \hat{J}_x \rangle = 0$$

$$\langle \hat{J}_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - \frac{1}{4} \right] = \frac{5}{4} \hbar^2$$

و یا با استفاده از نمایش ماتریسی داریم:

$$\langle \hat{J}_x \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{J}_x^2 \rangle &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4} (4 + 2) = \frac{5\hbar^2}{4}
 \end{aligned}$$

(ت)

با توجه به قسمت (پ) داریم:

$$\Delta J_x = \sqrt{\langle \hat{J}_x^2 \rangle - \langle \hat{J}_x \rangle^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \hbar = \Delta J_y$$

$$\Delta J_x \Delta J_y = \frac{1}{2} \hbar^2$$

پس:

از طرفی:

$$\langle [\hat{J}_x, \hat{J}_y] \rangle = \langle i\hbar \hat{J}_z \rangle = i\hbar \langle \hat{J}_z \rangle = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \hbar \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= i\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{i\hbar^2}{2}$$

بنابراین رابطه:

$$\Delta J_x \Delta J_y = \frac{1}{2} \hbar^2 \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{J}_x, \hat{J}_y] \rangle| = \frac{1}{2} \frac{\hbar^2}{2} = \frac{\hbar^2}{4}$$

صحت اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را تصدیق می‌کند.

تمرین ۵-۳۰

ماتریس‌های پاولی را در نظر بگیرید:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(آ) ثابت کنید که $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I$ که در آن I ، ماتریس واحد است. $\left(I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$ (ب) جابه‌جاگرهای $[\sigma_x, \sigma_y]$ ، $[\sigma_x, \sigma_z]$ و $[\sigma_y, \sigma_z]$ را محاسبه کنید.(پ) پاد جابه‌جایی $\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_x$ را محاسبه کنید.(ت) نشان دهید $e^{i\theta \sigma_y} = I \cos \theta + i \sigma_y \sin \theta$ که در آن I ماتریس واحد است.

(ث) عبارتی برای $e^{i\theta\sigma_z}$ در تشابه با عبارت σ_y استخراج کنید.

حل:

(ا)

با توجه به نمایش ماتریسی σ_i داریم:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

پس:

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \hat{I}$$

(ب)

$$[\sigma_x, \sigma_y] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i & 0 \\ 0 & -2i \end{pmatrix} = 2i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2i\sigma_z$$

$$[\sigma_x, \sigma_z] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2i \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -2i\sigma_y$$

$$[\sigma_y, \sigma_z] = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ 2i & 0 \end{pmatrix} = 2i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2i\sigma_x$$

پس:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$$

(پ)

$$\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(ت)

در اینجا از بسط مک-لورن برای $e^{i\theta\sigma_y}$ استفاده می‌کنیم:

$$e^{i\theta\sigma_y} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta\sigma_y)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta\sigma_y)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta\sigma_y)^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

اما:

$$(\sigma_y)^{2k} = (\sigma_y^2)^k = I^k = I$$

$$(\sigma_y)^{2k+1} = (\sigma_y)^{2k} \sigma_y = I \sigma_y = \sigma_y$$

پس:

$$e^{i\theta\sigma_y} = I \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i\sigma_y \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} = I \cos \theta + i\sigma_y \sin \theta$$

(ث)

به طور مشابه:

$$e^{i\theta\sigma_y} = I \cos \theta + i\sigma_z \sin \theta$$

تمرین ۵-۳۱

ذره‌ای با اسپین $\frac{3}{2}$ را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن عبارت است از

$$\hat{H} = \frac{\varepsilon_z}{\hbar} (\hat{S}_x^2 - \hat{S}_y^2) - \frac{\varepsilon_z}{\hbar} \hat{S}_z^2$$

و در آن ε ثابتی دارای بعد انرژی می‌باشد.

(آ) ماتریس هامیلتونی را بیابید و آن را برای یافتن ترازهای انرژی قطری کنید.

(ب) ویژه بردارها را پیدا کنید و ثابت کنید که ترازهای انرژی، تبهگن دو گانه‌اند.

حل:

با توجه به تمرین ۵-۲۹ داریم:

$$\hat{S}_x^2 = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 2\sqrt{3} & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_y^2 = \frac{-\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} -3 & 0 & +2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -7 & 0 & +2\sqrt{3} \\ +2\sqrt{3} & 0 & -7 & 0 \\ 0 & +2\sqrt{3} & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_z^2 = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

پس داریم:

$$\hat{H} = \frac{\varepsilon}{4} \begin{pmatrix} -9 & 0 & 4\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 4\sqrt{3} \\ 4\sqrt{3} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 4\sqrt{3} & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

اگر $|h\rangle$ ویژه حالت هامیلتونی با ویژه مقدار $\frac{\varepsilon}{4}h$ باشد داریم:

$$\hat{H}|h\rangle = \frac{\varepsilon}{4}h|h\rangle \quad (*)$$

$$\left(\hat{H} - \frac{\varepsilon}{4}h\hat{I} \right) |h\rangle = 0$$

از معادله‌ی اخیر نتیجه می‌شود که $|h\rangle$ در صورتی غیر صفر است که:

$$\det \left(\hat{H} - \frac{\varepsilon}{4}h\hat{I} \right) = 0$$

پس:

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{vmatrix} -9-h & 0 & 4\sqrt{3} & 0 \\ 0 & -1-h & 0 & 4\sqrt{3} \\ 4\sqrt{3} & 0 & -1-h & 0 \\ 0 & 4\sqrt{3} & 0 & -9-h \end{vmatrix} = (-9-h) \begin{vmatrix} -1-h & 0 & 4\sqrt{3} \\ 4\sqrt{3} & 0 & -9-h \end{vmatrix} + 4\sqrt{3} \begin{vmatrix} 0 & -1-h & 4\sqrt{3} \\ 0 & 4\sqrt{3} & -9-h \end{vmatrix} \\ &= (-9-h) \left[-(1+h)^2(9+h) + (4\sqrt{3})^2(1+h) \right] + 4\sqrt{3} \left[-4\sqrt{3}(1+h)(9+h) + (4\sqrt{3})^2 \right] \\ &= [(h+9)(h+1) - 48]^2 \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$h = -5 \pm 8 = -13, +3$$

$$\text{حال ویژه حالت‌های هامیلتونی را با تعریف } |h\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \text{ می‌یابیم.}$$

برای مورد $h = -13$ با توجه به رابطه‌ی (*) داریم:

$$-9a + 4c\sqrt{3} = -13a$$

$$-b + 4d\sqrt{3} = -13b$$

$$4a\sqrt{3} - c = -13c$$

$$4b\sqrt{3} - 9d = -13d$$

از این روابط نتیجه می‌شود:

$$a = -c\sqrt{3}$$

$$d = -b\sqrt{3}$$

با اعمال شرط بهنجارش $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1$ نتیجه می‌شود که:

$$|h_1 = -13\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad |h_2 = -13\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

بدروشی مشابه برای مورد $h = 3$ داریم:

$$|h_3 = 3\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |h_4 = 3\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

بنابراین $|h_i\rangle$ ها ویژه حالت‌های انرژی هستند که در این بین، $|h_1\rangle$ و $|h_2\rangle$ تبهگن با ویژه مقدار $-\frac{13}{4}\epsilon$ و $|h_3\rangle$ و $|h_4\rangle$ نیز تبهگن با ویژه مقدار $\frac{3}{4}\epsilon$ می‌باشند.

تمرین ۵-۳۲

ترازهای انرژی یک ذره با اسپین $\frac{5}{2}$ را بیابید که هامیلتونی آن

$$\hat{H} = \frac{\epsilon}{\hbar^2} (\hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2) + \frac{\epsilon}{\hbar} \hat{S}_z$$

است و در آن ϵ ثابتی دارای بعد انرژی می‌باشد. آیا این ترازهای انرژی تبهگن‌اند؟

حل:

با استفاده از رابطه $\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$ داریم:

$$\hat{H} = \frac{\epsilon}{\hbar^2} (\hat{S}^2 - \hat{S}_z^2) + \frac{\epsilon}{\hbar} \hat{S}_z$$

با توجه به شکل هامیلتونی، ویژه حالت‌های آن $|\frac{5}{2}, m\rangle$ ها هستند و ویژه مقادیر نیز عبارتند از:

$$E_m = \frac{\epsilon}{\hbar^2} \left[\left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{5}{2} + 1 \right) \hbar^2 - m^2 \hbar^2 \right] + \frac{\epsilon}{\hbar} m \hbar = \epsilon \cdot \left[\frac{35}{4} - m(m-1) \right]$$

به‌ازای مقادیر مختلف $m = \pm \frac{5}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{2}$ یعنی m داریم:

$$E_{\frac{5}{2}} = \varepsilon \cdot \left(\frac{35}{4} - \frac{5}{2} \times \frac{3}{2} \right) = 5\varepsilon.$$

$$E_{\frac{3}{2}} = \varepsilon \cdot \left(\frac{35}{4} - \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \right) = 8\varepsilon.$$

$$E_{\frac{1}{2}} = \varepsilon \cdot \left(\frac{35}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{-1}{2} \right) = 9\varepsilon$$

$$E_{-\frac{1}{2}} = \varepsilon \cdot \left(\frac{35}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{-3}{2} \right) = 8\varepsilon.$$

$$E_{-\frac{3}{2}} = \varepsilon \cdot \left(\frac{35}{4} + \frac{3}{2} \times \frac{-5}{2} \right) = 5\varepsilon.$$

$$E_{-\frac{5}{2}} = \varepsilon \cdot \left(\frac{35}{4} + \frac{5}{2} \times \frac{-7}{2} \right) = 0.$$

پس حالت‌های $\left| \frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle$ و $\left| \frac{5}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle$ تبهگن با ویژه مقدار 5ε و $\left| \frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle$ و $\left| \frac{5}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$ نیز تبهگن با ویژه مقدار 8ε هستند و حالت‌های $\left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$ و $\left| \frac{3}{2}, -\frac{5}{2} \right\rangle$ فاقد تبهگنی می‌باشند.

تمرین ۵-۳۳

الکترونی را در نظر بگیرید که جهت اسپین آن در صفحه‌ی xy واقع است.

(آ) ویژه مقدارها (λ_1, λ_2) و ویژه حالت‌های $(|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle)$ عملگر اسپین الکترون، $\hat{S}$ ، را بیابید.

(ب) با فرض این که حالت اولیه‌ی الکترون به صورت زیر باشد:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{3}|\lambda_1\rangle + \frac{2\sqrt{2}}{3}|\lambda_2\rangle$$

احتمال به دست آوردن مقدار $\hat{S} = \frac{-\hbar}{2}$ را پس از اندازه‌گیری اسپین الکترون پیدا کنید.

حل:
(۱)

در واقع در اینجا با حالت خاصی از مسئله حل شده‌ی ۵-۵ در متن کتاب روبرو هستیم به طوری که:

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

بنابراین:

$$|\lambda_+\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ e^{i\varphi} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

و

$$|\lambda_-\rangle = \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ e^{i\varphi} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

(ب)

$$P_{\frac{-1}{2}} = \left| \left\langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| \psi \right\rangle \right|^2 = \left| \langle \lambda_- | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \right)^2 = \frac{8}{9}$$

تمرین ۵-۳۴

(آ) ویژه مقدارهای $(\lambda_+$ و $\lambda_-)$ و ویژه حالت‌های $(|\lambda_+\rangle$ و $|\lambda_-\rangle)$ مربوط به عملگر اسپین $\vec{S}$ یک الکترون وقتی $\vec{S}$ در راستای یک بردار یکه‌ی دلخواه $\vec{n}$ در صفحه‌ی yz قرار دارد را بیابید.
(ب) با فرض این که حالت اولیه‌ی الکترون به صورت زیر باشد:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{3}|\lambda_+\rangle + \frac{\sqrt{2}}{3}|\lambda_-\rangle$$

احتمال به دست آوردن یک مقدار $\hat{S} = \frac{\hbar}{2}$ را پس از اندازه‌گیری اسپین الکترون پیدا کنید.

حل:

(آ)

در اینجا نیز با حالت خاصی از مسئله‌ی حل شده ۵-۵ روبرو هستیم به طوری که:

$$\varphi = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$|\lambda_+\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$|\lambda_-\rangle = \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

(ب)

$$P_{\frac{1}{2}} = \left| \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \psi \right\rangle \right|^2 = \left| \left\langle \frac{1}{2} \middle| \psi \right\rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

تمرین ۵-۳۵

ذره‌ای را با اسپین $\frac{3}{2}$ در نظر بگیرید. ماتریس مؤلفه‌ی اسپین را در راستای یک بردار یکه با جهت دلخواه $\vec{n}$ بیابید. ویژه مقدارها و ویژه بردارها را پیدا کنید. (راهنمایی:

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \varphi) \vec{i} + (\sin \theta \sin \varphi) \vec{j} + (\cos \theta) \vec{k}$$

حل:

در واقع در اینجا باید ویژه حالت‌ها و ویژه مقادیر عملگر $\hat{S} \cdot \vec{n}$ را بیابیم که در آن:

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \varphi) \vec{i} + (\sin \theta \sin \varphi) \vec{j} + (\cos \theta) \vec{k}$$

پس:

$$\begin{aligned} \hat{S} \cdot \vec{n} &= \hat{S}_x \sin \theta \cos \varphi + \hat{S}_y \sin \theta \sin \varphi + \hat{S}_z \cos \theta \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi + \frac{i\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -\sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \sin \theta \sin \varphi \\ &\quad + \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \cos \theta \end{aligned}$$

یا:

$$\hat{S} \cdot \vec{n} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 3 \cos \theta & \sqrt{3} \sin \theta e^{-i\varphi} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} \sin \theta e^{i\varphi} & \cos \theta & 2 \sin \theta e^{-i\varphi} & 0 \\ 0 & 2 \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta & \sqrt{3} \sin \theta e^{-i\varphi} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \sin \theta e^{i\varphi} & -3 \cos \theta \end{pmatrix}$$

اگر $\left| \frac{3}{2}, m \right\rangle$ ها را ویژه حالت‌های $\hat{S} \cdot \vec{n}$ با ویژه مقدار $\frac{m\hbar}{2}$ در نظر بگیریم داریم:

$$\hat{S} \cdot \vec{n} \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle = \frac{m\hbar}{2} \left| \frac{3}{2}, m \right\rangle \quad (*)$$

یا:

$$\left(\hat{S} \cdot \vec{n} - \frac{m\hbar}{2} \right) \left| \frac{r}{2}, m \right\rangle = 0$$

برای آنکه $\left| \frac{r}{2}, m \right\rangle$ ها غیر صفر باشند لازم است که:

$$\det \left(\hat{S} \cdot \vec{n} - \frac{m\hbar}{2} \right) = 0$$

بدیهی است که حل معادله‌ی فوق به $m = \pm 3, \pm 1$ منجر می‌شود.

اگر $\left| \frac{r}{2}, \frac{r}{2} \right\rangle$ را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$\left| \frac{r}{2}, \frac{r}{2} \right\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

در این صورت از رابطه‌ی (*) نتیجه می‌شود که:

$$ra \cos \theta + b\sqrt{r} \sin \theta e^{-i\varphi} = ra$$

$$a\sqrt{r} \sin \theta e^{i\varphi} + b \cos \theta + rc \sin \theta e^{-i\varphi} = rb$$

$$rb \sin \theta e^{i\varphi} - c \cos \theta + d\sqrt{r} \sin \theta e^{-i\varphi} = rc$$

$$c\sqrt{r} \sin \theta e^{i\varphi} - rd \cos \theta = rd$$

از حل این دستگاه معادلات نتیجه می‌شود که:

$$a = \frac{b \sin \theta e^{-i\varphi}}{\sqrt{r}(1 - \cos \theta)} = \frac{c(1 + \cos \theta) e^{-r i \varphi}}{\sqrt{r}(1 - \cos \theta)} = \frac{d(1 + \cos \theta)^r e^{-r i \varphi}}{\sin \theta (1 - \cos \theta)}$$

با اعمال شرط بهنجارش $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1$ تا حد یک عامل فاز دلخواه عبارتست از:

$$\left| \frac{r}{2}, \frac{r}{2} \right\rangle = \frac{(1 + \cos \theta) \sqrt{1 + \cos \theta}}{r} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\sqrt{r}(1 - \cos \theta)}{\sin \theta} e^{i\varphi} \\ \frac{\sqrt{r}(1 - \cos \theta) e^{r i \varphi}}{1 + \cos \theta} \\ \frac{\sin \theta e^{r i \varphi} (1 - \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)^r} \end{pmatrix}$$

به‌طور مشابه با تعریف:

$$\left| \frac{r}{r}, \frac{1}{r} \right\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

داریم:

$$r a \cos \theta + b \sqrt{r} \sin \theta e^{-i\varphi} = a$$

$$a \sqrt{r} \sin \theta e^{i\varphi} + b \cos \theta + r c \sin \theta e^{-i\varphi} = b$$

$$r b \sin \theta - c \cos \theta + d \sqrt{r} \sin \theta e^{-i\varphi} = c$$

$$c \sqrt{r} \sin \theta e^{i\varphi} - r d \cos \theta = d$$

که نتیجه می‌دهد:

$$a = \frac{b \sqrt{r} e^{-i\varphi} \sin \theta}{(1 - r \cos \theta)} = \frac{-\sqrt{r} c (1 + \cos \theta) e^{-r i \varphi}}{1 + r \cos \theta} = \frac{-d (\cos \theta + 1) e^{-r i \varphi}}{\sin \theta}$$

با اعمال شرط بهنجارش $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1$ تا حد یک عامل فاز دلخواه عبارتست

از:

$$\left| \frac{r}{r}, \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{r(1 + \cos \theta) \sqrt{1 - \cos \theta}}{-9 \cos^2 \theta + 6 \cos \theta - \cos \theta + 1} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{(1 - r \cos \theta) e^{i\varphi}}{\sqrt{r} \sin \theta} \\ -e^{r i \varphi} (r \cos \theta + 1) \\ \frac{\sqrt{r} (1 + \cos \theta)}{-\sin \theta e^{r i \varphi}} \\ \cos \theta + 1 \end{pmatrix}$$

به‌طریق مشابه می‌توان حالت‌های $\left| \frac{r}{r}, \pm \frac{1}{r} \right\rangle$ را نیز یافت.

تمرین ۵-۳۶

نشان دهید که:

$$[\hat{J}_x \hat{J}_y, \hat{J}_z] + [\hat{J}_x, \hat{J}_y \hat{J}_z] = i\hbar (\hat{J}_x^2 - r \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2)$$

حل:

با توجه به روابط:

$$[\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] \hat{C} + \hat{B} [\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A} \hat{B}, \hat{C}] = \hat{A} [\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}] \hat{B}$$

داریم:

$$[\hat{J}_x \hat{J}_y, \hat{J}_z] + [\hat{J}_x, \hat{J}_y \hat{J}_z] = \hat{J}_x [\hat{J}_y, \hat{J}_z] + [\hat{J}_x, \hat{J}_z] \hat{J}_y + [\hat{J}_x, \hat{J}_y] \hat{J}_z + \hat{J}_y [\hat{J}_x, \hat{J}_z]$$

$$= \hat{J}_x (i\hbar \hat{J}_x) + (-i\hbar) \hat{J}_y \hat{J}_y + (i\hbar \hat{J}_z) \hat{J}_z + \hat{J}_y (-i\hbar \hat{J}_y)$$

$$= i\hbar (\hat{J}_x^2 - \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2)$$

تمرین ۵-۳۷

ویژه مقدارهای عملگرهای $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ را برای هریک از حالت‌های زیر پیدا کنید:

(آ) $Y_{r1}(\theta, \varphi)$

(ب) $Y_{r-r}(\theta, \varphi)$

(پ) $\frac{1}{\sqrt{2}} [Y_{rr}(\theta, \varphi) + Y_{r-r}(\theta, \varphi)]$

(ت) $Y_{r.}(\theta, \varphi)$

حل:
(آ)برای یافتن ویژه مقادیر $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ اثر آنها را بر روی حالت‌های داده شده می‌یابیم.

$$\hat{L}_z Y_{r1}(\theta, \varphi) = r(r+1)\hbar Y_{r1}(\theta, \varphi) = r\hbar Y_{r1}(\theta, \varphi)$$

$$\hat{L}_z Y_{r-r}(\theta, \varphi) = -r\hbar Y_{r-r}(\theta, \varphi) = -r\hbar Y_{r-r}(\theta, \varphi)$$

پس ویژه مقادیر $\hat{L}_z$ به ترتیب $r\hbar$ ، $-r\hbar$ هستند.

(ب)

برای این حالت، ویژه مقدار $\hat{L}^2$ ، $r(r+1)\hbar^2$ و ویژه مقدار $\hat{L}_z$ ، $-r\hbar$ است.

(پ)

$$\hat{L}^2 \frac{1}{\sqrt{2}} [Y_{rr}(\theta, \varphi) + Y_{r-r}(\theta, \varphi)] = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{L}^2 Y_{rr}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{L}^2 Y_{r-r}(\theta, \varphi)$$

$$= r(r+1)\hbar^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} Y_{rr}(\theta, \varphi) + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{r-r}(\theta, \varphi) \right)$$

$$\hat{L}_z \frac{1}{\sqrt{2}} [Y_{rr}(\theta, \varphi) + Y_{r-r}(\theta, \varphi)] = \hbar \left(\frac{1}{\sqrt{2}} Y_{rr}(\theta, \varphi) - \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{r-r}(\theta, \varphi) \right)$$

پس حالت داده شده، ویژه حالت $\hat{L}^2$ با ویژه مقدار $12\hbar^2$ است ولی ویژه حالت $\hat{L}_z$ نیست.
(ت)

حالت داده شده، ویژه حالت $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ با ویژه مقدار $20\hbar^2$ و صفر است.

تمرین ۵-۳۸

با استفاده از رابطه‌های کلی زیر:

$$|\psi_x\rangle_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} \right], \quad |\psi_y\rangle_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix} \right]$$

معادله‌های ویژه مقداری زیر را ثابت کنید:

$$\hat{S}_x |\psi_x\rangle_{\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} |\psi_x\rangle_{\pm}, \quad \hat{S}_y |\psi_y\rangle_{\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} |\psi_y\rangle_{\pm}$$

حل:

با توجه به اینکه:

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$|\psi_x\rangle_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$$

لذا داریم:

$$\hat{S}_x |\psi_x\rangle_{\pm} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} |\psi_x\rangle_{\pm}$$

و

$$\hat{S}_y |\psi_y\rangle_{\pm} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 \\ i \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} |\psi_y\rangle_{\pm}$$

فصل ششم

مسأله‌های سه بُعدی

تمرین ۶-۱

ذره‌ای بدون اسپین به جرم m محدود به حرکت در صفحه‌ی xy تحت اثر پتانسیل نوسانگر هماهنگ $\hat{V}(x,y) = \frac{1}{2}m\omega^2(\hat{x}^2 + \hat{y}^2)$ برای همه‌ی مقادیر x و y است.

(آ) نشان دهید که هامیلتونی $\hat{H}$ این ذره را می‌توان به صورت جمع دو هامیلتونی یک‌بعدی آشنای $\hat{H}_x$ و $\hat{H}_y$ نوشت. سپس نشان دهید که $\hat{H}$ با $\hat{L}_z = \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x$ جابه‌جا می‌شود.

(ب) عبارتی برای ترازهای انرژی $E_{n_x n_y}$ بیابید.

(پ) انرژی‌های پایین‌ترین چهار تراز و تبهگنی‌های متناظر آن‌ها را بیابید.

(ت) تبهگنی g_n حالت برانگیخته‌ی n ام را به صورت تابعی از عدد کوانتومی n ($n = n_x + n_y$) بیابید.

(ث) اگر بردار حالت n اُمین حالت برانگیخته $\psi_{n_x}(x)\psi_{n_y}(y)$ با $\langle xy|n\rangle = \langle x|n_x\rangle\langle y|n_y\rangle$ باشد، مقدار چشمداشتی عملگر $\hat{A} = \hat{x}^2 + \hat{y}^2$ را در حالت $|n\rangle$ به صورت تابعی از اعداد کوانتومی n_x و n_y محاسبه کنید.

حل:

این پتانسیل دو بُعدی شامل دو پتانسیل مستقل یک بُعدی است.

۱. نوسانگر هارمونیک در امتداد محور x

۲. نوسانگر هارمونیک در امتداد محور y

پس انرژی توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$E_{n_x, n_y} = \hbar\omega \left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \hbar\omega \left(n_y + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega (n_x + n_y + 1)$$

اما برای محاسبه‌ی $[\hat{H}, \hat{L}_z]$ داریم:

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{L}_z] &= \left[\frac{\hat{P}^2}{2m} + \hat{V}(\hat{x}, \hat{y}), \hat{L}_z \right] = \left[\frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2 + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{y}^2, \hat{L}_z \right] \\ &= \frac{1}{2m} [\hat{P}^2, \hat{L}_z] + \frac{1}{2} m\omega^2 [\hat{x}^2, \hat{L}_z] + \frac{1}{2} m\omega^2 [\hat{y}^2, \hat{L}_z] \end{aligned}$$

با توجه به حل ارائه شده در تمرین (۵-۱) داریم:

$$[\hat{P}^2, \hat{L}_z] = 0, [\hat{x}^2, \hat{L}_z] = 0, [\hat{y}^2, \hat{L}_z] = 0.$$

لذا:

$$[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0.$$

چهار حالت با پایین‌ترین انرژی عبارتند از:

$$E_{n_x+n_y=0} = E_{00} = \hbar\omega \quad ; \quad \text{بدون تهگنی}$$

$$E_{n_x+n_y=1} = E_{10} = E_{01} = 2\hbar\omega \quad ; \quad \text{تهگنی دوگانه}$$

$$E_{n_x+n_y=2} = E_{20} = E_{11} = E_{02} = 3\hbar\omega \quad ; \quad \text{تهگنی سه‌گانه}$$

$$E_{n_x+n_y=3} = E_{30} = E_{21} = E_{12} = E_{03} = 4\hbar\omega \quad ; \quad \text{تهگنی چهارگانه}$$

بنابراین g_n ، تهگنی مربوط به حالت برانگیخته n ام، عبارتست از:

$$g_n = n + 1$$

برای محاسبه‌ی مقدار چشمداشتی عملگر $\hat{A}$ با استفاده از حالت $|n\rangle$ داریم:

$$\begin{aligned} \langle \hat{A} \rangle_n &= \langle n_y | \langle n_x | \hat{x}^\dagger | n_x \rangle | n_y \rangle + \langle n_x | \langle n_y | \hat{y}^\dagger | n_y \rangle | n_x \rangle \\ &= \langle n_y | n_y \rangle \langle n_x | \hat{x}^\dagger | n_x \rangle + \langle n_x | n_x \rangle \langle n_y | \hat{y}^\dagger | n_y \rangle \\ &= \langle n_x | \hat{x}^\dagger | n_x \rangle + \langle n_y | \hat{y}^\dagger | n_y \rangle = \langle n_x | \hat{x}^\dagger | n_x \rangle + \frac{\hbar}{2m\omega} (2n_y + 1) \end{aligned}$$

از طرفی با توجه به رابطه‌ی ۴-۱۸۴ داریم:

$$|a\rangle = \hat{x}^\dagger |n_x\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (\hat{a}_x^\dagger + \hat{a}_x) |n_x\rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\hbar}{2mw} (\sqrt{n_x} \sqrt{n_x - 1} |n_x - 2\rangle + \sqrt{n_x + 1} \sqrt{n_x + 2} |n_x + 2\rangle + (2n_x + 1) |n_x\rangle) \\
\langle n_x | \hat{x}^2 | n_x \rangle &= \langle \alpha | \alpha \rangle = \left(\frac{\hbar}{2mw} \right)^2 (n_x^2 - n_x + n_x^2 + 2n_x + 2 + 4n_x^2 + 4n_x + 1) \\
&= \left(\frac{\hbar}{2mw} \right)^2 (6n_x^2 + 6n_x + 3)
\end{aligned}$$

پس:

$$\langle \hat{A} \rangle_n = \left(\frac{\hbar}{2mw} \right)^2 (6n_x^2 + 6n_x + 3) + \frac{\hbar}{2mw} (2n_y + 1)$$

تمرین ۶-۲

ذره‌ای به جرم m در صفحه‌ی xy در پتانسیل

$$V(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 & 0 < x < a \\ +\infty & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

حرکت می‌کند.

(آ) معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان را برای این ذره بنویسید و آن را به مجموعه‌ای از معادلات یک‌بعدی آشنا، ساده کنید.

(ب) ویژه توابع بهنجار شده و ویژه مقدارهای انرژی را بیابید.

حل:

با توجه به معادله‌ی شرودینگر:

$$\hat{H}\psi(x, y) = E\psi(x, y)$$

لذا $\psi(x, y)$ در همه جا صفر است مگر در ناحیه‌ی $0 < x < a$ و برای این ناحیه داریم:

$$\left(\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 \right) \psi(x, y) = E\psi(x, y)$$

با تعریف:

$$\psi(x, y) = X(x)Y(y)$$

داریم:

$$Y(y) \frac{\hat{p}_x^2}{2m} X(x) + X(x) \left(\frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 \right) Y(y) = EX(x)Y(y)$$

با تقسیم طرفین رابطه‌ی فوق بر $X(x)Y(y)$ داریم:

$$\frac{1}{X(x)} \frac{\hat{P}_x^2}{2m} X(x) + \frac{1}{Y(y)} \left(\frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 \right) Y(y) = E$$

این معادله منجر می‌شود به دو معادله‌ی زیر:

$$\frac{P_x^2}{2m} X(x) = E_x X(x)$$

و

$$\left(\frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 \right) Y(y) = E_y Y(y)$$

به‌طوری‌که:

$$E = E_x + E_y$$

واضح است که:

$$X_{n_x}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right), \quad Y_{n_y}(y) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^{n_y} n_y! y}} e^{-\frac{y^2}{2y_0^2}} H_{n_y}\left(\frac{y}{y_0}\right)$$

و بنابراین:

$$\psi_{n_x n_y}(x, y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^{n_y} n_y! y}} e^{-\frac{y^2}{2y_0^2}} H_{n_y}\left(\frac{y}{y_0}\right)$$

و

$$E_{n_x n_y} = \frac{n_x^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \hbar \omega \left(n_y + \frac{1}{2} \right)$$

تمرین ۳-۶

ذره‌ای به جرم m در صفحه‌ی xy در چاه مستطیلی دو بُعدی زیر:

$$V(x, y) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a, 0 < y < b \\ +\infty & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

حرکت می‌کند. با ساده‌سازی معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان به مجموعه‌ای از معادلات یک بُعدی آشنا تر، توابع موج و ترازهای انرژی این ذره را بیابید.

حل:

در واقع پتانسیل داده شده شامل دو پتانسیل یک بُعدی مستقل است:

۱. ذره در جعبه در امتداد محور x با دیواره‌های واقع در $x = a$ و $x = 0$

۲. ذره در جعبه در امتداد محور y با دیواره‌های واقع در $y = b$ و $y = 0$

پس:

$$\psi_{n_x n_y}(x, y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sqrt{\frac{2}{b}} \sin\left(\frac{n_y \pi y}{b}\right)$$

$$E_{n_x n_y} = \frac{n_x^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \frac{n_y^2 \pi^2 \hbar^2}{2mb^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} \right)$$

تمرین ۴-۶

پتانسیل نوسانگر هماهنگ سه‌بعدی ناهمسانگرد زیر را در نظر بگیرید:

$$V(x, y) = \frac{1}{2} m (\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2 + \omega_z^2 z^2)$$

(آ) ترازهای انرژی را برحسب ω_x ، ω_y و ω_z محاسبه کنید.

(ب) $[\hat{H}, \hat{L}_z]$ را حساب کنید. آیا انتظار دارید توابع موج، ویژه توابع $\hat{L}^2$ باشند؟

(پ) پایین‌ترین سه تراز انرژی را برای حالت $\omega_x = \omega_y = 2\omega/3$ بیابید و تبهگنی هر تراز را مشخص کنید.

حل:

(آ)

پتانسیل سه بُعدی داده شده در این مسأله در واقع شامل سه پتانسیل یک بُعدی مستقل است:

۱. نوسانگر هارمونیک با فرکانس w_x در امتداد محور x

۲. نوسانگر هارمونیک با فرکانس w_y در امتداد محور y

۳. نوسانگر هارمونیک با فرکانس w_z در امتداد محور z

بنابراین:

$$E_{n_x n_y n_z} = \hbar w_x \left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \hbar w_y \left(n_y + \frac{1}{2} \right) + \hbar w_z \left(n_z + \frac{1}{2} \right)$$

(ب)

با توجه به تمرین ۵-۱ و ۵-۲ و حل ارائه شده برای آنها داریم:

$$[\hat{x}^2, \hat{L}_z] = [\hat{y}^2, \hat{L}_z] = [\hat{z}^2, \hat{L}_z] = 0$$

و

$$[\hat{P}^r, \hat{L}_z] = 0$$

بنابراین:

$$[\hat{H}, \hat{L}_z] = \frac{1}{2m} [\hat{P}^r, \hat{L}_z] + \frac{1}{2} m \omega_x^2 [\hat{x}^r, \hat{L}_z] + \frac{1}{2} m \omega_y^2 [\hat{y}^r, \hat{L}_z] + \frac{1}{2} m \omega_z^2 [\hat{z}^r, \hat{L}_z] = 0$$

از اینجا نتیجه می‌شود که:

$$[\hat{H}, \hat{L}_z^r] = 0$$

و به‌طور مشابه:

$$[\hat{H}, \hat{L}_x^r] = [\hat{H}, \hat{L}_y^r] = 0$$

پس:

$$[\hat{H}, \hat{L}^r] = [\hat{H}, \hat{L}_x^r + \hat{L}_y^r + \hat{L}_z^r] = 0$$

چون $\hat{L}^r, \hat{H}$ با هم جابه‌جا می‌شوند لذا ویژه توابع غیر تبه‌گن $\hat{H}$ ، ویژه توابع $\hat{L}^r$ نیز خواهند بود. (پ)

با فرض $w_x = w_y = \frac{2w_z}{3} = w$ داریم:

$$\begin{aligned} E_{n_x n_y n_z} &= \hbar w \left(n_x + \frac{1}{2} \right) + \hbar w \left(n_y + \frac{1}{2} \right) + \frac{2}{3} \hbar w \left(n_z + \frac{1}{2} \right) \\ &= \hbar w \left(n_x + n_y + \frac{2}{3} n_z + \frac{3}{2} \right) = \hbar w \left(n + \frac{3}{2} \right) = E_n \end{aligned}$$

که در رابطه‌ی فوق $n = n_x + n_y + \frac{2}{3} n_z$ می‌باشد. بنابراین سه تراز با پایین‌ترین انرژی عبارتند از:

$$E_0 = E_{\dots} = \frac{3}{2} \hbar w \quad ; \quad \text{بدون تبه‌گنی}$$

$$E_1 = E_{1..} = E_{.1.} = \frac{5}{2} \hbar w \quad ; \quad \text{تبه‌گنی دوگانه}$$

$$E_{\frac{2}{3}} = E_{..1} = \frac{7}{2} \hbar w \quad ; \quad \text{بدون تبه‌گنی}$$

تمرین ۵-۶

ذره‌ای بدون اسپین و به جرم m را در نظر بگیرید که محدود به حرکت تحت اثر پتانسیل سه‌بعدی زیر است:

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a, 0 < y < a, 0 < z < b \\ +\infty & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

(آ) عبارتی برای ترازهای انرژی $E_{n_x n_y n_z}$ و توابع موج متناظر آن‌ها بیابید.

(ب) اگر $a = 2b$ باشد، انرژی‌های پایین‌ترین پنج تراز انرژی و تبهگنی‌های آن‌ها را بیابید.

حل:

(آ)

در واقع پتانسیل داده شده شامل سه پتانسیل مستقل یک بعدی است:

۱. ذره در جعبه در امتداد محور x با دیواره‌های واقع در $x = 0$ و $x = a$

۲. ذره در جعبه در امتداد محور y با دیواره‌های واقع در $y = 0$ و $y = a$

۳. ذره در جعبه در امتداد محور z با دیواره‌های واقع در $z = 0$ و $z = b$

بنابراین:

$$\psi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right) \sqrt{\frac{2}{b}} \sin\left(\frac{n_z \pi z}{b}\right)$$

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n_x^2}{2ma^2} + \frac{\hbar^2 \pi^2 n_y^2}{2ma^2} + \frac{\hbar^2 \pi^2 n_z^2}{2mb^2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{a^2} + \frac{n_z^2}{b^2} \right)$$

(ب)

اگر $a = 2b$ آنگاه:

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{4b^2} + \frac{n_y^2}{4b^2} + \frac{n_z^2}{b^2} \right) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m(4b^2)} (n_x^2 + n_y^2 + 4n_z^2) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{4mb^2} n^2 = E_n$$

بدطوری‌که:

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + 4n_z^2$$

پس پنج حالت با پایین‌ترین انرژی عبارتند از:

$$E_{\sqrt{4}} = E_{111} = \frac{4\hbar^2 \pi^2}{4mb^2} \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{\sqrt{5}} = E_{211} = E_{121} = \frac{9\hbar^2 \pi^2}{4mb^2} \quad ; \quad \text{تبهگنی دوگانه}$$

$$E_{\sqrt{12}} = E_{221} = \frac{12\hbar^2 \pi^2}{4mb^2} \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{\sqrt{17}} = E_{311} = E_{131} = \frac{17\hbar^2 \pi^2}{4mb^2} \quad ; \quad \text{تبهگنی دوگانه}$$

$$E_{\sqrt{v}} = E_{\tau\tau\tau} = E_{\tau\tau\tau} = \frac{17h^2\pi^2}{8mb^2} \quad ; \quad \text{تبهگنی دوگانه}$$

تمرین ۶-۶

ذره‌ای به جرم m در پتانسیل سه‌بعدی زیر حرکت می‌کند:

$$V(x, y, z) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 & 0 < x < a, 0 < y < a, z > 0 \\ +\infty & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

(آ) معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان را برای این ذره بنویسید و آن را به مجموعه‌ای از معادلات یک‌بعدی آشنا ساده کنید. آن‌گاه توابع موج بهنجار $\psi_{n_x n_y n_z}(x, y, z)$ را بیابید.

(ب) ویژه‌مقدارهای مجاز انرژی این ذره را بیابید و نشان دهید که می‌توان آن‌ها را به صورت $E_{n_x n_y n_z} = E_{n_x n_y} + E_{n_z}$ نوشت.

(پ) پایین‌ترین چهار تراز انرژی را در صفحه‌ی xy (یعنی $E_{n_x n_y}$) و تبهگنی‌ها متناظر آن‌ها را بیابید.

حل:

(آ)

با توجه به معادله‌ی شرودینگر:

$$\left[\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) \right] \psi(x, y, z) = E \psi(x, y, z)$$

$\psi(x, y, z)$ فقط در ناحیه‌ی $0 < x < a$ و $0 < y < a, z > 0$ غیر صفر است و در خارج از این ناحیه به علت نامتناهی بودن پتانسیل؛ صفر است. برای ناحیه‌ی مذکور با تعریف $\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$ داریم:

$$\left(\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 \right) X(x)Y(y)Z(z) = E X(x)Y(y)Z(z)$$

در نتیجه:

$$YZ \frac{\hat{p}_x^2}{2m} X + XZ \frac{\hat{p}_y^2}{2m} Y + XY \left(\frac{\hat{p}_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 \right) Z(z) = EX(x)Y(y)Z(z)$$

با تقسیم طرفین رابطه‌ی اخیر بر XYZ داریم:

$$\frac{1}{X} \frac{\hat{p}_x^2}{2m} X + \frac{1}{Y} \frac{\hat{p}_y^2}{2m} Y + \frac{1}{Z} \left(\frac{\hat{p}_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 z^2 \right) Z(z) = E$$

در نتیجه:

$$\frac{\hat{P}_x}{\hbar m} X = E_x X, \frac{\hat{P}_y}{\hbar m} Y = E_y Y, \left(\frac{\hat{P}_z}{\hbar m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{z} \right) Z(z) = E_z Z$$

به‌طوری‌که:

$$E = E_x + E_y + E_z$$

واضح است که:

$$X_{n_x}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right); \quad n_x = 1, 2, \dots$$

$$Y_{n_y}(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right); \quad n_y = 1, 2, \dots$$

و جواب $Z(z)$ همان جواب نوسانگر هارمونیک است. اما چون تابع موج باید در $z=0$ صفر شود، لذا فقط جواب‌های با پاریته فرد قابل قبول هستند یعنی:

$$Z_{n_z}(z) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^{n_z} n_z! z}} e^{\frac{-z^2}{2z}} H_{n_z}\left(\frac{z}{z}\right); \quad n_z = 1, 3, 5, \dots$$

لذا:

$$\psi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right) Z_{n_z}(z); \quad n_x = 1, 2, \dots, n_y = 1, 2, \dots, n_z = 1, 3, 5, \dots$$

(ب)

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{n_x^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \frac{n_y^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \hbar \omega \left(n_z + \frac{1}{2} \right) = E_{n_x n_y} + E_{n_z}$$

به‌طوری‌که:

$$E_{n_x n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2), \quad E_{n_z} = \hbar \omega \left(n_z + \frac{1}{2} \right)$$

(پ)

با تعریف:

$$E_n = E_{n_x n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$$

که در آن $n^2 = n_x^2 + n_y^2$ می‌باشد. چهار حالت با پایین‌ترین انرژی در صفحه‌ی xy عبارتند از:

$$E_{\sqrt{z}} = E_{11} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{\sqrt{z}} = E_{12} = E_{21} = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad ; \quad \text{تبهگنی دوگانه}$$

$$E_{\sqrt{z}} = E_{22} = \frac{8\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{\sqrt{z}} = E_{31} = E_{13} = \frac{10\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad ; \quad \text{تبهگنی دوگانه}$$

تمرین ۶-۷

ذره‌ای به جرم m در پتانسیل $V(x, y, z) = V_1(x, y) + V_z(z)$ حرکت می‌کند که در آن

$$V_1(x, y) = \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad \text{و} \quad V_z(z) = \begin{cases} 0 & 0 \leq z \leq a \\ +\infty & \text{سایر جاها} \end{cases}$$

(آ) ترازهای انرژی و تابع موج این ذره را محاسبه کنید.

(ب) اکنون $V_z(z)$ را خاموش کنیم (یعنی m تنها در معرض $V_1(x, y)$ قرار دارد) تبهگنی g_n تراز انرژی n ام را محاسبه کنید (توجه کنید که $n = n_x + n_y$).

حل:

(آ)

پتانسیل داده شده را می‌توان به صورت مجموع سه پتانسیل مشکل یک بُعدی نوشت:

۱. نوسانگر هارمونیک یک بُعدی با فرکانس ω در امتداد محور x

۲. نوسانگر هارمونیک یک بُعدی با فرکانس ω در امتداد محور y

۳. ذره در جعبه در امتداد محور z با دیواره‌های واقع در $z = 0$ و $z = a$.

پس طبق بحثی که در متن کتاب وجود دارد داریم:

$$\psi_{n_x n_y n_z} = X_{n_x}(x) Y_{n_y}(y) \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_z \pi z}{a}\right)$$

به طوری که $X_{n_x}(x)$ و $Y_{n_y}(y)$ ویژه توابع نوسانگر هماهنگ یک بُعدی با فرکانس ω به ترتیب در امتداد محورهای x و y هستند و:

$$E_{n_x n_y n_z} = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2 \pi^2 n_z^2}{2ma^2}$$

(ب)

اگر $V_r(z)$ خاموش شود در این صورت در امتداد محور z ، ذره آزاد خواهد شد و خواهیم داشت:

$$E_{n_x n_y}(k_z) = \hbar \omega (n_x + n_y + 1) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

که در اینجا k_z هر مقدار حقیقی را می‌تواند اختیار کند. بنابراین کلیه حالت‌های $\psi_{n_x n_y}(\pm k_z; x, y, z)$ که در مورد آنها $n_x + n_y = n$ باشد، تبهگن هستند و دارای انرژی:

$$E_{n_x n_y}(k_z) = \hbar \omega (n + 1) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

می‌باشند. پس تبهگنی مربوط به سطح انرژی n عبارتست از:

$$g_n = 2(n + 1)$$

تمرین ۶-۸

یک اتم مئونی را در نظر بگیرید که شامل هسته‌ای با z پروتون (بدون نوترون) و یک مئون منفی در حال حرکت حول آن است. بار مئون $-e$ و جرم آن 207 برابر جرم الکترون است، $(m_\mu = 207m_e)$. برای یک اتم مئونی با $Z = 6$ موارد زیر را محاسبه کنید:

(آ) شعاع نخستین مدار بور

(ب) انرژی‌های حالت پایه، اولین و دومین حالت برانگیخته

(پ) بسامد وابسته به گذارهای

$$n_i = 2 \rightarrow n_f = 1 \quad n_i = 3 \rightarrow n_f = 1 \quad n_i = 3 \rightarrow n_f = 2$$

حل:

(آ)

طبق رابطه‌ی مربوط به شعاع داریم:

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{\mu e^2} n^2$$

که در آن:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_\mu} + \frac{1}{m_p}$$

در واقع می‌توان نوشت:

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{m_e e^2} \mu \simeq 0.0054 n^2 a_0$$

که در این رابطه a_0 شعاع بور است که مقداری برابر 0.053 nm دارد بنابراین:

$$r_1 = 0.0054 \times 0.053 \text{ nm} \simeq 2/9 \times 10^{-12} \text{ m}$$

(ب)

طبق رابطه‌ی ۱۵۱-۶ داریم:

$$E_n = -\frac{m_e (Ze^2)^2}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = \frac{-20.7 \times 13/6 \text{ eV}}{n^2} = \frac{-2815/2 \text{ eV}}{n^2}$$

بنابراین اگر انرژی حالت پایه، اولین حالت برانگیخته و دومین حالت برانگیخته را به ترتیب با E_g ، E_{fe} و E_{se} نشان دهیم، داریم:

$$E_g = \frac{-2815/2 \text{ eV}}{2} = -2815/2 \text{ eV}$$

$$E_{fe} = \frac{E_g}{4} = -703/8 \text{ eV}$$

$$E_{se} = \frac{E_g}{9} = -312/8 \text{ eV}$$

(پ)

w_{if} را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$w_{if} = \frac{E_i - E_f}{\hbar} = \frac{E_g}{\hbar} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = 42/8 \times 10^{14} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \text{ Hz}$$

پس:

$$w_{11} = \frac{2}{4} \times 42/8 \times 10^{14} \text{ Hz} = 22/1 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$w_{11} = \frac{8}{9} \times 42/8 \times 10^{14} \text{ Hz} = 38 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$w_{12} = \frac{5}{36} \times 42/8 \times 10^{14} \text{ Hz} = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

تمرین ۹-۶

اتم هیدروژنی دارای تابع موج $\Psi_{nlm}(\vec{r})$ است که در آن $n=4$ ، $l=3$ و $m=3$.

- (آ) بزرگی اندازه حرکت زاویه‌ای مداری الکترون حول پروتون چه قدر است؟
 (ب) زاویه‌ی میان بردار اندازه حرکت زاویه‌ای مداری و محور z چه قدر است؟ آیا با ثابت نگه داشتن l می‌توان با تغییر n یا m این زاویه را کاهش داد؟ مفهوم فیزیکی این نتیجه چیست؟
 (پ) شکل‌های تابع شعاعی و احتمال یافتن الکترون در فاصله‌ی r از پروتون را رسم کنید.

حل:

(آ)

$\hat{L}^2$ را بر روی تابع موج داده شده اثر می‌دهیم:

$$\hat{L}^2 \psi_{r\tau\tau}(\vec{r}) = r(r+1)\hbar^2 \psi_{r\tau\tau}(\vec{r}) = 12\hbar^2 \psi_{r\tau\tau}(\vec{r})$$

بنابراین اندازه حرکت زاویه‌ای مداری الکترون حول پروتون $\sqrt{12}\hbar$ است.

(ب)

در حالت کلی اگر تابع موج توصیف کننده‌ی سیستم، ویژه تابع مشترک $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ با ویژه مقادیر $m\hbar$ و $l(l+1)\hbar^2$ باشد در این صورت α زاویه‌ی بین بردار اندازه حرکت زاویه‌ای و محور z ها از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\cos \alpha = \frac{L_z}{|\vec{L}|} = \frac{m\hbar}{\hbar\sqrt{l(l+1)}} = \frac{m}{\sqrt{l(l+1)}} \quad (*)$$

در اینجا چون $l=3$ و $m=3$ است لذا:

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{3 \times 4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

پس:

$$\alpha = \frac{\pi}{6}$$

طبق رابطه‌ی (*) واضح است که برای یک l ثابت، با تغییر n ، α تغییر نمی‌کند اما با افزایش m ، α کاهش می‌یابد.

(پ)


طبق رابطه‌ی ۶-۱۷۰ داریم:

$$R_{r\tau}(r) = -\left(\frac{r}{4a}\right)^{\frac{r}{2}} \sqrt{\frac{(4-r-1)!}{2 \times 4(\delta!)^r}} \left(\frac{r}{4a}\right)^r e^{-\frac{r}{4a}} L_r^{\nu}\left(\frac{r}{4a}\right)$$

اما با توجه به اینکه $L_r^{\nu} = -7!$ می‌باشد لذا:

$$R_{fr}(r) = C \left(\frac{r}{a_0} \right)^r e^{\frac{-r}{4a_0}}$$


که در این رابطه، C مقدار ثابت مثبتی است. بنابراین:



از طرفی طبق رابطه‌ی ۶-۲۶۴ نیز داریم:

$$P_{fr}(r) = C' \left(\frac{r}{a_0} \right)^r e^{\frac{-r}{2a_0}}$$

که در این رابطه نیز C' مقدار ثابت مثبتی است. بنابراین:



تمرین ۶-۱۰

الکترونی در اتم هیدروژن در ویژه حالت انرژی زیر است:

$$\Psi_{r1-1}(r, \theta, \varphi) = N r e^{-r/2a_0} Y_{1-1}(\theta, \varphi)$$

($\bar{A}$) N ثابت بهنجارش را بیابید.

- (ب) احتمال یافتن الکترون در واحد حجم در $r=a$ ، $\theta=45^\circ$ و $\varphi=60^\circ$ چیست؟
 (پ) احتمال یافتن الکترون در واحد بازه شعاعی (dr) در $r=2a$ چیست؟ (باید انتگرال روی θ و φ در $r=2a$ گرفته شود).
 (ت) اگر اندازه‌گیری‌های $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ انجام شوند نتایج چه خواهند بود؟

حل:
(آ)

برای یافتن N از شرط بهنجارش استفاده می‌کنیم که عبارتست از:

$$\int_W |\psi_{21-1}|^2 dv = 1$$

پس:

$$1 = |N|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} r^2 e^{\frac{-r}{a}} r^2 dr \int_W |Y_{1-1}(\theta, \varphi)|^2 d\Omega = |N|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} r^4 e^{\frac{-r}{a}} dr$$

$$= \left[-a \cdot e^{\frac{-r}{a}} \left(r^4 + 4a r^3 + 12a^2 r^2 + 24a^3 r + 24a^4 \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} |N|^2 = 24a^4 |N|^2$$

پس با فرض حقیقی و مثبت بودن N داریم:

$$N = \frac{1}{\sqrt{24a^4}} = \frac{1}{2a^2 \sqrt{6a}}$$

منظور از W در $\int_W$ ، تمام فضا می‌باشد.

(ب)

چگالی احتمال در واقع همان $\rho = |\psi_{21-1}|^2$ می‌باشد. پس:

$$\rho(r=a, \theta=45^\circ, \varphi=60^\circ) = \left[N^2 r^2 e^{\frac{-r}{a}} |Y_{1-1}(\theta, \varphi)|^2 \right]_{r=a, \theta=45^\circ, \varphi=60^\circ}$$

$$= \frac{1}{24a^4} a^2 e^{\frac{-a}{a}} \left(\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin 45^\circ \right)^2 = \frac{1}{24a^2} \frac{3}{8\pi} \frac{1}{2} = \frac{1}{128\pi a^2}$$

(پ)

طبق رابطه‌ی ۶-۱۷۸ داریم:

$$P_{r1}(r) = r^2 |R_{r1}(r)|^2 = N^2 r^4 e^{\frac{-2r}{a_0}}$$

پس:

$$P_{r1}(2a_0) = \frac{(2a_0)^4}{24a_0^5} e^{\frac{-4}{a_0}} = \frac{2}{3a_0} e^{-4}$$

(د)

در اندازه گیری $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ به ترتیب مقادیر $2\hbar^2$ و $\hbar$ حاصل می شود.

تمرین ۱۱-۶

اتم هیدروژنی را در نظر بگیرید که در حالت پایه خود است؛ تابع موج حالت پایه به صورت زیر است:

$$\Psi(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

که در آن a_0 شعاع بور است.

(آ) محتمل ترین فاصله ی میان الکترون و پروتون را درحالتی که اتم هیدروژن در حالت پایه ی خود است بیابید.

(ب) فاصله ی میانگین میان الکترون و پروتون را بیابید.

حل:

(آ)

طبق رابطه ی ۶-۲۶۵ داریم:

$$r_1 = 1^2 a_0 = a_0$$

(ب)

طبق رابطه ی ۶-۲۳۳ داریم:

$$\langle 10 | r | 10 \rangle = \frac{1}{\pi} \left[r \times 1^2 - 0 \cdot (0 + 1) \right] a_0 = \frac{3}{2} a_0$$

تمرین ۱۲-۶

اتم هیدروژنی را در نظر بگیرید که حالت آن در زمان $t=0$ به صورت زیر است:

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \phi_{20}(\vec{r}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \phi_{21}(\vec{r}) + \frac{1}{\sqrt{6}} \phi_{22}(\vec{r})$$

(آ) تابع موج وابسته به زمان آن چیست؟

(ب) اگر انرژی اندازه‌گیری شود، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی حاصل می‌شوند؟

(پ) قسمت (ب) را برای $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ تکرار کنید. یعنی اگر $\hat{L}_z$ و $\hat{L}^2$ اندازه‌گیری شوند، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی به دست می‌آیند؟

حل:
(ا)

از رابطه‌ی کلی $\psi(\vec{r}, t) = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \psi(\vec{r}, 0)$ و با توجه به اینکه ϕ_{nlm} ویژه حالت‌های هامیلتونی با ویژه مقدار E_n هستند داریم:

$$\psi(\vec{r}, t) = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \psi(\vec{r}, 0) = e^{\frac{-iE_n t}{\hbar}} \psi(\vec{r}, 0)$$

(ب)

درواقع تابع موج سیستم ویژه تابع انرژی با ویژه مقدار E_n است. پس در اندازه‌گیری انرژی، فقط مقدار E_n و با احتمال یک حاصل می‌شود.

(پ)

در اندازه‌گیری $\hat{L}^2$ مقدار $\hbar^2 l(l+1)$ با احتمال P_l حاصل می‌شود. در اینجا l مقادیر ۰، ۱ و ۲ را اختیار می‌کند و داریم:

$$P_0 = \left| \langle 300 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \quad \text{احتمال اینکه در اندازه‌گیری } \hat{L}^2 \text{ مقدار صفر حاصل شود: } \frac{1}{2}$$

$$P_1 = \left| \langle 311 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{3} \quad \text{احتمال اینکه در اندازه‌گیری } \hat{L}^2 \text{ مقدار } 2\hbar^2 \text{ حاصل شود: } \frac{1}{3}$$

$$P_2 = \left| \langle 322 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^2 = \frac{1}{6} \quad \text{احتمال اینکه در اندازه‌گیری } \hat{L}^2 \text{ مقدار } 6\hbar^2 \text{ حاصل شود: } \frac{1}{6}$$

در اندازه‌گیری L_z مقدار $m\hbar$ با احتمال P'_m حاصل می‌شود. در اینجا m مقادیر ۰، ۱ و ۲ را اختیار می‌کند و داریم:

$$P'_0 = \left| \langle 300 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \quad \text{احتمال اینکه در اندازه‌گیری } \hat{L}_z \text{ مقدار صفر حاصل شود: } \frac{1}{2}$$

$$P'_1 = \left| \langle 311 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{3} \quad \text{احتمال اینکه در اندازه‌گیری } \hat{L}_z \text{ مقدار } \hbar \text{ حاصل شود: } \frac{1}{3}$$

احتمال اینکه در اندازه‌گیری $\hat{L}_z$ مقدار $2\hbar$ حاصل شود: $\frac{1}{6}$ $P'_r = \left| \langle 222 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^2 = \frac{1}{6}$

تمرین ۶-۱۳

تابع موج الکترون در یک اتم هیدروژن به صورت زیر داده شده است:

$$\Psi_{r1m1m_s}(r, \theta, \varphi) = R_{r1}(r) \left[\frac{1}{\sqrt{3}} Y_{10}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} Y_{11}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right]$$

که در آن بردارهای حالت اسپینی هستند.

(آ) آیا این تابع موج ویژه تابعی از $\hat{J}_z$ ، مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای کل الکترون است؟ اگر بله،

ویژه مقدار را بیابید. (راهنمایی: برای این منظور باید $\hat{J}_z \Psi_{r1m1m_s}$ را محاسبه کنید).

(ب) اگر مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی الکترون را اندازه‌گیری کنید چه مقدارهایی به دست

خواهید آورد؟ احتمال‌های متناظر چه هستند؟

(پ) اگر $\hat{J}^2$ را اندازه‌گیری کنید، چه مقدارهایی به دست خواهید آورد؟ احتمال‌های متناظر چه

هستند؟

حل:

(آ)

برای پاسخ به سؤال مذکور، اثر $\hat{J}_z$ را روی Ψ_{r1m1m_s} می‌یابیم. با توجه به اینکه $\hat{J}_z = \hat{L}_z + \hat{S}_z$ است، لذا داریم:

$$\hat{J}_z \Psi_{r1m1m_s} = \hat{L}_z \Psi_{r1m1m_s} + \hat{S}_z \Psi_{r1m1m_s}$$

اما:

$$\begin{aligned} \hat{L}_z \Psi_{r1m1m_s} &= R_{r1}(r) \left[\frac{1}{\sqrt{3}} (L_z Y_{10}(\theta, \varphi)) \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} (L_z Y_{11}(\theta, \varphi)) \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right] \\ &= R_{r1}(r) \left[\sqrt{\frac{2}{3}} \hbar Y_{11}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{S}_z \Psi_{r1m1m_s} &= R_{r1}(r) \left[\frac{1}{\sqrt{3}} Y_{10}(\theta, \varphi) \hat{S}_z \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} Y_{11}(\theta, \varphi) \hat{S}_z \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right] \\ &= R_{r1}(r) \left[\frac{1}{\sqrt{3}} Y_{10}(\theta, \varphi) \frac{\hbar}{2} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} Y_{11}(\theta, \varphi) \left(-\frac{\hbar}{2} \right) \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right] \end{aligned}$$

پس:

$$\hat{J}_z \psi_{r1m_l m_s} = \frac{\hbar}{2} R_{r1} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} Y_{10}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} Y_{11}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle \right] = \frac{\hbar}{2} \psi_{r1m_l m_s}$$

بنابراین $\psi_{r1m_l m_s}$ ویژه تابع $\hat{J}_z$ با ویژه مقدار $\frac{\hbar}{2}$ است.

(ب)

در اندازه‌گیری مؤلفه‌ی z اندازه حرکت زاویه‌ای اسپینی الکترون یکی از مقادیر $\pm \frac{\hbar}{2}$ و با احتمال $P_{\pm}$ حاصل می‌شود به‌طوری‌که:

$$P_+ = \left| \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \psi \right\rangle \right|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{3}$$

$$P_- = \left| \left\langle \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \middle| \psi \right\rangle \right|^2 = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^2 = \frac{2}{3}$$

وبعدا خواهیم دید که عبارات:

$$\left| 1 \pm \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 \mp \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} Y_{11}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle \pm \sqrt{\frac{1 \pm \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} Y_{10}(\theta, \varphi) \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

ویژه حالت‌های همزمان دو عملگر $\hat{J}^2$ و $\hat{J}_z$ می‌باشند به‌طوری‌که:

$$\hat{J}^2 \left| 1 \pm \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \left(1 \pm \frac{1}{2} \right) \left(1 \pm \frac{1}{2} + 1 \right) \hbar^2 \left| 1 \pm \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\hat{J}_z \left| 1 \pm \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \frac{\hbar}{2} \left| 1 \pm \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

پس خواهیم داشت:

$$Y_{11} \left| \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$Y_{10} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle - \frac{1}{\sqrt{3}} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

با استفاده از روابط اخیر نتیجه می‌شود که:

$$\psi_{r1m_l m_s}(r, \theta, \varphi) = R_{r1} \left[\frac{2\sqrt{2}}{3} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \frac{1}{3} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \right]$$

پس در اندازه‌گیری $\hat{J}^2$ مقدار $\frac{15}{4} \hbar^2$ و $\frac{3}{4} \hbar^2$ با احتمال $P_{\frac{3}{2}}$ و $P_{\frac{1}{2}}$ یافت می‌شود به‌طوری‌که:

$$P_{\frac{r}{2}} = \left\langle \left| \frac{r}{2}, \frac{1}{2} \right| \psi_{r1m1m_s} \right\rangle^2 = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \right)^2 = \frac{8}{9}$$

$$P_{\frac{1}{2}} = \left\langle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right| \psi_{r1m1m_s} \right\rangle^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

تمرین ۶-۱۴

اتم هیدروژنی را در نظر بگیرید که حالت آن در زمان $t=0$ عبارت است از

$$\psi(\vec{r}, 0) = A\phi_{r00}(\vec{r}) + \frac{1}{\sqrt{5}}\phi_{r11}(\vec{r}) + \frac{1}{\sqrt{3}}\phi_{r22}(\vec{r})$$

(آ) A را طوری بیابید که این حالت بهنجار شود.

(ب) حالت این اتم را در هر زمان بعدی t بیابید.

(پ) اگر اندازه گیری انرژی انجام شود، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی به دست خواهند آمد؟

(ت) انرژی میانگین اتم را بیابید.

حل:

(آ)

شرط بهنجارش آنست که احتمال یافتن ذره در تمام فضا برابر با یک باشد، یعنی:

$$\int_W |\psi(\vec{r})|^2 dv = 1$$

و با توجه به اینکه ϕ_{nlm} ها مجموعه کامل راست‌هنجاری را تشکیل می‌دهند، این شرط نتیجه می‌دهد:

$$|A|^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = 1$$

در نتیجه:

$$A = |A|e^{i\delta} = \sqrt{\frac{5}{15}}e^{i\delta}$$

که در این رابطه، δ هر مقدار حقیقی دلخواهی می‌تواند باشد.

منظور از W در $\int_W$ ، تمام فضا می‌باشد.

(ب)

از رابطه‌ی $\psi(\vec{r}, t) = e^{\frac{-iHt}{\hbar}} \psi(\vec{r}, 0)$ و با توجه به اینکه:

$$\hat{H}\psi_{nlm}(\vec{r}) = E_n\psi_{nlm}(\vec{r})$$

نتیجه می‌شود که:

$$\psi(\vec{r}, t) = A e^{\frac{-iE_1 t}{\hbar}} \phi_{100}(\vec{r}) + \frac{1}{\sqrt{5}} e^{\frac{-iE_2 t}{\hbar}} \phi_{211}(\vec{r}) + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{\frac{-iE_3 t}{\hbar}} \phi_{222}(\vec{r})$$

(ب)

در اندازه‌گیری انرژی، یکی از مقادیر E_1 ، E_2 و E_3 با احتمال‌های زیر حاصل می‌شود:

$$P_{E_1} = |\langle 100 | \psi \rangle|^2 = |A|^2 = \frac{4}{15}$$

$$P_{E_2} = |\langle 211 | \psi \rangle|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{1}{5}$$

$$P_{E_3} = |\langle 222 | \psi \rangle|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 = \frac{1}{3}$$

(ت)

از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\langle E \rangle = \sum_n P_{E_n} E_n = P_{E_1} E_1 + P_{E_2} E_2 + P_{E_3} E_3 = \frac{4}{15} E_1 + \frac{1}{5} E_2 + \frac{1}{3} E_3$$

با توجه به اینکه $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ لذا:

$$\langle E \rangle = \frac{4}{15} \frac{E_1}{4} + \frac{1}{5} \frac{E_1}{9} + \frac{1}{3} \frac{E_1}{16} = \frac{115 E_1}{720} = \frac{-115 \times 13.6 \text{ eV}}{720} \simeq -2.17 \text{ eV}$$

تمرین ۶-۱۵

پهنای چگالی توزیع برای r و برای اتم هیدروژنی در حالت پایه‌ی خود یعنی $\Delta r = \sqrt{\langle r^2 \rangle_{10} - \langle r \rangle_{10}^2}$ را محاسبه کنید.

حل:

با توجه به روابط ۶-۲۳۳ و ۶-۲۳۵ داریم:

$$\langle 10 | r | 10 \rangle = \frac{1}{4} \left[3 \times 1^2 - 0 \cdot (0+1) \right] a_0 = \frac{3}{4} a_0$$

$$\langle 10 | r^2 | 10 \rangle = \frac{1}{4} \times 1^2 \left[5 \times 1^2 + 1 - 3 \times 0 \cdot (0+1) \right] a_0^2 = 3 a_0^2$$

پس:

$$\Delta r = \sqrt{3 a_0^2 - \left(\frac{3}{4} a_0 \right)^2} = \frac{a_0 \sqrt{3}}{4}$$

تمرین ۶-۱۶

اتم هیدروژنی را در نظر بگیرید که حالت آن در زمان $t=0$ عبارت است از

$$\psi(\vec{r}, 0) = \frac{A}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-r}{a_0}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{z - \sqrt{2}x}{r} \right) R_{21}(r)$$

و در آن A یک ثابت حقیقی، a_0 شعاع بور، و $R_{21}(r)$ تابع موج شعاعی است:

$$R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(1/a_0 \right)^{\frac{3}{2}} (r/2a_0) e^{\frac{-r}{2a_0}}$$

(آ) $\psi(\vec{r}, 0)$ را برحسب $\sum_{nlm} \phi_{nlm}(\vec{r})$ بنویسید که در آن $\phi_{nlm}(\vec{r})$ تابع موج هیدروژن است

$$\phi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

(ب) A را طوری بیابید که $\psi(\vec{r}, 0)$ بهنجار باشد.

(به خاطر داشته باشید که $\int \phi_{n'l'm'}^*(\vec{r}) \phi_{nlm}(\vec{r}) d^3r = \delta_{n',n} \delta_{l',l} \delta_{m',m}$)

(پ) تابع موج $\psi(\vec{r}, t)$ را در هر زمان بعدی t بنویسید.

(ت) آیا $\psi(\vec{r}, 0)$ ویژه حالتی از $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ است؟ اگر بله، ویژه مقادیر چه هستند؟

(ث) اگر انرژی اندازه گیری شود، چه مقدارهایی و با چه احتمالهایی به دست می آیند؟

(ج) احتمال آن که اندازه گیری $\hat{L}_z$ ، $\hbar$ را بدهد چه قدر است؟

(چ) مقدار میانگین r را در حالت $\psi(\vec{r}, 0)$ بیابید.

حل:

(آ)

با توجه به جداول ۵-۲ و ۶-۶ داریم:

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}$$

$$Y_{1\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x \pm iy}{r}$$

$$R_{10} = 2a_0^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{-r}{a_0}}$$

پس:

$$\psi(\vec{r}, 0) = A R_{10} Y_{00} + \sqrt{\frac{2}{3}} R_{21} Y_{10} + \sqrt{\frac{2}{3}} R_{21} Y_{11} - \sqrt{\frac{2}{3}} R_{21} Y_{1,-1}$$

$$= A\phi_{l..} + \sqrt{\frac{r}{r}}\phi_{r1.} + \sqrt{\frac{r}{r}}\phi_{r11} - \sqrt{\frac{r}{r}}\phi_{r1-1}$$

(ب)

برای بهنجارش $\psi(\vec{r}, 0)$ لازم است که:

$$|A|^r + \left(\sqrt{\frac{r}{r}}\right)^r + \left(\sqrt{\frac{r}{r}}\right)^r + \left(-\sqrt{\frac{r}{r}}\right)^r = 1$$

و یا به عبارتی:

$$|A|^r = -1$$

این رابطه به‌ازای هیچ مقداری از A اعم از حقیقی و موهومی برقرار نخواهد بود. با اصلاح $\psi(\vec{r}, 0)$ به‌شکل زیر، کار را ادامه می‌دهیم:

$$\psi(\vec{r}, 0) = A \left(\phi_{l..} + \sqrt{\frac{r}{r}}\phi_{r1.} + \sqrt{\frac{r}{r}}\phi_{r11} - \sqrt{\frac{r}{r}}\phi_{r1-1} \right)$$

در این صورت:

$$1 = |A|^r \left(1 + \frac{r}{r} + \frac{r}{r} + \frac{r}{r} \right) = r|A|^r$$

چون A حقیقی است نتیجه می‌شود که:

$$A = \pm \sqrt{\frac{1}{r}}$$

(پ)

با توجه به اینکه $\psi(\vec{r}, t) = e^{\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}} \psi(\vec{r}, 0)$ و ϕ_{nlm} ویژه توابع هامیلتونی با ویژه مقدار E_n هستند، لذا داریم:

$$\psi(\vec{r}, t) = A \left(e^{\frac{-iE_l t}{\hbar}} \phi_{l..} + \sqrt{\frac{r}{r}} e^{\frac{-iE_r t}{\hbar}} \phi_{r1.} + \sqrt{\frac{r}{r}} e^{\frac{-iE_r t}{\hbar}} \phi_{r11} - \sqrt{\frac{r}{r}} e^{\frac{-iE_r t}{\hbar}} \phi_{r1-1} \right)$$

(ت)

اثر $\hat{L}^r$ و $\hat{L}_z$ را بر روی $\psi(\vec{r}, 0)$ بررسی می‌کنیم:

$$\hat{L}^r \psi(\vec{r}, 0) = A \left(\cdot(\cdot+1)\hbar^r \phi_{l..} + \sqrt{\frac{r}{r}} 1(1+1)\hbar^r \phi_{r1.} + \sqrt{\frac{r}{r}} 1(1+1)\hbar^r \phi_{r11} - \sqrt{\frac{r}{r}} 1(1+1)\hbar^r \phi_{r1-1} \right)$$

$$= 2A\hbar^2 \sqrt{\frac{2}{3}} (\phi_{1,0} + \phi_{1,1} - \phi_{1,-1})$$

پس $\psi(\vec{r}, 0)$ ویژه تابع $\hat{L}^2$ نیست.

$$\hat{L}_z \psi(\vec{r}, 0) = A \left(\hbar \phi_{1,0} + \sqrt{\frac{2}{3}} \hbar \phi_{1,0} + \sqrt{\frac{2}{3}} \hbar \phi_{1,1} - \sqrt{\frac{2}{3}} (-\hbar) \phi_{1,-1} \right)$$

پس $\psi(\vec{r}, 0)$ نیز ویژه تابع $\hat{L}_z$ نمی‌باشد.

(ث)

در اندازه‌گیری انرژی، مقدار E_1 با احتمال P_1 و مقدار E_2 با احتمال P_2 حاصل خواهد شد به طوری که:

$$P_1 = |\langle 1,0 | \psi \rangle|^2 = A^2 = \frac{1}{3}$$

$$P_2 = \sum_{l,m} |\langle \phi_{2lm} | \psi \rangle|^2 = |\langle 2,0 | \psi \rangle|^2 + |\langle 2,1 | \psi \rangle|^2 + |\langle 2,1, -1 | \psi \rangle|^2 = A^2 \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = 2A^2 = \frac{2}{3}$$

(ج)

$$P = \sum_{nl} |\langle \phi_{nl} | \psi \rangle|^2 = |\langle \phi_{11} | \psi \rangle|^2 = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} A \right)^2 = \frac{2}{3} A^2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

(چ)

طبق تعریف، $\langle \hat{r} \rangle$ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\langle \hat{r} \rangle = \langle \psi | \hat{r} | \psi \rangle$$

و یا به عبارتی:

$$\langle \hat{r} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} r |\psi(\vec{r}, 0)|^2 r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi$$

با توجه به اینکه:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{l'm'}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

پس:

$$\langle \hat{r} \rangle = |A|^2 \left[\langle 1,0 | r | 1,0 \rangle + 2 \times \frac{2}{3} \langle 2,1 | r | 2,1 \rangle \right]$$

پس طبق رابطه‌ی ۶-۱۸۰ خواهیم داشت:

$$\langle 1,0 | r | 1,0 \rangle = \frac{1}{r} (r \times r - 0) a = \frac{r}{r} a.$$

$$\langle 21 | \hat{r} | 21 \rangle = \frac{1}{r} (3 \times 2^2 - 1(1+1)) a. = 5a.$$

پس:

$$\langle \hat{r} \rangle = \frac{1}{r} \left(\frac{3}{2} a. + 2(5a.) \right) = \frac{1}{r} \times \frac{23}{2} a. = \frac{23}{6} a.$$

تمرین ۶-۱۷

آونگی را در نظر بگیرید که نوسان‌های هماهنگ بسیار کوچکی انجام می‌دهد (با بسامد زاویه‌ای $\omega = \sqrt{g/l}$ که در آن g شتاب ناشی از گرانش و l طول آونگ است). نشان دهید ترازهای انرژی کوانتومی و تبهگنی‌های متناظر آونگ به ترتیب برابر با $E_n = (n+1)\hbar\omega$ و $g_n = n+1$ می‌باشند.

حل:

پاندول را می‌توان به مثابه یک نوسانگر ایزوتروپیک با فرکانس ω در نظر گرفت. در نتیجه انرژی آن $E_n = (n+1)\hbar\omega$ و مرتبه‌ی تبهگنی سطوح انرژی آن $g_n = n+1$ خواهد بود.

تمرین ۶-۱۸

پروتونی را در نظر بگیرید که در چاه پتانسیل شعاعی نامتناهی

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & 0 < r < a \\ +\infty & r \geq a \end{cases}$$

به دام افتاده است و $V_0 = 51.04/34 \text{ MeV}$ و $a_0 = 1.0 \text{ fm}$ می‌باشند.

- (آ) انرژی و تابع موج شعاعی (بهنجار شده‌ی) این ذره را برای حالت‌های s (مثلاً $l=0$) بیابید.
 (ب) تعداد حالت‌های مقیدی که دارای انرژی‌هایی کمتر از صفر هستند را بیابید. می‌توانید از مقدارهای $\hbar c = 197 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ و $mc^2 = 938 \text{ MeV}$ استفاده کنید.
 (پ) انرژی ترازهایی را حساب کنید که درست در زیر و بالای تراز انرژی صفر قرار دارند. پاسخ خود را بر حسب MeV بنویسید.

حل:

(آ)

با توجه به رابطه‌ی ۵۷-۶ و ۵۹-۶ داریم:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 U_n(r)}{dr^2} - V_0 U_n(r) = E_n U_n(r) \quad ; \quad r \leq a$$

در نتیجه:

$$\frac{d^2 U_n(r)}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (V. + E_n) U_n(r) = 0.$$

با تعریف $k_n^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (V. + E_n)$ داریم:

$$U_n(r) = A \sin(k_n r) + B \cos(k_n r)$$

در نتیجه:

$$R_n(r) = \frac{U_n(r)}{r} = \frac{A}{r} \sin(k_n r) + \frac{B}{r} \cos(k_n r)$$

از آنجا که $R_n(0)$ باید متناهی باشد لذا:

$$B = 0.$$

چون پتانسیل در ناحیه $r > a$ نامتناهی است باید $R_n(r=a)$ مقداری برابر صفر داشته باشد. لذا:

$$\sin k_n a = 0.$$

و یا

$$k_n = \frac{n\pi}{a}; \quad n = 1, 2, \dots$$

در نتیجه:

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} - V.$$

شرط بهنجارش تابع موج شعاعی $R(r)$ ، یعنی $\int_0^a |R_n(r)|^2 dr = 1$ ، منجر می شود به:

$$1 = |A|^2 \int_0^a \sin^2 k_n r dr = \frac{|A|^2}{2} \int_0^a [1 - \cos(2k_n r)] dr = \frac{|A|^2}{2} \left[a - \frac{1}{2k_n} [\sin(2k_n r)]_0^a \right]$$

$$= \frac{|A|^2}{2} a$$

بنابراین $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ و در نتیجه:

$$R_n(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{\sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right)}{r}$$

(ب)

برای یافتن تعداد حالت های مقید با انرژی منفی، شرط زیر را اعمال می کنیم:

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} - V_0 < 0$$

یا:

$$n^2 < \frac{2ma^2 V_0}{\hbar^2 \pi^2} = \frac{2mc^2 a^2 V_0}{\hbar^2 c^2 \pi^2} = \frac{2 \times 938 \text{ MeV} \times (1.0 \text{ fm})^2 \times 51.04 / 34 \text{ MeV}}{(197 \text{ MeV} \cdot \text{fm})^2 \pi^2}$$

در نتیجه:

$$n \leq 49$$

بنابراین ۴۹ حالت مقید وجود دارد.

(ب)

در اینجا باید E_{δ_0} و E_{49} را بیابیم:

$$E_{49} = \frac{49^2 \hbar^2 c^2 \pi^2}{2mc^2 a^2} - V_0 = \frac{49^2 \times (197 \text{ MeV} \cdot \text{fm})^2 \pi^2}{2 \times 938 \text{ MeV} (1.0 \text{ fm})^2} - 51.04 / 34 \text{ MeV} = -137 / 34 \text{ MeV}$$

$$E_{\delta_0} = \frac{5.0^2 \hbar^2 c^2 \pi^2}{2mc^2 a^2} - V_0 \simeq 67 / 34 \text{ MeV}$$

تمرین ۶-۱۹

تابع $\psi(\vec{r}) = -A(x+iy)e^{-r/a_0}$ را در نظر بگیرید که a_0 شعاع بور و A یک ثابت حقیقی است.
(آ) آیا $\psi(\vec{r})$ ویژه تابع $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ است؟ اگر بلی، $\psi(\vec{r})$ را بر حسب $R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ بنویسید و مقادیر اعداد کوانتومی n, m و l را بیابید. $R_{nl}(r)$ توابع موج شعاعی اتم هیدروژن هستند.

(ب) ثابت A را طوری پیدا کنید که $\Psi(\vec{r})$ بهنجار باشد.(پ) مقدار میانگین r و بیشترین مقدار احتمال r را در این حالت به دست آورید.

حل:

(آ)

با توجه به جدول ۵-۲ و ۶-۶ داریم:

$$\psi(\vec{r}) = A \sqrt{\frac{\lambda\pi}{3}} a_0 \sqrt{6a_0^3} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) = A \sqrt{\frac{\lambda\pi}{3}} a_0 \sqrt{6a_0^3} \phi_{211}(\vec{r})$$

بنابراین $\psi(\vec{r})$ ویژه تابع $\hat{L}^2$ و $\hat{L}_z$ است. و اعداد کوانتومی m, l, n به ترتیب عبارتند از:

۱، ۲، ۱

(ب)

چون $\phi_{r11}(\vec{r})$ بهنجار است پس:

$$A = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{1}{r a_0 \sqrt{6} a_0^2}$$

(پ)

با توجه به روابط ۶-۲۳۳ و ۶-۲۶۵ داریم:

$$\langle r_1 | r | r_1 \rangle = \frac{1}{r} [3 \times r^2 - 1 \times r] a_0 = 5a_0$$

و

$$r_r = r^2 a_0 = 4a_0$$

تمرین ۶-۲۰

تابع موج اتم هیدروژن گونه‌ای در زمان $t=0$ عبارت است از

$$\psi(\vec{r}, 0) = \frac{1}{\sqrt{11}} [\sqrt{3}\psi_{r1-1}(\vec{r}) - \psi_{r10}(\vec{r}) + \sqrt{5}\psi_{r11}(\vec{r}) + \sqrt{2}\psi_{r11}(\vec{r})]$$

که $\psi_{nlm}(\vec{r})$ یک ویژه تابع بهنجار است (یعنی $(\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$)
 (آ) تابع موج وابسته به زمان آن چیست؟

(ب) اگر انرژی اندازه‌گیری شود، چه مقدارهایی و با چه احتمال‌هایی به دست می‌آیند؟

(پ) احتمال آن که اندازه‌گیری $\hat{L}_z$ به $-\hbar$ منجر شود چه قدر است؟

حل:
 (آ)

با توجه به اینکه $\psi_{nlm}(\vec{r})$ ها ویژه توابع انرژی با ویژه مقادیر E_n هستند، با استفاده از رابطه:

$$\psi(\vec{r}, t) = e^{-i\frac{\hat{H}t}{\hbar}} \psi(\vec{r}, 0)$$

داریم:

$$\psi(\vec{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{11}} \left[(\sqrt{3}\psi_{r1-1} - \psi_{r10} + \sqrt{5}\psi_{r11}) e^{\frac{-iE_r t}{\hbar}} + \sqrt{2}\psi_{r11} e^{\frac{-iE_r t}{\hbar}} \right]$$

(ب)

در اندازه‌گیری انرژی، مقادیر E_r و E_r با احتمال P_r و P_r حاصل می‌شوند به طوری که:

$$\begin{aligned}
 P_r &= \sum_{l,m} \left| \langle rlm | \psi \rangle \right|^2 = \left| \langle r, 1, -1 | \psi \rangle \right|^2 + \left| \langle r, 1, 0 | \psi \rangle \right|^2 + \left| \langle r, 1, 1 | \psi \rangle \right|^2 \\
 &= \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}} \right)^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{11}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{11}} \right)^2 = \frac{3}{11} + \frac{1}{11} + \frac{5}{11} = \frac{9}{11} \\
 P_r &= \sum_{l,m} \left| \langle rlm | \psi \rangle \right|^2 = \left| \langle r, 1, 1 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} \right)^2 = \frac{2}{11}
 \end{aligned}$$

(پ)

$$P = \sum_{n,l} \left| \langle n, l, -1 | \psi \rangle \right|^2 = \left| \langle r, 1, -1 | \psi \rangle \right|^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{11}} \right)^2 = \frac{3}{11}$$

تمرین ۶-۲۱

با استفاده از این واقعیت که عملگر اندازه حرکت شعاعی با $\hat{P}_r = -i\hbar \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r$ داده می‌شود، جابه‌جاگر $[\hat{r}, \hat{P}_r]$ میان عملگر مکان $\hat{r}$ و عملگر اندازه حرکت شعاعی را محاسبه کنید.

حل:

اثر $[\hat{r}, \hat{P}_r]$ را بر روی تابع موج خوشرفتار $\psi(\vec{r})$ می‌یابیم:

$$\begin{aligned}
 [\hat{r}, \hat{P}_r] \psi(\vec{r}) &= \hat{r}(\hat{P}_r \psi(\vec{r})) - \hat{P}_r(\hat{r} \psi(\vec{r})) = r \left[-i\hbar \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \psi(\vec{r})) \right] + i\hbar \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \psi(\vec{r})) \\
 &= -i\hbar \left(\psi(\vec{r}) + r \frac{\partial \psi(\vec{r})}{\partial r} \right) + i\hbar \frac{1}{r} \left(2r \psi(\vec{r}) + r^2 \frac{\partial \psi(\vec{r})}{\partial r} \right) \\
 &= -i\hbar \psi(\vec{r}) - i\hbar r \frac{\partial \psi(\vec{r})}{\partial r} + 2i\hbar \psi(\vec{r}) + i\hbar r \frac{\partial \psi(\vec{r})}{\partial r} = i\hbar \psi(\vec{r})
 \end{aligned}$$

بنابراین:

$$[\hat{r}, \hat{p}] = i\hbar$$

تمرین ۶-۲۲

$\Delta r \Delta p_r$ را بر حسب حالت:

$$\psi_{r10}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{r}{2a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} Y_{10}(\theta, \varphi)$$

محاسبه کنید و ثابت کنید که $\Delta r \Delta p_r$ در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ صدق می‌کند.

حل:

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{p}_r \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \psi_{r1}^*(\vec{r}) (-i\hbar) \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \psi_{r1}(\vec{r})) r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi \quad (*) \\
 &= -i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} \psi_{r1}^*(\vec{r}) \left[r^2 \frac{\partial}{\partial r} \psi_{r1}(\vec{r}) \right] dr \sin \theta d\theta d\varphi - i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \psi_{r1}^*(\vec{r}) \frac{\partial \psi_{r1}(\vec{r})}{\partial r} r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= -i\hbar \left\langle r1 \left| \frac{1}{r} \right| r1 \right\rangle - i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{ra} \psi_{r1}^*(\vec{r}) \left[r^2 \frac{\partial}{\partial r} \psi_{r1}(\vec{r}) \right] dr \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &\quad - i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \psi_{r1}^*(\vec{r}) \frac{\partial \psi_{r1}(\vec{r})}{\partial r} r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= -i\hbar \left\langle r1 \left| \frac{1}{r} \right| r1 \right\rangle + \frac{i\hbar}{ra} - i\hbar \left\langle r1 \left| \frac{1}{r} \right| r1 \right\rangle = +i\hbar \left(\frac{1}{ra} - 2 \left\langle r1 \left| \frac{1}{r} \right| r1 \right\rangle \right)
 \end{aligned}$$

با توجه به رابطه‌ی ۶-۲۳۱ داریم:

$$\langle \hat{p}_r \rangle = i\hbar \left(\frac{1}{ra} - 2 \times \frac{1}{ra} \right) = 0$$

البته این نتیجه از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود زیرا $\langle \hat{p}_r \rangle$ باید مقداری حقیقی باشد اما رابطه‌ی (*) بیانگر آنست که $\langle \hat{p}_r \rangle$ عددی موهومی محض و یا صفر است. اما چون نمی‌تواند موهومی محض باشد لاجرم باید صفر باشد.

حال با استفاده از رابطه‌ی ۶-۴۴ داریم:

$$-\hbar^2 \nabla^2 = \hat{P}^2 = \hat{p}_r^2 + \frac{\hat{L}^2}{r^2}$$

پس:

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{p}_r^2 \rangle &= \langle \hat{P}^2 \rangle - \left\langle \frac{\hat{L}^2}{r^2} \right\rangle = 2m \left\langle r1 \left| \hat{H} + \frac{e^2}{r} \right| r1 \right\rangle - \left\langle r1 \left| \frac{\hat{L}^2}{r^2} \right| r1 \right\rangle \\
 &= 2m \left[E_r + e^2 \left\langle r1 \left| \frac{1}{r} \right| r1 \right\rangle \right] - 2\hbar^2 \left\langle r1 \left| \frac{1}{r^2} \right| r1 \right\rangle
 \end{aligned}$$

با استفاده از رابطه‌ی ۶-۲۲۵ و روابط $a_n = \frac{\hbar^2}{m e^2}$ و $E_n = \frac{-e^2}{2a_n n^2}$ داریم:

$$\langle \hat{p}_r^2 \rangle = \frac{1}{12} \frac{\hbar^2}{a^2}$$

پس:

$$\Delta p_r = \sqrt{\langle \hat{p}_r^2 \rangle - \langle \hat{p}_r \rangle^2} = \frac{\hbar}{a} \frac{1}{2\sqrt{3}}$$


از طرفی با توجه به رابطه‌ی ۶-۲۳۳ و ۶-۲۳۵ داریم:

$$\Delta r = \sqrt{\langle r^2 \rangle - \langle r \rangle^2} = \sqrt{\frac{1}{r} \times 4 [5 \times 4 + 1 - 3 \times 1 \times 2] a^2 - \left[\frac{1}{r} (3 \times 2^2 - 1 \times 2) a \right]^2} = a \sqrt{5}$$

پس:

$$\Delta r \Delta p_r = \frac{\hbar}{a} \frac{1}{r \sqrt{3}} a \sqrt{5} = \frac{\hbar}{r} \sqrt{\frac{5}{3}} \geq \frac{1}{r} \left| \langle [\hat{r}, \hat{p}_r] \rangle \right| = \frac{\hbar}{r}$$

بنابراین اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نیز ارضاء می‌شود.



فصل هفتم

چرخش‌ها و جمع اندازه حرکت‌های زاویه‌ای

تمرین ۷-۱

نشان دهید که تبدیل خطی $y = Rx$ که در آن:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

یک دوران پادساعتگرد دستگاه مختصات دکارتی $x_1 x_2$ در صفحه‌ای حول مبدا با یک زاویه ϕ است.

حل:

در واقع داریم:

$$x_1 \hat{i} + x_2 \hat{j} = y_1 \hat{i}' + y_2 \hat{j}'$$

پس از ضرب طرفین این رابطه در $\hat{i}'$ و $\hat{j}'$ داریم:

$$x_1 \hat{i} \cdot \hat{i}' + x_2 \hat{j} \cdot \hat{i}' = y_1 \hat{i}' \cdot \hat{i}' + y_2 \hat{j}' \cdot \hat{i}'$$

$$x_1 \hat{i} \cdot \hat{j}' + x_2 \hat{j} \cdot \hat{j}' = y_1 \hat{i}' \cdot \hat{j}' + y_2 \hat{j}' \cdot \hat{j}'$$

یا

$$y_1 = x_1 \cos \phi + x_2 \sin \phi$$

$$y_2 = -x_1 \sin \phi + x_2 \cos \phi$$

برای رسیدن به این نتایج از روابط زیر استفاده کرده‌ایم:

$$\hat{i}\hat{i}' = \hat{j}\hat{j}' = \cos \phi$$

$$\hat{j}\hat{i}' = -\hat{i}\hat{j}' = \sin \phi$$

$$\hat{i}\hat{i} = \hat{j}\hat{j} = \hat{i}'\hat{i}' = \hat{j}'\hat{j}' = 1$$

$$\hat{i}\hat{j} = \hat{j}\hat{i} = \hat{i}'\hat{j}' = \hat{j}'\hat{i}' = 0$$

پس:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

به طوری که:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

تمرین ۷-۲

نشان دهید توان n ام ماتریس دورانی:

$$R(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

برابر است با:

$$R^n(\phi) = \begin{pmatrix} \cos(n\phi) & -\sin(n\phi) \\ \sin(n\phi) & \cos(n\phi) \end{pmatrix}$$

معنی هندسی این نتیجه چیست؟

حل:

فرض می کنیم که:

$$R^m = \begin{pmatrix} \cos(m\phi) & -\sin(m\phi) \\ \sin(m\phi) & \cos(m\phi) \end{pmatrix}$$

پس:

$$\begin{aligned} R^{m+1} &= R R^m = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(m\phi) & -\sin(m\phi) \\ \sin(m\phi) & \cos(m\phi) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \phi \cos(m\phi) - \sin \phi \sin(m\phi) & -\cos \phi \sin(m\phi) - \sin \phi \cos(m\phi) \\ \sin \phi \cos(m\phi) + \cos \phi \sin(m\phi) & -\sin \phi \sin(m\phi) + \cos \phi \cos(m\phi) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(m+1)\phi & -\sin(m+1)\phi \\ \sin(m+1)\phi & \cos(m+1)\phi \end{pmatrix} \end{aligned}$$

رابطه $R^n = \begin{pmatrix} \cos n\phi & -\sin n\phi \\ \sin n\phi & \cos n\phi \end{pmatrix}$ برای $n=1$ برقرار است. طبق آنچه گفته شده برای $n=2$ نیز

صادق است و لذا برای $n=3$ نیز صادق خواهد بود و الی آخر. پس به کمک استقراء ریاضی ثابت شد که:

$$R^n = \begin{pmatrix} \cos(n\phi) & -\sin(n\phi) \\ \sin(n\phi) & \cos(n\phi) \end{pmatrix}$$

معنای هندسی این رابطه آن است که n دوران متوالی حول یک محور به اندازه زاویه مشخص ϕ ، برابر با دورانی به اندازه $n\phi$ حول همان محور است.

تمرین ۷-۳

با استفاده از عملگر جابجایی فضایی $U(\hat{A}) = e^{-i\hat{A}\hat{P}/\hbar}$ که در آن $\hat{P}$ عملگر اندازه حرکت خطی است نشان دهید که $e^{i\hat{A}\hat{P}/\hbar}\hat{R}e^{-i\hat{A}\hat{P}/\hbar} = \hat{R} + \hat{A}$.

حل:

ابتدا به محاسبه‌ی $e^{\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}}\hat{X}e^{-\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}}$ می‌پردازیم. برای این منظور از اتحاد زیر استفاده می‌کنیم:

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{3!}[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots$$

پس:

$$e^{\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}}\hat{X}e^{-\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}} = \hat{X} + \left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \hat{X}\right] + \frac{1}{2!}\left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \hat{X}\right]\right] + \dots$$

ولی:

$$\left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \hat{X}\right] = \left[\frac{i}{\hbar}(A_x\hat{P}_x + A_y\hat{P}_y + A_z\hat{P}_z), \hat{X}\right]$$

اما چون:

$$[\hat{P}_x, \hat{X}] = i\hbar, [\hat{P}_y, \hat{X}] = [\hat{P}_z, \hat{X}] = 0.$$

پس:

$$\left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \hat{X}\right] = \frac{i}{\hbar}A_x[\hat{P}_x, \hat{X}] = \frac{i}{\hbar}A_x(-i\hbar) = A_x$$

$$\left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, \hat{X}\right]\right] = \left[\frac{i\hat{A}\hat{P}}{\hbar}, A_x\right] = 0.$$

و به همین ترتیب:

$$\left[\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}, \left[\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}, \left[\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}, \dots \left[\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}, A_x \right] \dots \right] \right] = 0.$$

و بنابراین:

$$e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} \hat{X} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} = \hat{X} + A_x$$

به همین ترتیب:

$$e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} \hat{Y} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} = \hat{Y} + A_y$$

$$e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} \hat{Z} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} = \hat{Z} + A_z$$

و در نتیجه:

$$\begin{aligned} e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} \hat{R} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} &= e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} (\hat{X} + \hat{Y} + \hat{Z}) e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} = \hat{X} e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} + \hat{Y} e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} + \hat{Z} e^{\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} e^{-\frac{i\hat{A}\cdot\hat{P}}{\hbar}} \\ &= \hat{X} + \hat{Y} + \hat{Z} = \hat{R} + \vec{A} \end{aligned}$$

تمرین ۴-۷

مؤلفه‌های A_j (با $j=x,y,z$) از یک بردار $\hat{A}$ تحت دوران فضایی به صورت $A'_i = R_{ij}A_j$ تبدیل می‌شوند که در آن R ماتریس دورانی است.

(آ) با استفاده از ناوردایی حاصل ضرب نرده‌ای هر دو بردار (یعنی $\vec{A} \cdot \vec{B}$) تحت دوران، نشان دهید که سطرها و ستون‌های ماتریس دوران R ، متعامد - بهنجار بر یکدیگر هستند (یعنی نشان دهید که $R_{ij}R_{ik} = \delta_{jk}$)

(ب) نشان دهید که ترانهاد ماتریس R با وارون R برابر و دترمینان R برابر با ± 1 است.

حل:

(آ)

اگر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ دو بردار باشند آنگاه تحت دوران، مؤلفه‌های آنها طبق روابط زیر تبدیل خواهند شد:

$$A'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} A_j$$

$$B'_i = \sum_{l=1}^3 R_{il} B_l$$

در نتیجه تبدیل $\vec{A} \cdot \vec{B}$ عبارت خواهد بود از:

$$\vec{A}' \cdot \vec{B}' = \sum_{i=1}^r A'_i B'_i = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r \sum_{l=1}^r R_{ij} A_j R_{il} B_l = \sum_{j,l} \left(\sum_i R_{ij} R_{il} \right) A_j B_l$$

اما از طرفی:

$$\hat{\vec{A}} \cdot \hat{\vec{B}} = \sum_{j=1}^r A_j B_j$$

پس رابطه‌ی $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A}' \cdot \vec{B}'$ فقط و فقط در صورتی برقرار خواهد بود که :

$$\sum_i R_{ij} R_{il} = \delta_{jl}$$

البته شرط اخیر هم‌ارز است با:

$$\sum_i R_{ji} R_{li} = \delta_{jl}$$

(ب)

$$RR^T = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11} & R_{21} & R_{31} \\ R_{12} & R_{22} & R_{32} \\ R_{13} & R_{23} & R_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^r R_{1i} R_{1i} & \sum_{i=1}^r R_{1i} R_{2i} & \sum_{i=1}^r R_{1i} R_{3i} \\ \sum_{i=1}^r R_{2i} R_{1i} & \sum_{i=1}^r R_{2i} R_{2i} & \sum_{i=1}^r R_{2i} R_{3i} \\ \sum_{i=1}^r R_{3i} R_{1i} & \sum_{i=1}^r R_{3i} R_{2i} & \sum_{i=1}^r R_{3i} R_{3i} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \delta_{23} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R^T R$$

بنابراین R و R^T معکوس هم‌دیگر هستند.اما برای اثبات اینکه دترمینان R مقداری برابر با ± 1 دارد باید دو نکته را بدانیم:

۱. دترمینان حاصلضرب دو ماتریس برابر با حاصلضرب دترمینان‌ها است.

۲. دترمینان ترانژاده هر ماتریس با دترمینان خود آن برابر است.

پس برای ماتریس متعامد R داریم:

$$\det(RR^T) = \det(R) \det(R^T) = \det(R) \det(R) = [\det(R)]^2 = \det(I) = 1$$

و در نتیجه:

$$\det(R) = \pm 1$$

تمرین ۵-۷

عملگر متناظر با یک دوران به اندازه‌ی θ حول محور $\vec{n}$ با رابطه‌ای زیر داده می‌شود:

$$U_{\vec{n}}(\theta) = e^{-i\theta \vec{n} \cdot \vec{J} / \hbar}$$

نشان دهید که آرایه‌های ماتریسی عملگر مکان $\hat{R}$ از طریق یک دوران بی‌نهایت کوچک مانند $\vec{R}' = \hat{R} + \theta \vec{n} \times \vec{R}$ دوران می‌کنند (یعنی، در حالتی که در آن θ بی‌نهایت کوچک است، نشان دهید که $U_n^\dagger(\theta) \vec{R}_j U_n(\theta) = \vec{R}_j + \theta (\vec{n} \times \vec{R})_j$).

حل:

ابتدا به محاسبه‌ی $U_n^\dagger(\theta) \hat{X} U_n(\theta)$ می‌پردازیم و برای این منظور از اتحاد زیر استفاده می‌کنیم:

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{3!} [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots$$

پس:

$$U_n^\dagger(\theta) \hat{X} U_n(\theta) = e^{i\theta \hat{n} \cdot \frac{\hat{J}}{\hbar}} \hat{X} e^{-i\theta \hat{n} \cdot \frac{\hat{J}}{\hbar}} = \hat{X} + \left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{X} \right] + \frac{1}{2!} \left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{X} \right] \right] + \dots$$

اما:

$$\left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{X} \right] = \frac{i\theta}{\hbar} [\hat{n} \cdot \hat{S} + \hat{n} \cdot \hat{L}, \hat{X}] = \frac{i\theta}{\hbar} [\hat{n} \cdot \hat{L}, \hat{X}]$$

برای نوشتن خط آخر از دو نکته استفاده نموده‌ایم:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \quad ۱.$$

$$[\vec{S}, \hat{X}] = 0 \quad ۲.$$

حال به ادامه‌ی کار می‌پردازیم:

$$\left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{X} \right] = \frac{i\theta}{\hbar} [n_x \hat{L}_x + n_y \hat{L}_y + n_z \hat{L}_z, \hat{X}]$$

با توجه به رابطه‌ی $\hat{L} = \hat{R} \times \hat{P}$ داریم:

$$\left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{X} \right] = \frac{i\theta}{\hbar} [n_x (\hat{Y} \hat{P}_z - \hat{Z} \hat{P}_y) + n_y (\hat{Z} \hat{P}_x - \hat{X} \hat{P}_z) + n_z (\hat{X} \hat{P}_y - \hat{Y} \hat{P}_x), \hat{X}]$$

با توجه به اینکه:

$$[\hat{Y}, \hat{X}] = [\hat{Z}, \hat{X}] = 0$$

$$[\hat{P}_y, \hat{X}] = [\hat{P}_z, \hat{X}] = 0$$

$$[\hat{P}_x, \hat{X}] = -i\hbar$$

پس خواهیم داشت:

$$\left[\frac{i\theta}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{X} \right] = \frac{i\theta}{\hbar} [(n_y \hat{Z} - n_z \hat{Y}) \hat{P}_x, \hat{X}] = \frac{i\theta}{\hbar} (-i\hbar) (n_y \hat{Z} - n_z \hat{Y}) = \theta (n_y \hat{Z} - n_z \hat{Y}) = \theta (\hat{n} \times \hat{R})_x$$

بنابراین:

$$U_n^\dagger(\theta) \hat{X} U_n(\theta) = \hat{X} + \theta \left(\hat{n} \times \hat{R} \right)_x + O(\theta^2)$$

برای دوران‌های به اندازه‌ی کافی کوچک از جملات مرتبه θ^2 و بالاتر صرف نظر می‌کنیم، یعنی:

$$U_n^\dagger(\theta) \hat{X} U_n(\theta) = \hat{X} + \theta \left(\hat{n} \times \hat{R} \right)_x$$

به همین ترتیب رابطه‌ی اخیر را برای سایر مؤلفه‌های $\hat{R}$ می‌توان ثابت کرد. پس:

$$U_{\vec{n}}(\theta) = e^{-i\theta \vec{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} / \hbar}$$

تمرین ۶-۷

تابع موج یک ذره $\psi(\vec{r}) = (\sqrt{2}x + \sqrt{2}y + z)f(r)$ می‌باشد که در آن $f(r)$ یک تابع مقارن کروی است.

(آ) آیا $\psi(\vec{r})$ یک ویژه تابع از L^2 است؟ اگر چنین است ویژه مقدارهای آن چیست؟

(ب) احتمال‌های آن که ذره در حالات $m_l = -1$ ، $m_l = 0$ و $m_l = 1$ یافت شود چیست؟

(پ) اگر $\psi(\vec{r})$ یک ویژه تابع انرژی با ویژه مقدار E باشد و $f(r) = r^2$ ، پتانسیل $V(r)$ که این ذره در آن قرار دارد را پیدا کنید.

حل:
(آ)

با توجه به اینکه:

$$x = r \sin \theta \cos \phi = \frac{r}{\sqrt{2}} \sin \theta (e^{i\phi} + e^{-i\phi}) = \frac{r}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} (-Y_{11} + Y_{1-1})$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi = \frac{r}{\sqrt{2}i} \sin \theta (e^{i\phi} - e^{-i\phi}) = \frac{r}{\sqrt{2}i} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} (-Y_{11} + Y_{1-1})$$

$$z = r \cos \theta = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{10}(\theta, \phi)$$

پس از آنجا که تمام Y_{lm} ها مربوط به $l=1$ می‌باشند، بنابراین $\psi(\vec{r})$ یک ویژه تابع L^2 با ویژه مقدار $\hbar^2(1+1)/2$ می‌باشد یعنی:

$$L^2 \psi(\vec{r}) = 2\hbar^2 \psi(\vec{r})$$

(ب)

یکبار دیگر $\psi(\vec{r})$ را بازنویسی می‌کنیم:

$$\psi(\vec{r}) = \left[\frac{r}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} (-Y_{11} + Y_{1-1}) + \frac{r}{\sqrt{2}i} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} (Y_{11} + Y_{1-1}) + \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{10}(\theta, \phi) \right] f(r)$$

$$= 2rf(r)\sqrt{\frac{\pi}{3}}[(-1+i)Y_{11} + (1+i)Y_{1,-1} + Y_{10}] = \frac{2}{5} = 40\%$$

$$P(m_l = -1) = \frac{|1+i|^2}{|-1+i|^2 + |1+i|^2 + 1^2} = \frac{2}{5} = 40\%$$

$$P(m_l = 0) = \frac{1}{5} = 20\%$$

$$P(m_l = 1) = \frac{2}{5} = 40\%$$

(ب)

از آنجا که برای پتانسیل‌های کروی ψ_{nlm} ، ویژه تابع انرژی دارای شکل زیر است:

$$\psi_{nlm}(\vec{r}) = \frac{U_{nl}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi)$$

که $U_{nl}(r)$ در معادله دیفرانسیل:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 U_{nl}(r)}{dr^2} + \left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right] U_{nl}(r) = E U_{nl}(r)$$

صدق می‌کند، پس در مورد مسئله خودمان با $U = r^2$ داریم:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} (r^2) + \left[\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right] r^2 = E r^2$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} (12r) + \left(\frac{\hbar^2}{\mu r^2} + V(r) \right) r^2 = E r^2$$

$$-\frac{6\hbar^2 r}{\mu} + r^2 V(r) = E r^2$$

$$V(r) = E + \frac{6\hbar^2}{\mu r^2}$$

تمرین ۷-۷

ذره‌ای را در نظر بگیرید که تابع موج آن به صورت زیر است:

$$\psi(\vec{r}) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}} Y_{11}(\theta, \phi) - \frac{1}{5} Y_{1,-1}(\theta, \phi) + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{10}(\theta, \phi) \right) f(r)$$

که در آن $f(r)$ یک تابع شعاعی بهنجار است یعنی $\int_0^\infty r^2 f^2(r) dr = 1$.

(آ) مقادیر چشمداشتی $\hat{L}^2$ ، $\hat{L}_z$ و $\hat{L}_x$ را در این حالت حساب کنید.

(ب) مقدار چشمداشتی $V(\theta) = 2\cos^2\theta$ را در این حالت حساب کنید.

(ب) احتمال آن را بیابید که ذره در حالت $m_l = 0$ باشد.

حل:

(آ)

ابتدا $\psi(\vec{r})$ را بهنجار می کنیم. برای این منظور $\psi_N(\vec{r}) = N\psi(\vec{r})$ را تابع موج بهنجار شده فرض می کنیم. پس:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_W |\psi_N|^2 dV = \int_W |N|^2 |f(r)|^2 \left| \frac{1}{\sqrt{\Delta}} Y_{1,1}(\theta, \phi) - \frac{1}{\Delta} Y_{1,-1}(\theta, \phi) + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{1,0}(\theta, \phi) \right|^2 r^2 dr d\Omega \\ &= |N|^2 \int_0^\infty r^2 |f(r)|^2 dr \int \left| \frac{1}{\sqrt{\Delta}} Y_{1,1}(\theta, \phi) - \frac{1}{\Delta} Y_{1,-1}(\theta, \phi) + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{1,0}(\theta, \phi) \right|^2 d\Omega \\ &= |N|^2 \times 1 \times \left[\left(\frac{1}{\sqrt{\Delta}} \right)^2 + \left(\frac{-1}{\Delta} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \right] = |N|^2 \left(\frac{37}{\Delta^2} \right) \end{aligned}$$

پس:

$$|N| = \sqrt{\frac{\Delta^2}{37}}$$

از آنجا که $\psi_N(\vec{r})$ یک ویژه تابع L^2 است پس ویژه مقدار مربوط به آن همان مقدار چشمداشتی خواهد بود. لذا:

$$L^2 \psi_N(r) = 1(1+1)\hbar^2 \psi_N(r)$$

پس:

$$\langle L^2 \rangle = 2\hbar^2$$

در مورد $\langle L_z \rangle$ داریم:

$$\langle L_z \rangle = \left[\left(\frac{1}{\sqrt{\Delta}} \right)^2 (+\hbar) + \left(\frac{-1}{\Delta} \right)^2 (-\hbar) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 (0\hbar) \right] \left(\sqrt{\frac{\Delta^2}{37}} \right) = \hbar \left(\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{2\Delta} \right) \frac{\Delta^2}{37} = \hbar \frac{4}{25} \frac{\Delta^2}{37} = \frac{4}{37} \hbar$$

(ب)

با توجه به اینکه:

$$V(\theta) \psi_N(\vec{r}) = 2\sqrt{\frac{\Delta^2}{37}} f(r) \left[\frac{1}{\sqrt{\Delta}} \left(-\sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{i\phi} \sin \theta \right) - \frac{1}{\Delta} \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \right] \cos^2 \theta$$

$$e^{i\phi} \sin \theta \cos^2 \theta = \frac{-\sqrt{\frac{64\pi}{21}} Y_{2,1} - \sqrt{\frac{8\pi}{3}} Y_{2,1}}{\Delta}$$

و

$$e^{-i\phi} \sin \theta \cos^r \theta = \frac{-\sqrt{\frac{64\pi}{21}} Y_{r-1} - \sqrt{\frac{8\pi}{3}} Y_{1-1}}{\Delta}$$

و

$$\cos^r \theta = \frac{\sqrt{\frac{16\pi}{9}} Y_{r,0}(\theta, \phi) + r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{1,0}}{\Delta}$$

پس:

$$\langle V(\theta) \rangle = \int_W dV \psi^*(r) V(\theta) \psi(r) = r \left(\frac{\Delta_0}{37} \right) I \int_{-\infty}^{+\infty} r^r f(r) dr = \frac{100}{37} I$$

که در آن:

$$I = \int_W \left[\frac{1}{\sqrt{\Delta}} Y_{11}^*(\theta, \phi) - \frac{1}{\Delta} Y_{1-1}^*(\theta, \phi) + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{10}^*(\theta, \phi) \right] \left[\frac{1}{\Delta\sqrt{\Delta}} Y_{11} - \frac{1}{2\Delta} Y_{1-1} + \frac{3}{\Delta\sqrt{2}} Y_{10} \right] d\Omega$$

در نوشتن رابطه‌ی اخیر از این نکته استفاده کرده‌ایم که:

$$\int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

مجدداً با استفاده از این رابطه خواهیم داشت:

$$I = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \times \frac{1}{\Delta\sqrt{\Delta}} - \frac{1}{\Delta} \times \frac{-1}{2\Delta} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\Delta\sqrt{2}} = \frac{1}{2\Delta} + \frac{1}{12\Delta} + \frac{3}{10} = \frac{10+2+25}{250} = \frac{37}{250}$$

پس:

$$\langle V(\theta) \rangle = \frac{100}{37} \times \frac{37}{250} = 0.4$$

(ب)

$$P(m_l=0) = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^r}{\left(\frac{1}{\sqrt{\Delta}}\right)^r + \left(\frac{-1}{\Delta}\right)^r + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^r} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\Delta} + \frac{1}{25} + \frac{1}{2}} = \frac{25}{10+2+25} = \frac{25}{37}$$

در اینجا منظور از W در $\int_W$ ، تمام فضا می‌باشد.

تمرین ۷-۸

ذره‌ای با اسپین $\frac{1}{2}$ در یک حالت d از اندازه حرکت زاویه‌ای مداری است (یعنی $l=2$). جمع اندازه حرکت‌های زاویه‌ای مداری و اسپینی این ذره را محاسبه و همه‌ی حالت‌ها و ضرایب کلبش - گوردون متناظر را بیابید.

حل:

در این مسئله از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\left| l \pm \frac{1}{2}, m \right\rangle = \pm \sqrt{\frac{l \pm m + \frac{1}{2}}{2l+1}} \left| l, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{l \mp m + \frac{1}{2}}{2l+1}} \left| l, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| 2 + \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{\frac{5}{2} + m}{5}} \left| 2, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{\frac{5}{2} - m}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{\frac{5}{2} + 2m}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{\frac{5}{2} - 2m}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle = \left| 2, \frac{1}{2}; 2, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{8}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 1, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 2, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{6}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 0, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{4}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 1, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{4}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; -1, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{6}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 0, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, \frac{-3}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; -2, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{8}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; -1, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{5}{2}, \frac{-5}{2} \right\rangle = \left| 2, \frac{1}{2}; -2, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| 2 - \frac{1}{2}, m \right\rangle = -\sqrt{\frac{2 - m + \frac{1}{2}}{2 \times 2 + 1}} \left| 2, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2 + m + \frac{1}{2}}{2 \times 2 + 1}} \left| 2, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{3}{2}, m \right\rangle = -\sqrt{\frac{\frac{5}{2} - 2m}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{\frac{5}{2} + 2m}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = -\sqrt{\frac{2}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 1, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{8}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 2, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = -\sqrt{\frac{4}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 0, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{6}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 1, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{3}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle = -\sqrt{\frac{6}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; -1, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{4}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; 0, \frac{-1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle = -\sqrt{\frac{2}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; -2, \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{8}{10}} \left| 2, \frac{1}{2}; -1, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

تمرین ۷-۹

همیلتونی وابسته به اسپین یک سیستم شامل الکترون - پوزیترون را در حضور یک میدان مغناطیسی یکنواخت در جهت z ($\vec{B} = B\hat{k}$) می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\hat{H} = \lambda \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 + \left(\frac{eB}{mc} \right) (\hat{S}_{1z} - \hat{S}_{2z})$$

که در آن λ یک عدد حقیقی و $\hat{S}_1$ و $\hat{S}_2$ عملگرهای اسپین به ترتیب برای الکترون و پوزیترون هستند.

(آ) اگر تابع اسپین سیستم با $\left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$ داده شود، ویژه مقدارهای انرژی و ویژه بردارهای متناظر آن‌ها را بیابید.

(ب) قسمت (آ) را برای حالتی که در آن $\lambda = 0$ اما $B \neq 0$ تکرار کنید.

(پ) قسمت (آ) را برای حالتی که در آن $B = 0$ اما $\lambda \neq 0$ تکرار کنید.

حل:

همیلتونی سیستم را به شکل زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$H = \frac{\lambda}{4} (2S_{1z}S_{2z} + S_{1+}S_{2-} + S_{1-}S_{2+}) + \frac{eB}{mc} (\hat{S}_{1z} - \hat{S}_{2z})$$

نمایش ماتریسی در پایه‌های $|s_1 s_2; m_1 m_2\rangle$ را به طور مختصر با $|m_1 m_2\rangle$ نشان می‌دهیم:

$$\hat{H} = \begin{vmatrix} \langle ++ | \hat{H} | ++ \rangle & \langle ++ | \hat{H} | +- \rangle & \langle ++ | \hat{H} | -+ \rangle & \langle ++ | \hat{H} | -- \rangle \\ \langle +- | \hat{H} | ++ \rangle & \langle +- | \hat{H} | +- \rangle & \langle +- | \hat{H} | -+ \rangle & \langle +- | \hat{H} | -- \rangle \\ \langle -+ | \hat{H} | ++ \rangle & \langle -+ | \hat{H} | +- \rangle & \langle -+ | \hat{H} | -+ \rangle & \langle -+ | \hat{H} | -- \rangle \\ \langle -- | \hat{H} | ++ \rangle & \langle -- | \hat{H} | +- \rangle & \langle -- | \hat{H} | -+ \rangle & \langle -- | \hat{H} | -- \rangle \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{\lambda}{4} \hbar^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\lambda}{4} \hbar^2 + \frac{eB\hbar}{mc} & \frac{\lambda}{4} \hbar^2 & 0 \\ 0 & \frac{\lambda}{4} \hbar^2 & -\frac{\lambda}{4} \hbar^2 - \frac{eB\hbar}{mc} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\lambda}{4} \hbar^2 \end{vmatrix}$$

اما برای یافتن ویژه مقادیر H باید معادله‌ی ویژه مقداری $\det(\hat{H} - E\hat{I}) = 0$ را حل کنیم. در این صورت خواهیم داشت:

$$\left| E_1 = \frac{\lambda}{4} \hbar^2 \right\rangle = |++\rangle$$

$$\left| E_r = -\frac{\lambda}{4} \hbar^2 + \sqrt{\left(\frac{eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2} \right\rangle = \frac{\frac{\lambda}{4} \hbar^2 |+-\rangle + \left[\frac{-eB\hbar}{mc} + \sqrt{\left(\frac{eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2} \right] |-+\rangle}{\left[\left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2 + \left(\frac{-eB\hbar}{mc} + \sqrt{\left(\frac{eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}$$

$$\left| E_r = -\frac{\lambda}{4} \hbar^2 - \sqrt{\left(\frac{eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2} \right\rangle = \frac{\left[\frac{\lambda}{4} \hbar^2 + \sqrt{\left(\frac{eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2} \right] |+-\rangle - \frac{eB\hbar}{mc} |-+\rangle}{\left[\left(\frac{+eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2 + \sqrt{\left(\frac{eB\hbar}{mc}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{4} \hbar^2\right)^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}}$$

$$\left| E_r = \frac{\lambda}{4} \hbar^2 \right\rangle = |--\rangle$$

(ب)

برای مورد $\lambda = 0$ ، هامیلتونی به شکل زیر در می آید:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{eB\hbar}{mc} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-eB\hbar}{mc} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

پس به دلیل قطری شدن هامیلتونی، عناصر روی قطر اصلی ویژه مقادیر خواهند بود و ویژه بردارهای متناظر نیز عبارتند از:

$$|E_1 = 0\rangle = |++\rangle$$

$$\left| E_r = \frac{eB\hbar}{mc} \right\rangle = |+-\rangle$$

$$\left| E_r = \frac{-eB\hbar}{mc} \right\rangle = |-+\rangle$$

$$|E_r = 0\rangle = |--\rangle$$

که این مورد انتظار ما نیز می باشد چون وقتی $\lambda = 0$ ؛ آنگاه:

$$H|m_l m_s\rangle = \left(\frac{eB}{mc}\right)(\hat{S}_z - \hat{S}_{sz})|m_l m_s\rangle = \frac{eB\hbar}{mc}(m_l - m_s)$$

(ب)

برای مورد $B = 0$ خواهیم داشت:

$$H = \lambda(\vec{S}_l \cdot \vec{S}_s) = \frac{\lambda}{2}(S_l^z - S_l^z - S_s^z)$$

که در این رابطه: $\vec{S} = \vec{S}_l + \vec{S}_s$. پس ویژه بردارهای هامیلتونی، $|s, s_r; sm_s\rangle$ ها خواهند بود و داریم:

$$H|s, s_r; sm_s\rangle = \frac{\lambda\hbar^2}{2}\left[s(s+1) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\right] = \frac{\lambda\hbar^2}{2}\left[s(s+1) - \frac{3}{2}\right]$$

البته این نتیجه به طور طبیعی از صفر کردن B در نمایش ماتریسی هامیلتونی نیز به دست می آید.

تمرین ۷-۱۰

$$e^{-i\pi\hat{J}_z/2} e^{-i\pi\hat{J}_x} e^{i\pi\hat{J}_z/2} = e^{-i\pi\hat{J}_y} \quad (\bar{A})$$

$$e^{-i\pi\hat{J}_x}|j, m\rangle = e^{-i\pi j}|j, -m\rangle \quad \text{و} \quad \hat{J}_- e^{-i\pi\hat{J}_x} = e^{-i\pi\hat{J}_x} \hat{J}_+ \quad (\text{ب})$$

$$e^{-i\pi\hat{J}_y}|j, m\rangle = (-1)^{j-m}|j, -m\rangle \quad (\text{ب}) \quad \text{و} \quad (\bar{A}) \quad \text{با استفاده از} \quad (\bar{A})$$

حل:

(\bar{A})

طبق رابطه‌ی اثبات شده در متن کتاب داریم:

$$e^{i\alpha\frac{\hat{J}_z}{\hbar}} \hat{J}_x e^{-i\alpha\frac{\hat{J}_z}{\hbar}} = \hat{J}_x \cos \alpha - \hat{J}_y \sin \alpha$$

$$e^{-i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} = \hat{J}_x \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) - \hat{J}_y \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right) = \hat{J}_y$$

و لذا:

$$e^{-i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} = e^{-i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{\frac{i\pi\hat{J}_z}{2}} e^{-\frac{i\pi\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{\frac{i\pi\hat{J}_z}{2}} = \hat{J}_y \hat{J}_y = \hat{J}_y^2$$

$$e^{-i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} = e^{-i\pi\frac{\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{\frac{i\pi\hat{J}_z}{2}} e^{-\frac{i\pi\hat{J}_z}{2}} \hat{J}_x e^{\frac{i\pi\hat{J}_z}{2}} = \hat{J}_y \hat{J}_y = \hat{J}_y^2$$

بنابراین:

$$e^{\frac{-i\pi J_z}{\hbar}} \hat{J}_x^n e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} = \hat{J}_y^n$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} e^{\frac{-i\pi J_z}{\hbar}} e^{-i\pi J_x} e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} &= e^{\frac{-i\pi J_z}{\hbar}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\pi J_x)^n}{n!} \right) e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\pi)^n}{n!} e^{\frac{-i\pi J_z}{\hbar}} J_x^n e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\pi)^n}{n!} J_y^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\pi J_y)^n}{n!} = e^{-i\pi J_y} \end{aligned}$$

(ب)

ابتدا معادل $e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x}$ را می‌یابیم

$$e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} = e^{i\pi J_x} (J_x - iJ_y) e^{-i\pi J_x} = e^{i\pi J_x} \hat{J}_x e^{-i\pi J_x} - i e^{i\pi J_x} \hat{J}_y e^{-i\pi J_x} = \hat{J}_x + i\hat{J}_y = \hat{J}_+$$

پس:

$$\hat{J}_- e^{-i\pi J_x} = e^{-i\pi J_x} e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} = e^{-i\pi J_x} \hat{J}_+$$

پس نتیجه می‌گیریم که:

$$e^{i\pi J_x} \hat{J}_-^n e^{-i\pi J_x} = e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} \dots e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} = \hat{J}_+^n$$

$$e^{i\pi J_x} \hat{J}_-^n e^{-i\pi J_x} = e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} \dots e^{i\pi J_x} \hat{J}_- e^{-i\pi J_x} = \hat{J}_+ \hat{J}_+ \dots \hat{J}_+ = \hat{J}_+^n$$

حال با فرض: $n = j - m + 1$ ؛ داریم:

$$(\hat{J}_-)^{j-m+1} e^{-i\pi J_x} |j, m\rangle = e^{-i\pi J_x} (\hat{J}_+)^{j-m+1} |j, m\rangle = 0$$

از رابطی اخیر نتیجه می‌شود که $e^{-i\pi J_x} |j, m\rangle$ تا حد یک عامل فاز η باید برابر با $|j, -m\rangle$ باشد.اگر η را $e^{-i\pi j}$ فرض کنیم به رابطی مطلوب خود رسیده‌ایم یعنی:

$$e^{-i\pi J_x} |j, m\rangle = e^{-i\pi j} |j, -m\rangle$$

(پ)

$$\begin{aligned} e^{-i\pi J_y} |j, m\rangle &= e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} |j, m\rangle = e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} e^{-i\pi J_x} e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} |j, m\rangle = e^{\frac{i\pi J_z}{\hbar}} e^{\frac{i\pi m}{\hbar}} e^{-i\pi j} |j, -m\rangle \\ &= e^{\frac{-i\pi}{\hbar}(-m)} e^{\frac{i\pi m}{\hbar}} e^{-i\pi j} |j, -m\rangle = e^{-i\pi(j-m)} |j, -m\rangle = (e^{-i\pi})^{j-m} |j, -m\rangle \\ &= [\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)]^{j-m} |j, -m\rangle = (-1)^{j-m} |j, m\rangle \end{aligned}$$

تمرین ۷-۱۱

با استفاده از روابط جابه‌جایی میان ماتریس‌های پاولی نشان دهید که:

$$e^{i\alpha\sigma_y}\sigma_x e^{-i\alpha\sigma_y} = \sigma_x \cos(2\alpha) + \sigma_z \sin(2\alpha) \quad (\bar{A})$$

$$e^{i\alpha\sigma_z}\sigma_x e^{-i\alpha\sigma_z} = \sigma_x \cos(2\alpha) - \sigma_y \sin(2\alpha) \quad (\text{ب})$$

$$e^{i\alpha\sigma_x}\sigma_y e^{-i\alpha\sigma_x} = \sigma_y \cos(2\alpha) - \sigma_z \sin(2\alpha) \quad (\text{پ})$$

حل:

در اینجا باید توجه داشته باشیم که:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} e^{i\alpha\sigma_y}\sigma_x e^{-i\alpha\sigma_y} &= \sigma_x + [i\alpha\sigma_y, \sigma_x] + \frac{1}{2!}[i\alpha\sigma_y, [i\alpha\sigma_y, \sigma_x]] + \frac{1}{3!}[i\alpha\sigma_y, [i\alpha\sigma_y, [i\alpha\sigma_y, \sigma_x]]] + \dots \\ &= \sigma_x + 2\alpha\sigma_z + \frac{1}{2!}[i\alpha\sigma_y, +2\alpha\sigma_z] + \frac{1}{3!}[i\alpha\sigma_y, [i\alpha\sigma_y, +2\alpha\sigma_z]] + \dots \\ &= \sigma_x + 2\alpha\sigma_z - \frac{1}{2!}(2\alpha)^2\sigma_x - \frac{1}{3!}(2\alpha)^2\sigma_z + \dots = \sigma_x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2\alpha)^{2n}}{(2n)!} \\ &\quad + \sigma_z \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2\alpha)^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sigma_x \cos(2\alpha) + \sigma_z \sin(2\alpha) \end{aligned}$$

به‌طور مشابه قسمت‌های (ب) و (پ) را نیز می‌توان ثابت کرد.

تمرین ۷-۱۲

(آ) نشان دهید که چگونه $\hat{J}_x$ ، $\hat{J}_y$ و $\hat{J}_z$ تحت یک دوران متناهی به اندازه‌ی زاویه‌ی α حول محور x تبدیل می‌شوند.

(ب) با استفاده از نتایج قسمت (آ) تعیین کنید چگونه عملگر اندازه حرکت زاویه‌ای $\hat{J}$ تحت دوران تبدیل می‌شود.

حل:

(آ)

عملگر متناظر با دوران به اندازه‌ی زاویه‌ی α حول محور x توسط $\hat{R}_x(\alpha) = e^{-i\alpha\frac{\hat{J}_x}{\hbar}}$ داده می‌شود. تحت این دوران، عملگر $\hat{B}$ نظیر $\hat{B}' = \hat{R}_x^\dagger \hat{B} \hat{R}_x$ تبدیل می‌شود. با استفاده از رابطه:

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{3!}[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots$$

و نیز روابط جابه‌جایی:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z, \quad [\hat{J}_x, \hat{J}_z] = -i\hbar \hat{J}_y$$

خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} e^{\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J}_y e^{-\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar}} &= \hat{J}_y + \frac{i\alpha}{\hbar} [\hat{J}_x, \hat{J}_y] - \frac{\alpha^2}{2!\hbar^2} [\hat{J}_x, [\hat{J}_x, \hat{J}_y]] + \dots \\ &= \hat{J}_y - \alpha \hat{J}_z - \frac{\alpha^2}{2!} \hat{J}_y + \frac{\alpha^3}{3!} \hat{J}_z + \frac{\alpha^4}{4!} \hat{J}_y - \frac{\alpha^5}{5!} \hat{J}_z + \dots \\ &= \hat{J}_y \left(1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} - \dots \right) - \hat{J}_z \left(\alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} - \dots \right) = \hat{J}_y \cos \alpha - \hat{J}_z \sin \alpha \end{aligned}$$

به‌طور مشابه می‌توان نشان داد که:

$$e^{\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J}_z e^{-\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar}} = \hat{J}_y \sin \alpha + \hat{J}_z \cos \alpha$$

(ب)

تحت این دوران، عملگر اندازه حرکت زاویه‌ای $\hat{J}$ به‌صورت زیر تغییر خواهد کرد:

$$e^{\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J} e^{-\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{pmatrix}$$

تمرین ۷-۱۳

(آ) نشان دهید چگونه عملگر $J_{\pm}$ تحت دورانی به اندازه‌ی زاویه‌ی π حول محور x تبدیل می‌شود.

(ب) از نتیجه‌ی قسمت (آ) استفاده کنید تا نشان دهید که $\hat{J}_{\pm} e^{-i\pi \hat{J}_x / \hbar} = e^{-i\pi \hat{J}_x / \hbar} \hat{J}_{\pm}$

حل:

از قسمت (ب) تمرین ۷-۸ داریم:

$$e^{\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J}_{-} e^{-\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} = \hat{J}_{+} \Rightarrow \hat{J}_{-} = e^{-\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J}_{+} e^{\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}}$$

پس:

$$\left(e^{\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J}_{+} e^{-\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} \right)^{\dagger} = J_{-}^{\dagger}$$

$$e^{-\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} \hat{J}_{-} e^{\frac{i\pi \hat{J}_x}{\hbar}} = \hat{J}_{+}$$

یعنی در حالت کلی:

$$e^{\frac{i\pi J_x}{\hbar}} \hat{J}_{\pm} e^{-\frac{i\pi J_x}{\hbar}} = \hat{J}_{\mp}$$

لذا:

$$\hat{J}_{\pm} e^{-\frac{i\pi J_x}{\hbar}} = e^{-\frac{i\pi J_x}{\hbar}} e^{\frac{i\pi J_x}{\hbar}} \hat{J}_{\pm} e^{-\frac{i\pi J_x}{\hbar}} = e^{-\frac{i\pi J_x}{\hbar}} \hat{J}_{\mp}$$

تمرین ۷-۱۴

دورانی با زاویه متناهی α حول یک محور $\hat{n}$ را در نظر بگیرید که بردار یکه‌ی $\hat{a}$ را به یک بردار یکه‌ی دیگر $\hat{b}$ تبدیل می‌کند. نشان دهید که

$$e^{-i\beta \hat{J}_b / \hbar} = e^{i\alpha \hat{J}_n / \hbar} e^{-i\beta \hat{J}_b / \hbar} e^{-i\alpha \hat{J}_n / \hbar}$$

حل:

باید توجه داشت که $\hat{J}$ تحت دوران مانند یک بردار رفتار می‌کند و چون:

$$\vec{b} = R_n(\alpha) \vec{a}$$

بنابراین:

$$e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \hat{J}_a e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} = \hat{J}_b$$

و از این رابطه می‌توان گفت:

$$e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \hat{J}_a^m e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} = \hat{J}_b^m$$

زیرا:

$$e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \hat{J}_a^m e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} = e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \hat{J}_a e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \hat{J}_a e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \dots e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \hat{J}_a e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} = \hat{J}_b \hat{J}_b \dots \hat{J}_b = \hat{J}_b^m$$

پس:

$$e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} e^{-i\beta \frac{\hat{J}_a}{\hbar}} e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} \frac{1}{m!} \left(\frac{-i\beta \hat{J}_a}{\hbar} \right)^m e^{-i\alpha \frac{\hat{J}_n}{\hbar}} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\frac{-i\beta \hat{J}_b}{\hbar} \right)^m = e^{-i\beta \frac{\hat{J}_b}{\hbar}}$$

تمرین ۷-۱۵

$$e^{i\pi \hat{J}_y / 2\hbar} \hat{J}_x e^{-i\pi \hat{J}_y / 2\hbar} = \hat{J}_z \quad (\text{آ})$$

$$e^{i\pi \hat{J}_y / 2\hbar} e^{i\alpha \hat{J}_x / \hbar} e^{-i\pi \hat{J}_y / 2\hbar} = e^{i\alpha \hat{J}_z / \hbar} \quad (\text{ب})$$

$$e^{i\alpha \hat{J}_z / \hbar} \hat{A}_x e^{-i\alpha \hat{J}_z / \hbar} = \hat{A}_x \cos \alpha - \hat{A}_y \sin \alpha \quad (\text{پ})$$

حل:

(ا)

با توجه به اتحاد:

$$e^{\hat{A}} \hat{B} e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \frac{1}{3!} [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots$$

و چون:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \hat{J}_x e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} &= \hat{J}_x + \left[\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}, \hat{J}_x \right] + \frac{1}{2!} \left[\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}, \left[\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}, \hat{J}_x \right] \right] + \frac{1}{3!} \left[\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}, \left[\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}, \left[\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}, \hat{J}_x \right] \right] \right] + \dots \\ &= \hat{J}_x + \frac{i\pi}{2\hbar} [\hat{J}_y, \hat{J}_x] + \frac{1}{2!} \left(\frac{i\pi}{2\hbar} \right)^2 [\hat{J}_y, [\hat{J}_y, \hat{J}_x]] + \frac{1}{3!} \left(\frac{i\pi}{2\hbar} \right)^3 [\hat{J}_y, [\hat{J}_y, [\hat{J}_y, \hat{J}_x]]] + \dots \\ &= \hat{J}_x + \frac{i\pi}{2\hbar} [-i\hbar \hat{J}_z] + \frac{1}{2!} \left(\frac{i\pi}{2\hbar} \right)^2 [\hat{J}_y, -i\hbar \hat{J}_z] + \frac{1}{3!} \left(\frac{i\pi}{2\hbar} \right)^3 [\hat{J}_y, \hbar^2 \hat{J}_x] + \dots \\ &= \hat{J}_x + \frac{\pi}{2} \hat{J}_z - \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \hat{J}_x - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^3 \hat{J}_z + \dots \\ &= \hat{J}_x \left(1 - \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 + \dots \right) + \hat{J}_z \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^3 + \dots \right) = \hat{J}_x \cos \frac{\pi}{2} + \hat{J}_z \sin \frac{\pi}{2} = \hat{J}_z \end{aligned}$$

(ب)

با توجه به اینکه:

$$e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \hat{J}_x^n e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} = e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \hat{J}_x e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \hat{J}_x e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \dots e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \hat{J}_x e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} = \hat{J}_z \hat{J}_z \dots \hat{J}_z = \hat{J}_z^n$$

پس:

$$\begin{aligned} e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} e^{i\alpha \frac{\hat{J}_x}{\hbar}} e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} &= e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i\alpha \hat{J}_x}{\hbar} \right)^n e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i\alpha}{\hbar} \right)^n e^{\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} \hat{J}_x^n e^{-\frac{i\pi \hat{J}_y}{2\hbar}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar} \right)^n \\ &= e^{\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}} \end{aligned}$$

(پ)

با استفاده از روابط (۷-۲۸۲) الی (۷-۲۸۴) متن کتاب داریم:

$$\begin{aligned} e^{\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}} \hat{A}_x e^{-\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}} &= \hat{A}_x + \left[\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}, \hat{A}_x \right] + \frac{1}{2!} \left[\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}, \left[\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}, \hat{A}_x \right] \right] + \frac{1}{3!} \left[\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}, \left[\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}, \left[\frac{i\alpha \hat{J}_z}{\hbar}, \hat{A}_x \right] \right] \right] \\ &= \hat{A}_x + \frac{i\alpha}{\hbar} [\hat{J}_z, \hat{A}_x] - \frac{\alpha^2}{2! \hbar^2} [\hat{J}_z, [\hat{J}_z, \hat{A}_x]] - \frac{i\alpha^3}{3! \hbar^3} [\hat{J}_z, [\hat{J}_z, [\hat{J}_z, \hat{A}_x]]] + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \hat{A}_x - \alpha \hat{A}_y - \frac{\alpha^2}{2!} \hat{A}_x + \frac{\alpha^2}{2!} \hat{A}_y + \frac{\alpha^3}{3!} \hat{A}_x - \frac{\alpha^3}{3!} \hat{A}_y + \dots \\
&= \hat{A}_x \left(1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} - \dots \right) - \hat{A}_y \left(\alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} - \dots \right) = \hat{A}_x \cos \alpha - \hat{A}_y \sin \alpha
\end{aligned}$$

تمرین ۷-۱۶

با استفاده از $\hat{J} = \hat{J}_x + \hat{J}_y$ نشان دهید که

$$d_{mm'}^{(j)}(\beta) = \sum_{m_1 m_2} \sum_{m'_1 m'_2} \langle j_1, j_2; m_1, m_2 | j, m \rangle \langle j_1, j_2; m'_1, m'_2 | j, m' \rangle d_{m_1 m'_1}^{(j_1)}(\beta) d_{m_2 m'_2}^{(j_2)}(\beta)$$

حل:

در اینجا باید بدانیم که:

$$\hat{J}_y = \hat{J}_{1y} + \hat{J}_{2y}$$

$$|j_1, j_2; m_1 m_2\rangle = |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$$

با توجه به این نکات داریم:

$$d_{mm'}^{(j)}(\beta) = \left\langle j_1, j_2; jm \left| e^{\frac{-iJ_y\beta}{\hbar}} \right| j_1, j_2; jm' \right\rangle$$

اما از طرفی:

$$|j_1, j_2; jm'\rangle = \sum_{m'_1 m'_2} |j_1, j_2; m'_1 m'_2\rangle \langle j_1, j_2; m'_1 m'_2 | j_1, j_2; jm'\rangle$$

$$\langle j_1, j_2; jm | = \sum_{m_1 m_2} \langle j_1, j_2; m_1 m_2 | \langle j_1, j_2; m_1 m_2 | j_1, j_2; jm \rangle$$

در نوشتن خط آخر از حقیقی بودن ضرایب کلبش - گوردون استفاده کرده ایم. پس خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}
d_{mm'}^{(j)}(\beta) &= \sum_{m_1 m_2} \sum_{m'_1 m'_2} \langle j_1, j_2; m_1 m_2 | j_1, j_2; jm \rangle \langle j_1, j_2; m'_1 m'_2 | j_1, j_2; jm' \rangle \left\langle j_1, j_2; m_1 m_2 \left| e^{\frac{-i\beta(J_{1y} + J_{2y})}{\hbar}} \right| j_1, j_2; m'_1 m'_2 \right\rangle \\
&= \sum_{m_1 m_2} \sum_{m'_1 m'_2} \langle j_1, j_2; m_1 m_2 | j_1, j_2; jm \rangle \langle j_1, j_2; m'_1 m'_2 | j_1, j_2; jm' \rangle \left\langle j_1, m_1 \left| e^{\frac{-i\beta J_{1y}}{\hbar}} \right| j_1, m'_1 \right\rangle \left\langle j_2, m_2 \left| e^{\frac{-i\beta J_{2y}}{\hbar}} \right| j_2, m'_2 \right\rangle \\
&= \sum_{m_1 m_2} \sum_{m'_1 m'_2} \langle j_1, j_2; m_1 m_2 | j_1, j_2; jm \rangle \langle j_1, j_2; m'_1 m'_2 | j_1, j_2; jm' \rangle d_{m_1 m'_1}^{(j_1)}(\beta) d_{m_2 m'_2}^{(j_2)}(\beta)
\end{aligned}$$

تمرین ۷-۱۷

تانسور $A(\theta, \varphi) = \cos \theta \sin \theta \cos \varphi$ را در نظر بگیرید.

(آ) درایه های ماتریسی $A_{m'm} = \langle l, m' | A | l, m \rangle$ را برای $l=1$ حساب کنید.

(ب) $A(\theta, \phi)$ را برحسب مؤلفه‌های یک تانسور کروی از درجه‌ی ۲ بیان کنید. (یعنی برحسب $Y_{2m}(\theta, \phi)$)

(پ) دوباره، همه‌ی درایه‌های ماتریسی $A_{m'm}$ را محاسبه کنید، اما این بار با استفاده از قضیه‌ی ویگنر-اکارت. این نتایج را با نتایج به‌دست آمده که در (آ) مقایسه کنید. (ضرایب کلبش-گوردون را از جدول به‌دست آورید.)

حل:

(آ)

ابتدا شکل انتگرالی $A_{m'm}$ را می‌نویسیم:

$$A_{m'm} = \int d\Omega Y_{m'}^*(\theta, \phi) \cos \theta \sin \theta \cos \phi Y_m(\theta, \phi)$$

پس:

$$\begin{aligned} A_{1,1} &= \int d\Omega Y_{1,1}^*(\theta, \phi) \cos \theta \sin \theta \cos \phi Y_{1,1}(\theta, \phi) \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi -\sqrt{\frac{3}{4\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \theta \cos \phi \left(-\sqrt{\frac{3}{4\pi}} e^{i\phi} \sin \theta \right) \sin \theta d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi \int_0^\pi \frac{3}{4\pi} \sin^4 \theta \cos \theta d\theta = 0 \end{aligned}$$

به‌همین ترتیب $A_{-1,-1}, A_{1,-1}$ نیز صفر می‌شوند.

$$\begin{aligned} A_{1,0} &= A_{1,0}^* = \int d\Omega Y_{1,0}^*(\theta, \phi) \cos \theta \sin \theta \cos \phi Y_{1,0}(\theta, \phi) \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi -\sqrt{\frac{3}{4\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \sin \theta d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \cos \phi e^{-i\phi} \int_0^\pi \frac{3\sqrt{2}}{4\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = \pi \frac{-3\sqrt{2}}{4\pi} \left(\frac{4}{15} \right) = \frac{-\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{1,-1} &= A_{1,-1}^* = \int d\Omega Y_{1,-1}^*(\theta, \phi) \cos \theta \sin \theta \cos \phi Y_{1,-1}(\theta, \phi) \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi -\sqrt{\frac{3}{4\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \theta \cos \phi \left(\sqrt{\frac{3}{4\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \right) \sin \theta d\theta \\ &= -\int_0^{2\pi} e^{-2i\phi} \cos \phi d\phi \int_0^\pi \frac{3}{4\pi} \sin^4 \theta \cos \theta d\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{-1,0} &= A_{-1,0}^* = \int d\Omega Y_{1,0}^*(\theta, \phi) \cos \theta \sin \theta \cos \phi Y_{-1,0}(\theta, \phi) \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \cos \theta \sin \theta \cos \phi \sqrt{\frac{3}{4\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} \cdot & \frac{-\sqrt{2}}{1.0} & \cdot \\ \frac{-\sqrt{2}}{1.0} & \cdot & \frac{\sqrt{2}}{1.0} \\ \cdot & \frac{\sqrt{2}}{1.0} & \cdot \end{pmatrix}$$

(ب)

با استفاده از رابطه:

$$Y_{r\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} e^{\pm i\phi} \sin \theta \cos \theta$$

می‌توان $A(r, \theta)$ را بر حسب $Y_{r\pm 1}$ به دست آورد، برای این منظور داریم:

$$A(\theta, \phi) = \cos \theta \sin \theta \cos \phi = \cos \theta \sin \theta \left(\frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2} \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} (-Y_{r+1} + Y_{r-1})$$

(پ)

قضیه‌ی ویگنر - اکارت به صورت زیر است:

$$\langle j'm' | \hat{T}_q^{(k)} | j, m \rangle = \langle jk; m, q | j'm' \rangle \langle j' || \hat{T}^{(k)} || j \rangle$$

که در آن $T_q^{(k)}$ مؤلفه q ام یک تانسور مرتبه k می‌باشد.

$$\begin{aligned} \langle 1, m' | A(\theta, \phi) | 1, m \rangle &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [-\langle 1, m' | Y_{r1} | 1, m \rangle + \langle 1, m' | Y_{r,-1} | 1, m \rangle] \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [-\langle 12; m, 1 | m' \rangle + \langle 12; m, -1 | m' \rangle] \langle 1 || Y_r || 1 \rangle \end{aligned}$$

از رابطه‌ی اخیر واضح است که $A_{m'm}$ فقط وقتی صفر است که:

$$\Delta m = m' - m = \pm 1$$

پس بنابراین عناصر غیر صفر عبارت از $A_{\pm 1, 0}$ ، $A_{\pm 1, \pm 1}$ ، $A_{0, \pm 1}$ می‌باشند. حال کار را ادامه می‌دهیم:

$$\langle 11 | Y_{r1} | 10 \rangle = \langle 12; 0, 1 | 11 \rangle \langle 1 || Y_r || 1 \rangle$$

حال به محاسبه‌ی مستقیم $\langle 11 | Y_{r1} | 10 \rangle$ می‌پردازیم.

$$\begin{aligned} \langle 11 | Y_{r1} | 10 \rangle &= \int d\Omega Y_{11}^*(\theta, \phi) Y_{r1} Y_{10}(\theta, \phi) \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sqrt{\frac{2}{\lambda\pi}} e^{-i\phi} \sin \theta \left(-\sqrt{\frac{15}{8\pi}} e^{i\phi} \sin \theta \cos \theta \right) \sqrt{\frac{2}{4\pi}} \cos \theta \sin \theta d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{2\sqrt{15}}{\lambda\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = +2\pi \frac{2\sqrt{15}}{\lambda\pi} \frac{4}{15} = \frac{1}{1.0} \sqrt{\frac{15}{\pi}} \end{aligned}$$

پس:

$$\langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle = \frac{\langle 11 | Y_r | 10 \rangle}{\langle 12; 0 | 11 \rangle} = \frac{\frac{1}{10} \sqrt{\frac{15}{\pi}}}{-\sqrt{\frac{2}{10}}} = -\frac{1}{10} \sqrt{\frac{50}{\pi}}$$

حال با دانستن $\langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle$ به محاسبه‌ی $A_{\pm 1}$ ، A_{10} و A_{-10} می‌پردازیم.

$$\begin{aligned} A_{10} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [-\langle 12; 1 | 10 \rangle + \langle 12; 1, -1 | 10 \rangle] \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \langle 12; 1, -1 | 10 \rangle \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \times \frac{-1}{10} \sqrt{\frac{50}{\pi}} \times \sqrt{\frac{2}{10}} = -\frac{\sqrt{2}}{10} = A_{10}^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{-10} &= A_{10}^* = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [-\langle 12, -1 | 10 \rangle + \langle 12, -1, -1 | 10 \rangle] \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \langle 12; -1 | 10 \rangle \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle \\ &= +\frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \times \sqrt{\frac{2}{10}} \times \frac{+1}{10} \sqrt{\frac{50}{\pi}} = +\frac{\sqrt{2}}{10} \end{aligned}$$

ملاحظه می‌شود که نتایج دقیقاً با قسمت (آ) یکسان است.

تمرین ۷-۱۸

(آ) $\frac{x^2 - y^2}{r^2}$ و $\frac{xz}{r^2}$ را برحسب مؤلفه‌های یک تانسور کروی از درجه‌ی ۲ بیان کنید.

(ب) با استفاده از قضیه‌ی ویگنر - اکارت، مقادیر $\langle 1, 0 | \frac{xz}{r^2} | 1, 1 \rangle$ و $\langle 1, 1 | (x^2 - y^2) / r^2 | 1, -1 \rangle$ را محاسبه کنید.

حل:
(آ)

در اینجا از روابط زیر استفاده می‌کنیم:

$$Y_{r\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} e^{\pm i\phi} \sin \theta \cos \theta$$

$$Y_{r\pm 2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} e^{\pm 2i\phi} \sin^2 \theta$$

حال به ادامگی کار می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} \frac{xz}{r^2} &= \frac{r \sin \theta \cos \phi r \cos \theta}{r^2} = \sin \theta \cos \theta \cos \phi = \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta (e^{i\phi} + e^{-i\phi}) \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [-Y_{r1}(\theta, \phi) + Y_{r-1}(\theta, \phi)] \end{aligned}$$

$$\frac{x^r - y^r}{r^r} = \frac{r^r \sin^r \theta \cos^r \phi - r^r \sin^r \theta \sin^r \phi}{r^r} = \sin^r \theta (\cos^r \phi - \sin^r \phi) = \sin^r \theta \cos^r \phi$$

$$= \frac{1}{r} \sin^r \theta (e^{r i \phi} + e^{-r i \phi}) = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{r^r \pi}{15}} (Y_{rr} + Y_{r-r})$$

(ب)

$$\left\langle 1, \left| \frac{xz}{r^r} \right|, 1 \right\rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \langle 1, 0 | -Y_{r1} + Y_{r-1} | 1, 1 \rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} [-\langle 1, r; 1, 1 | 1, 0 \rangle + \langle 1, r; 1, -1 | 1, 0 \rangle] \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle$$

$$= \frac{1}{r} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \langle 1, r; 1, -1 | 1, 0 \rangle \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \times \sqrt{\frac{r}{10}} \times \frac{-1}{10} \sqrt{\frac{50}{\pi}} = \frac{-\sqrt{r}}{10}$$

$$\left\langle 1, \left| \frac{x^r - y^r}{r^r} \right|, -1 \right\rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{r^r \pi}{15}} \langle 1, 1 | Y_{rr} + Y_{r-r} | 1, -1 \rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{r^r \pi}{15}} [\langle 1, r; -1, r | 1, -1 \rangle + \langle 1, r; -1, -r | 1, -1 \rangle] \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle$$

$$= \frac{1}{r} \sqrt{\frac{r^r \pi}{15}} \langle 1, r; -1, r | 1, -1 \rangle + \langle 1, r; -1, -r | 1, -1 \rangle \langle 1 \| Y_r \| 1 \rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{r^r \pi}{15}} \times \sqrt{\frac{r}{5}} \times \frac{-1}{10} \sqrt{\frac{50}{\pi}}$$

$$= \frac{-r}{5}$$

تمرین ۷-۱۹

نشان دهید که $\langle j, m' | e^{-i\beta \hat{J}_y / \hbar} \hat{J}_z e^{i\beta \hat{J}_y / \hbar} | j, m \rangle = \sum_{m=-j}^{m=j} m^r |d_{m'm}^{(j)}(\beta)|^r$

حل:

$$\left\langle j, m' | e^{-\frac{i\beta \hat{J}_y}{\hbar}} \hat{J}_z e^{\frac{i\beta \hat{J}_y}{\hbar}} | j, m \rangle = \sum_m \left\langle j, m' | e^{-\frac{i\beta \hat{J}_y}{\hbar}} \hat{J}_z | j, m \right\rangle \left\langle j, m | e^{\frac{i\beta \hat{J}_y}{\hbar}} | j, m' \right\rangle$$

$$= \sum_m m^r \hbar^r \left\langle j, m' | e^{-\frac{i\beta \hat{J}_y}{\hbar}} | j, m \right\rangle \left\langle j, m | e^{\frac{i\beta \hat{J}_y}{\hbar}} | j, m' \right\rangle^\dagger$$

$$= \sum_m m^r \hbar^r d_{m'm}^{(j)}(\beta) d_{m'm}^{(j)*}(\beta) = \sum_m m^r \hbar^r |d_{m'm}^{(j)}(\beta)|^r$$

تمرین ۷-۲۰

رد ماتریس دوران $D^{(\frac{1}{2})}(\alpha, \beta, \gamma)$ را برای (آ) $\beta = \pi$ (ب) $\alpha = \gamma = \pi$ و $\beta = 2\pi$ محاسبه کنید.

حل:

طبق رابطه‌ی موجود در متن کتاب داریم:

$$D^{\left(\frac{1}{2}\right)}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} e^{\frac{-i(\alpha+\gamma)}{2}} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) & -e^{\frac{-i(\alpha-\gamma)}{2}} \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ e^{\frac{i(\alpha-\gamma)}{2}} \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) & e^{\frac{i(\alpha+\gamma)}{2}} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

رد هر عملگر، جمع عناصر روی قطر اصلی آن است:

$$\text{Tr} \left(D^{\left(\frac{1}{2}\right)}(\alpha, \beta, \gamma) \right) = e^{\frac{-i(\alpha+\gamma)}{2}} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) + e^{\frac{i(\alpha+\gamma)}{2}} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) = 2 \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha+\gamma}{2}\right) \text{ پس:}$$

بنابراین:

(ا)

$$\text{Tr} \left(D^{\left(\frac{1}{2}\right)}(\alpha, \pi, \gamma) \right) = 2 \cos \frac{\pi}{2} \cos \left(\frac{\alpha+\gamma}{2} \right) = 0$$

(ب)

$$\text{Tr} \left(D^{\left(\frac{1}{2}\right)}(\pi, 2\pi, \pi) \right) = 2 \cos \frac{2\pi}{2} \cos \left(\frac{\pi+\pi}{2} \right) = 2$$

تمرین ۷-۲۱

عملگر گشتاور چهار قطبی بار q با $\hat{Q}_r = q(3\hat{z}^2 - r^2)$ داده می‌شود. $\hat{Q}_r$ را برحسب یک تانسور کروی تحویل‌ناپذیر از درجه‌ی ۲ بنویسید و آن‌گاه $\langle j, j | \hat{Q}_r | j, j \rangle$ را برحسب j و درایه‌ی ماتریسی کاهش‌یافته‌ی $\langle j || r^2 Y^{(2)} || j \rangle$ بیان کنید.

(راهنمایی: می‌توانید از ضریب $\langle j, 2; m, 0 | j, m \rangle = (-1)^{j-m} [2m^2 - j(j+1)] / \sqrt{(2j-1)j(j+1)(2j+3)}$ استفاده کنید.)



بردار یکدی زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\hat{n} = \hat{i} \sin \theta \cos \phi + \hat{j} \sin \theta \sin \phi + \hat{k} \cos \theta$$

می‌دانیم که:

$$Y_{r.}(\theta, \phi) = Y_{r.}(\hat{n}) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (r \cos^2 \theta - 1) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (r \hat{n}_z^2 - |\hat{n}|^2)$$

پس:

$$Y_r(\hat{R}) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3z^2 - r^2)$$

پس $\hat{Q}_r$ در واقع عنصر صفراًم ($q=0$) یک تانسور کروی رتبه‌ی دو ($k=2$) می‌باشد.
اما برای محاسبه‌ی $\langle jj|Q_r|jj\rangle$ از قضیه‌ی ویگنر - اکارت استفاده می‌کنیم.

$$\begin{aligned}\langle jj|Q_r|jj\rangle &= \langle j^2; j_0|jj\rangle \langle j||Q_r||j\rangle = \langle j^2; j_0|jj\rangle \langle j||r^2 Y^{(2)}||j\rangle \\ &= \frac{(-1)^{j-j} [3j^2 - j(j+1)]}{\sqrt{(2j-1)j(j+1)(2j+3)}} \langle j||r^2 Y^{(2)}||j\rangle = \frac{j(2j-1)}{\sqrt{(2j-1)j(j+1)(2j+3)}}\end{aligned}$$

تمرین ۷-۲۲

روابط جابه‌جایی زیر را ثابت کنید:

(آ)

$$[\hat{J}_x, [\hat{J}_x, T_q^{(k)}]] = \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_x^2 | k, q \rangle$$

(ب)

$$[\hat{J}_x, [J_x, T_q^{(k)}]] + [J_y, [J_y, T_q^{(k)}]] + [J_z, [J_z, T_q^{(k)}]] = k(k+1)\hbar^2 T_q^{(k)}$$

حل:

(آ)

طبق رابطه‌ی (۷-۳۱۴) متن کتاب داریم:

$$[\hat{J}_x, T_q^{(k)}] = \sum_{q'=-k}^{+k} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_x | k, q \rangle$$

پس:

$$\begin{aligned}[\hat{J}_x, [\hat{J}_x, T_q^{(k)}]] &= \left[\hat{J}_x, \sum_{q'=-k}^{+k} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_x | k, q \rangle \right] = \sum_{q'=-k}^{+k} \langle k, q' | \hat{J}_x | k, q \rangle [\hat{J}_x, T_{q'}^{(k)}] \\ &= \sum_{q'} \sum_{q''} \langle k, q' | \hat{J}_x | k, q \rangle T_{q''}^{(k)} \langle k, q'' | \hat{J}_x | k, q' \rangle \\ &= \sum_{q'} \sum_{q''} T_{q''}^{(k)} \langle k, q'' | [\hat{J}_x, | k, q' \rangle] \langle k, q' | \hat{J}_x | k, q \rangle = \sum_{q''} T_{q''}^{(k)} \langle k, q'' | \hat{J}_x^2 | k, q \rangle \\ &= \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_x^2 | k, q \rangle\end{aligned}$$

(ب)

به‌همان ترتیب قسمت (آ) می‌توان ثابت کرد:

$$[\hat{J}_y, [\hat{J}_y, T_q^{(k)}]] = \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_y^2 | k, q \rangle [\hat{J}_z, [\hat{J}_z, T_q^{(k)}]] = \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_z^2 | k, q \rangle$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} [\hat{J}_x, [\hat{J}_x, T_q^{(k)}]] + [\hat{J}_y, [\hat{J}_y, T_q^{(k)}]] + [\hat{J}_z, [\hat{J}_z, T_q^{(k)}]] &= \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2 | k, q \rangle \\ &= \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} \langle k, q' | k(k+1) \hbar^2 | k, q \rangle \\ &= \sum_{q'} T_{q'}^{(k)} k(k+1) \hbar^2 \delta_{q,q'} = k(k+1) \hbar^2 T_q^{(k)} \end{aligned}$$

تمرین ۷-۲۳

ذره‌ای با اسپین $\frac{1}{2}$ را در نظر بگیرید که دارای اندازه حرکت زاویه‌ای مداری $l=1$ است. همگی ضرایب کلبش - گوردون در جمع اندازه حرکت‌های زاویه‌ای مداری و اسپینی این ذره را بیابید. (راهنمایی: ضریب کلبش - گوردون $\langle j_1, j_2; j_1, j_2 | j_1, j_2 \rangle$ حقیقی و مثبت است).

حل:

با توجه به روابط:

$$\left\langle l, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| l + \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}$$

$$\left\langle l, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| l + \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}$$

$$\left\langle l, \frac{1}{2}; m + \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| l - \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}$$

$$\left\langle l, \frac{1}{2}; m - \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| l - \frac{1}{2}, m \right\rangle = -\sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}$$

ضرایب کلبش - گوردون غیر صفر عبارت خواهند بود از:

$$\left\langle l, \frac{1}{2}; l, \frac{1}{2} \middle| l, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = 1$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = 1$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = -\sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = -\sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 1 + 1}} = -\sqrt{\frac{2}{3}}$$

تمرین ۷-۲۴

این مسأله به روش دیگر استخراج درایه‌های ماتریس $d^{(1)}(\beta)$ می‌پردازد. با استفاده از رابطه‌ی

$$d_{mm'}^{(j)}(\beta) = \sum_{m_1 m_2} \sum_{m'_1 m'_2} \langle j_1, j_2; m_1, m_2 | j, m \rangle \langle j_1, j_2; m'_1, m'_2 | j, m' \rangle d_{m_1 m'_1}^{(j_1)}(\beta) d_{m_2 m'_2}^{(j_2)}(\beta)$$

برای حالتی که در آن $j_1 = j_2 = \frac{1}{2}$ و همراه با درایه‌های ماتریس $d^{(\frac{1}{2})}(\beta)$ که در (۷-۱۸۹) داده می‌شوند، همه‌ی درایه‌های ماتریس $d^{(1)}(\beta)$ را به دست آورید.

حل: طبق رابطه‌ی (۷-۸۹) داریم:

$$d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

حال با استفاده از رابطه‌ی داده شده، عناصر ماتریس $d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta)$ را می‌یابیم:

$$d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) = \sum_{m_1 m_r} \sum_{m'_1 m'_r} \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m_1 m_r | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m'_1 m'_r | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle d_{m_1 m'_1}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{m_r m'_r}^{(\frac{1}{2})}(\beta)$$

می‌دانیم $\langle j_1 j_2; m_1 m_2 | j m \rangle$ فقط وقتی غیر صفر است که:

$$m = m_1 + m_2$$

با توجه به این نکته داریم:

$$d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) = \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle d_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) = 1 \times 1 \times \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} = \cos^2 \frac{\beta}{2}$$

$$\begin{aligned} d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) &= \sum_{m_1 m_r} \sum_{m'_1 m'_r} \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m_1 m_r | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m'_1 m'_r | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle d_{m_1 m'_1}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{m_r m'_r}^{(\frac{1}{2})}(\beta) \\ &= \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle d_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{\frac{1}{2} -\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) + \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ &\quad \times d_{\frac{1}{2} -\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{-\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) = 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{\beta}{2} \left(-\sin \frac{\beta}{2} \right) + 1 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\sin \frac{\beta}{2} \right) \cos \frac{\beta}{2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) &= \sum_{m_1 m_r} \sum_{m'_1 m'_r} \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m_1 m_r | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m'_1 m'_r | \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle d_{m_1 m'_1}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{m_r m'_r}^{(\frac{1}{2})}(\beta) \\ &= \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle d_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{-\frac{1}{2} -\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) = 1 \times 1 \left(\frac{-\sin \beta}{2} \right) \left(-\sin \frac{\beta}{2} \right) = \sin^2 \frac{\beta}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_{\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) &= \sum_{m_1 m_r} \sum_{m'_1 m'_r} \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m_1 m_r | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; m'_1 m'_r | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle d_{m_1 m'_1}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{m_r m'_r}^{(\frac{1}{2})}(\beta) \\ &= \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle d_{\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{\frac{1}{2} -\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) + \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle \\ &\quad \times d_{\frac{1}{2} -\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{-\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) + \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | \frac{1}{2}, 0 \right\rangle d_{-\frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) d_{-\frac{1}{2} -\frac{1}{2}}^{(\frac{1}{2})}(\beta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \middle| 1, 0 \right\rangle \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \middle| 1, 0 \right\rangle d_{\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}}^{(1)}(\beta) d_{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}}^{(1)}(\beta) + \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \middle| 1, 0 \right\rangle \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \middle| 1, 0 \right\rangle \\
& \times d_{\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}}^{(1)}(\beta) d_{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}}^{(1)}(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\sin \frac{\beta}{2} \right) \sin \frac{\beta}{2} \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\beta}{2} \left(-\sin \frac{\beta}{2} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} = \cos^2 \frac{\beta}{2} - \sin^2 \frac{\beta}{2} = \cos \beta
\end{aligned}$$

برای به دست آوردن بقیه‌ی عناصر می‌توان همین روش را ادامه داد ولی ما از رابطی زیر استفاده می‌کنیم:

$$d_{m'm}^{(j)}(\beta) = (-1)^{m'-m} d_{mm'}^{(j)}(\beta) = (-1)^{m'-m} d_{-m'-m}^{(j)}(\beta)$$

پس:

$$d_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = (-1)^{-1} d_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = -\left(\frac{-1}{\sqrt{2}} \sin \beta \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta$$

$$d_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = (-1)^{-1+1} d_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta$$

$$d_{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = (-1)^{-1-1} d_{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta$$

$$d_{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = (-1)^{-1-1} d_{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = \sin^2 \frac{\beta}{2}$$

$$d_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}^{(1)}(p) = (-1)^{-1+1} d_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}}^{(1)}(\beta) = \cos^2 \frac{\beta}{2}$$

پس:

$$d^{(1)}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos^2 \frac{\beta}{2} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \sin \beta & \sin^2 \frac{\beta}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta & \cos \beta & -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta \\ \sin^2 \frac{\beta}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \beta & \cos^2 \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}$$

تمرین ۷-۲۵

تانسور $A(\theta, \varphi) = \sin^2 \theta \cos(2\varphi)$ را در نظر بگیرید:

(آ) درایه‌ی ماتریسی کاهش یافته‌ی $\langle 2 || Y_2 || 2 \rangle$ را محاسبه کنید. (راهنمایی: می‌توانید به‌طور صریح $\langle 2, 1 | Y_2 | 2, 1 \rangle$ را محاسبه کنید و آن‌گاه با استفاده از قضیه‌ی ویگنر - اکارت آن را دوباره به دست آورید).

(ب) $A(\theta, \varphi)$ را برحسب مؤلفه‌های یک تانسور کروی از درجه‌ی ۲ بیان کنید (یعنی، برحسب $Y_{2m}(\theta, \varphi)$).

(پ) $A_{m', \pm 1} = \langle 2, m' | A | 2, \pm 1 \rangle$ را برای $m' = 0, \pm 1, \pm 2$ محاسبه کنید. می‌توانید از ضریب کلش - گوردون زیر استفاده کنید:

$$\langle j, 2; m, 0 | j, m \rangle = [3m^2 - j(j+1)] / \sqrt{(2j-1)j(j+1)(2j+3)}$$

حل:

(ا)

ابتدا مقدار $\langle 2, 1 | Y_{2,1} | 2, 1 \rangle$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \langle 2, 1 | Y_{2,1} | 2, 1 \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) Y_{2,1}^*(\theta, \phi) Y_{2,1}(\theta, \phi) Y_{2,1}(\theta, \phi) \\ &= 2\pi \left(\frac{15}{8\pi} \right) \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) \sin^2 \theta \cos^2 \theta \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1) \\ &= \frac{15}{4} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) (-3 \cos^6 \theta + 4 \cos^4 \theta - \cos^2 \theta) \\ &= \frac{3 \times 15}{4} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \left(-\frac{3}{7} + \frac{4}{5} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{14} \sqrt{\frac{5}{\pi}} \end{aligned}$$

طبق قضیه‌ی ویگنر - اکارت داریم:

$$\langle 2, 1 | Y_{2,1} | 2, 1 \rangle = \langle 2, 2; 1, 0 | 2, 1 \rangle \langle 2 \| Y_{2,1} \| 2 \rangle$$

اما از رابطدی داده شده در صورت سؤال، داریم:

$$\langle 2, 2; 1, 0 | 2, 1 \rangle = \frac{3 \times 1^2 - 2(2+1)}{\sqrt{(2 \times 2 - 1)2(2+1)(2 \times 2 + 3)}} = \frac{-3}{3\sqrt{14}} = \frac{-1}{\sqrt{14}}$$

پس:

$$\langle 2 \| Y_{2,1} \| 2 \rangle = \frac{\frac{1}{14} \sqrt{\frac{5}{\pi}}}{\frac{-1}{\sqrt{14}}} = -\sqrt{\frac{5}{14\pi}}$$

(ب)

$$\begin{aligned} A_{\pm 2, \pm 1} &= \langle 2, \pm 2 | A | 2, \pm 1 \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} \langle 2, \pm 2 | Y_{2,2} + Y_{2,-2} | 2, \pm 1 \rangle \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} [\langle 2, 2; \pm 1, 2 | 2, \pm 2 \rangle + \langle 2, 2; \pm 1, 2 | 2, \pm 2 \rangle] \langle 2 \| Y_{2,1} \| 2 \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (0 + 0) = 0 \end{aligned}$$

$$A_{\pm 1, \pm 1} = \langle 2, \pm 1 | A | 2, \pm 1 \rangle = 0$$

$$A_{\pm 1} = \langle r, 0 | A | r, \pm 1 \rangle = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{22\pi}{15}} \langle r, 0 | Y_{r,r} + Y_{r,-r} | r, \pm 1 \rangle$$

$$= \frac{1}{r} \sqrt{\frac{22\pi}{15}} [\langle r, r; \pm 1, r | r, 0 \rangle + \langle r, r; \pm 1, -r | r, 0 \rangle] \langle r \| Y_r \| r \rangle = 0.$$

تمرین ۷-۲۶

(آ) درایه‌ی ماتریسی کاهش یافته‌ی $\langle 1 \| Y_1 \| 2 \rangle$ را محاسبه کنید.
(راهنمایی: برای این منظور ممکن است لازم باشد $\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle$ را به‌طور مستقیم، و آن‌گاه از قضیه‌ی ویگنر - اکارت حساب کنید).

(ب) با استفاده از قضیه‌ی ویگنر - اکارت و ضرایب کلبش - گوردن مربوطه از جدول، $\langle 1, m | Y_{1,m} | 2, m' \rangle$ را برای همه‌ی مقدارهای ممکن m', m, m'' محاسبه کنید. (راهنمایی: می‌توانید از انتگرال

$$\int_0^\infty r^r R_{r1}^*(r) R_{rr}(r) dr = \frac{64a}{15\sqrt{5}} \left(\frac{r}{a}\right)^5$$

$$\langle j, 1; m, 0 | (j-1), m \rangle = -\sqrt{(j-m)(j+m)} / [j(rj+1)]$$

$$\langle j, 1; (m-1), 1 | (j-1), m \rangle = \sqrt{(j-m)(j-m+1)} / [rj(rj+1)]$$

$$\langle j, 1; (m+1), -1 | (j-1), m \rangle = \sqrt{(j+m)(j+m+1)} / [rj(rj+1)]$$

استفاده کنید).

حل:
(آ)

$$\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle = \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) Y_{1,0}^*(\theta, \phi) Y_{1,0}(\theta, \phi) Y_{2,0}(\theta, \phi)$$

$$= \frac{r}{4\pi} (2\pi) \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) \cos^r \theta \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (r \cos^r \theta - 1)$$

$$= r \times \frac{r}{4} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \left(\frac{r}{5} - \frac{1}{r} \right) = r \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \frac{r^2 - 5}{15} = \frac{1}{5} \sqrt{\frac{5}{\pi}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle = \langle r, 1; 0, 0 | 1, 0 \rangle \langle 1 \| Y_1 \| 2 \rangle \Rightarrow$$

$$\frac{1}{5} \sqrt{\frac{5}{\pi}} = -\sqrt{\frac{(r-0)(r+0)}{r(r \times r + 1)}} \langle 1 \| Y_1 \| 2 \rangle = -\sqrt{\frac{r}{5}} \langle 1 \| Y_1 \| 2 \rangle$$

پس:

$$\langle 1 \| Y_1 \| 2 \rangle = \frac{-\frac{1}{5} \sqrt{\frac{5}{\pi}}}{+\sqrt{\frac{r}{5}}} = -\frac{1}{\sqrt{r\pi}}$$

$$\langle 1, m | Y_{lm'} | 2, m'' \rangle = \langle 2, 1; m'', m' | 1, m \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle$$

تنها مقادیر غیر صفر $\langle 1, m | Y_{lm'} | 2, m'' \rangle$ را می‌یابیم.

$$\langle 1, 1 | Y_{1-1} | 2, 2 \rangle = \langle 2, 1; 2, -1 | 1, 1 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{5}} \times \frac{-1}{2\pi} = -\sqrt{\frac{3}{10\pi}}$$

$$\langle 1, 1 | Y_{11} | 2, 1 \rangle = \langle 2, 1; 1, 0 | 1, 1 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = -\sqrt{\frac{3}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{5\pi}}$$

$$\langle 1, 1 | Y_{11} | 2, 0 \rangle = \langle 2, 1; 0, 1 | 1, 1 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \sqrt{\frac{1}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = \frac{-1}{2} \sqrt{\frac{3}{5\pi}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{1-1} | 2, 1 \rangle = \langle 2, 1; 1, -1 | 1, 0 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{5\pi}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{11} | 2, 0 \rangle = \langle 2, 1; 0, 0 | 1, 0 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = -\sqrt{\frac{4}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = -\sqrt{\frac{1}{5\pi}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{11} | 2, -1 \rangle = \langle 2, 1; -1, 0 | 1, 0 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{5\pi}}$$

$$\langle 1, -1 | Y_{1-1} | 2, 0 \rangle = \langle 2, 1; 0, -1 | 1, -1 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \sqrt{\frac{1}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = \frac{-1}{2} \sqrt{\frac{1}{5\pi}}$$

$$\langle 1, -1 | Y_{11} | 2, -1 \rangle = \langle 2, 1; -1, -1 | 1, -1 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = -\sqrt{\frac{3}{10}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{5\pi}}$$

$$\langle 1, -1 | Y_{11} | 2, -2 \rangle = \langle 2, 1; -2, 1 | 1, -1 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{5}} \times \frac{-1}{\sqrt{2}\pi} = -\sqrt{\frac{3}{10\pi}}$$

بقیه مقادیر صفر هستند زیرا با توجه به خواص ضرایب کلش - گوردون؛ عبارت

$\langle 1, m | Y_{lm'} | 2, m'' \rangle$ طبق قضیه ویگنر - اکارت فقط وقتی غیر صفر است که:

$$m = m' + m''$$

تمرین ۷-۲۷

ذره‌ای با اسپین $\frac{1}{2}$ در حالت d از اندازه حرکت زاویه‌ای مداری است (یعنی $l=2$).

(آ) حالت‌های ممکن اندازه حرکت زاویه‌ای کل آن کدام‌اند؟

(ب) اگر هامیلتونی آن با $H = a + b\hat{L} \cdot \hat{S} + c\hat{L}^2$ داده شود که در آن a, b, c عدد هستند، مقادیر

انرژی را برای هریک از حالت‌های مختلف اندازه حرکت زاویه‌ای کل پیدا کنید. پاسخ خود را

بر حسب a, b, c بیان کنید.

حل:

(آ)

در جمع j_1 و j_2 ، مقادیر مجاز اندازه‌ی حرکت زاویه‌ی کل عبارتند از:

$$|j_1 - j_2| \leq j \leq |j_1 + j_2|$$

در اینجا داریم:

$$j_1 = l = 2$$

$$j_2 = s = \frac{1}{2}$$

پس مقادیر مجاز j عبارتند از:

$$j = \frac{5}{2} \text{ یا } \frac{3}{2}$$

(ب)

ویژه حالت‌های H در واقع همان $|j, m\rangle$ ها هستند زیرا:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

$$J^z = L^z + S^z + \vec{L} \cdot \vec{S} + \vec{S} \cdot \vec{L} = L^z + S^z + 2\vec{L} \cdot \vec{S}$$

در نوشتن رابطه‌ی اخیر به این توجه داریم که:

$$[\vec{L}, \vec{S}] = 0$$

پس:

$$\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2}(J^z - L^z - S^z)$$

حال H را روی $|j, m\rangle$ اثر می‌دهیم:

$$\begin{aligned} H|j, m\rangle &= \left(a + \frac{b}{2}(J^z - L^z - S^z) + cL^z \right) |j, m\rangle \\ &= \left[a + \frac{b\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] + cl(l+1)\hbar^2 \right] |j, m\rangle \end{aligned}$$

پس E_j ویژه مقادیر عملگر هامیلتونی برابر هستند با:

$$E_j = a + \frac{b\hbar^2}{2} \left[j(j+1) - 2(2+1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] + 2c(2+1)\hbar^2$$

بنابراین

$$E_{j=\frac{5}{2}} = a + \frac{b\hbar^2}{2} \left(\frac{35}{4} - \frac{27}{4} \right) + 6c\hbar^2 = a + \hbar^2(b + 6c)$$

$$E_{j=\frac{r}{2}} = a + \frac{b\hbar^2}{2} \left(\frac{15}{4} - \frac{27}{4} \right) \epsilon \hbar^2 = a + \frac{r\hbar^2}{2} (-b + 4c)$$

تمرین ۷-۲۸

یکی الکترون را در حالت $\hbar$ در نظر بگیرید. ضرایب کلیش - گوردون موجود در حالت‌های $\{|j, m\rangle\}$ زیر از الکترون را حساب کنید:

$$\left| \frac{11}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle, \left| \frac{11}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle, \left| \frac{9}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle, \left| \frac{9}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle$$

حل:

از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\left| l \pm \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{l \mp m + \frac{1}{2}}{2l+1}} \left| l, m + \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \pm \sqrt{\frac{l \pm m + \frac{1}{2}}{2l+1}} \left| l, m - \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| 5 \pm \frac{1}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{5 \mp \frac{9}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 5 + 1}} \left| 5, \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \pm \sqrt{\frac{5 \pm \frac{9}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 5 + 1}} \left| 5, \frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{11}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{11}} |5, 5\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \frac{10}{\sqrt{11}} |5, 4\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{9}{2}, \frac{9}{2} \right\rangle = \frac{10}{\sqrt{11}} |5, 5\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \frac{1}{\sqrt{11}} |5, 4\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| 5 \pm \frac{1}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{5 \mp \frac{7}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 5 + 1}} \left| 5, \frac{7}{2} + \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \pm \sqrt{\frac{5 \pm \frac{7}{2} + \frac{1}{2}}{2 \times 5 + 1}} \left| 5, \frac{7}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{11}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{11}} |5, 4\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{9}{11}} |5, 3\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| \frac{9}{2}, \frac{7}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{9}{11}} |5, 4\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{2}{11}} |5, 3\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

تمرین ۷-۲۹

فرض کنید هامیلتونی دو ذره‌ی غیریکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ به صورت زیر باشد:

$$\hat{H} = \frac{\epsilon_1}{\hbar^2} (\hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2) \cdot \hat{S}_1 - \frac{\epsilon_2}{\hbar} (\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z})$$

که در آن ϵ_1 و ϵ_r ثابت‌هایی دارای ابعاد انرژی هستند. ترازهای انرژی و تبهگنی‌های آن‌ها را بیابید.

حل:

اگر حاصل جمع دو عملگر $\bar{S}_1$ و $\bar{S}_r$ را $\bar{S}$ تعریف کنیم، داریم:

$$\bar{S} = \bar{S}_1 + \bar{S}_r$$

$$S_z = S_1^z + S_r^z + 2\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_r$$

پس:

$$\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_r = \frac{1}{2} (S_z - S_1^z - S_r^z)$$

و داریم:

$$\hat{H} = \frac{\epsilon_1}{\hbar^2} (S_1^z + \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_r) - \frac{\epsilon_r}{\hbar} S_z = \frac{\epsilon_1}{\hbar^2} \left(S_1^z + \frac{1}{2} (S_z - S_1^z - S_r^z) \right) - \frac{\epsilon_r}{\hbar} S_z = \frac{\epsilon_1}{2\hbar^2} (S_z + S_1^z - S_r^z) - \frac{\epsilon_r}{\hbar} S_z$$

لذا از ویژه حالت‌های همزمان S_1^z ، S_r^z و S_z یعنی $|s, m\rangle$ به عنوان ویژه حالت‌های $\hat{H}$ استفاده می‌کنیم. لذا:

$$\begin{aligned} \hat{H}|s, m\rangle &= \left[\frac{\epsilon_1}{2\hbar^2} (S_z - S_1^z - S_r^z) - \frac{\epsilon_r}{\hbar} S_z \right] |s, m\rangle \\ &= \left\{ \frac{\epsilon_1 \hbar^2}{2\hbar^2} [s(s+1) - s_1(s_1+1) - s_r(s_r+1)] - \frac{\epsilon_r m \hbar}{\hbar} \right\} |s, m\rangle \end{aligned}$$

اما $s_1 = s_r = \frac{1}{2}$ و طبق قواعد جمع اندازه حرکت زاویه‌ای داریم:

$$|s_1 - s_r| \leq s \leq |s_1 + s_r|$$

$$-s \leq m \leq s$$

لذا s می‌تواند مقادیر صفر یا یک را داشته باشد و به ازای مقدار صفر، m نیز صفر خواهد بود و به ازای مقدار یک، m می‌تواند مقادیر ± 1 یا 0 را داشته باشد و لذا اگر $E_{s,m}$ ویژه مقدار عملگر هامیلتونی باشد، داریم:

$$E_{s,m} = \frac{\epsilon_1}{2} \left[s(s+1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] - m\epsilon_r = \frac{\epsilon_1}{2} \left(s(s+1) - \frac{3}{2} \right) - m\epsilon_r$$

در نتیجه:

$$E_{0,0} = -\frac{3}{4}\epsilon_1 \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{1,1} = \frac{1}{4}\epsilon_1 - \epsilon_r \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{1,0} = \frac{1}{4}\epsilon_1 \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{1,-1} = \frac{1}{4}\epsilon_1 + \epsilon_r \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

تمرین ۳۰-۷

ترازهای انرژی و تبهگنی‌های آن‌ها را برای سیستمی متشکل از دو ذره‌ی غیر یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ با هامیلتونی:

$$\hat{H} = \frac{\varepsilon}{\hbar^2} (\hat{S}_1^z + \hat{S}_2^z) - \frac{\varepsilon}{\hbar} (\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z})$$

بیابید که در آن ε ثابتی دارای ابعاد انرژی است.

حل:

ویژه حالت‌های هامیلتونی در واقع ویژه حالت‌های همزمان S_1^z ، S_2^z و S_{1z} و S_{2z} و یا به عبارتی $|s_1, s_2; m_1, m_2\rangle$ ها می‌باشند. پس، داریم:

$$\begin{aligned} \hat{H} |s_1, s_2; m_1, m_2\rangle &= \left[\frac{\varepsilon}{\hbar^2} (\hat{S}_1^z + \hat{S}_2^z) - \frac{\varepsilon}{\hbar} (\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z}) \right] |s_1, s_2; m_1, m_2\rangle \\ &= \frac{\varepsilon \hbar^2}{\hbar^2} \left[s_1(s_1+1) + s_2(s_2+1) \right] - \frac{\varepsilon \hbar}{\hbar} (m_1 + m_2) |s_1, s_2; m_1, m_2\rangle \\ &= \left[\varepsilon \cdot \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] - \varepsilon \cdot (m_1 + m_2) \right] |s_1, s_2; m_1, m_2\rangle \\ &= \varepsilon \cdot \left[\frac{3}{2} - (m_1 + m_2) \right] |s_1, s_2; m_1, m_2\rangle \end{aligned}$$

با توجه به اینکه $m_1 = \pm \frac{1}{2}$ و $m_2 = \pm \frac{1}{2}$ ؛ اگر E_{m_1, m_2} را ویژه مقدار عملگر هامیلتونی فرض کنیم، داریم:

$$E_{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} = \varepsilon \cdot \left[\frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{2} \varepsilon. \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}} = E_{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}} = \frac{3}{2} \varepsilon. \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

$$E_{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}} = \varepsilon \cdot \left[\frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2} + -\frac{1}{2} \right) \right] = \frac{5}{2} \varepsilon. \quad ; \quad \text{بدون تبهگنی}$$

تمرین ۳۱-۷

دو ذره‌ی غیریکسان با اسپین $s = \frac{1}{2}$ و با هامیلتونی $\hat{H} = \frac{\varepsilon}{\hbar^2} (\hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2) - \frac{\varepsilon}{\hbar} (\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z})$ را در نظر بگیرید که در آن ε ثابتی دارای ابعاد انرژی است. ترازهای انرژی و تبهگنی‌های آن‌ها را بیابید.

حل:

اگر تعریف کنیم:

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

داریم:

$$\hat{H} = \frac{\varepsilon}{\hbar^2} S^2 + \frac{\varepsilon}{\hbar^2} S_z^2 = \frac{\varepsilon}{\hbar^2} (S^2 + S_z^2)$$

می‌توانیم از ویژه حالت‌های همزمان S_z^2, S^2, S_z و S_z یعنی $|s, s_z, s, m\rangle$ ها به عنوان ویژه حالت‌های هامیلتونی استفاده کنیم:

$$\hat{H}|s, m\rangle = \frac{\varepsilon}{\hbar^2} (S^2 + S_z^2)|s, m\rangle = \frac{\varepsilon \cdot \hbar^2}{\hbar^2} (s(s+1) + m^2)|s, m\rangle = \varepsilon (s(s+1) + m^2)|s, m\rangle$$

اما $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$ و طبق قواعد جمع اندازه حرکت زاویه‌ای داریم:

$$\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| \leq s \leq \left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right|$$

$$-s \leq m \leq +s$$

پس s می‌تواند مقادیر صفر یا یک داشته باشد و به ازای مقدار صفر، m نیز صفر خواهد بود و به ازای مقدار یک، m می‌تواند مقادیر ± 1 یا 0 را داشته باشد و لذا اگر $E_{s,m}$ ویژه مقدار عملگر هامیلتونی باشد، داریم:

$$E_{s,m} = \varepsilon [s(s+1) + m^2]$$

$$E_{\frac{1}{2},0} = 0$$

بدون تبهگنی

لذا:

$$E_{\frac{1}{2},\pm 1} = \varepsilon [1(1+1) + (\pm 1)^2] = 3\varepsilon$$

بدون تبهگنی

$$E_{\frac{1}{2},0} = \varepsilon [1(1+1) + 0^2] = 2\varepsilon$$

بدون تبهگنی

تمرین ۷-۳۲

سیستمی از سه ذره‌ی غیر یکسان، هریک با اسپین $s = \frac{1}{2}$ را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن با رابطه‌ی $\hat{H} = \frac{\varepsilon_1}{\hbar^2} (\hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2) \cdot \hat{S}_3 + \frac{\varepsilon_2}{\hbar^2} (\hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z} + \hat{S}_{3z})^2$ داده می‌شود. در آن ε_1 و ε_2 ثابت‌هایی دارای ابعاد انرژی هستند. ترازهای انرژی و تبهگنی‌های آن‌ها را پیدا کنید.

حل:

اگر تعریف کنیم:

$$\vec{S}_{12} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3 = \vec{S}_{12} + \vec{S}_3$$

بی:

$$S^z = S_{1z}^z + S_r^z + \hbar \bar{S}_{1z} \cdot \bar{S}_r$$

لذا:

$$\bar{S}_{1z} \cdot \bar{S}_r = \frac{1}{\hbar} (S^z - S_{1z}^z - S_r^z)$$

بنابراین:

$$\hat{H} = \frac{\epsilon_1}{\hbar} \bar{S}_{1z} \cdot \bar{S}_r + \frac{\epsilon_r}{\hbar} S_r^z = \frac{\epsilon_1}{\hbar} (S^z - S_{1z}^z - S_r^z) + \frac{\epsilon_r}{\hbar} S_r^z$$

پس درواقع ویژه حالت‌های هامیلتونی همان ویژه حالت‌های همزمان $S_{1z}^z, S_r^z, S^z, S_{1z}^z$ و S^z می‌باشند که آنها را با $|s_{1z}; s, m\rangle$ نشان می‌دهیم. بنابراین:

$$\hat{H} |s_{1z}; s, m\rangle = \left[\frac{\epsilon_1 \hbar}{2\hbar} (s(s+1)) - s_{1z}(s_{1z}+1) - s_r(s_r+1) + \frac{\epsilon_r m \hbar}{\hbar} \right] |s_{1z}; s, m\rangle$$

طبق قواعد جمع اندازه حرکت زاویه‌ای داریم:

$$|s_1 - s_r| \leq s_{1z} \leq |s_1 + s_r|$$

$$|s_{1z} - s_r| \leq s \leq |s_{1z} + s_r|$$

$$-s \leq m \leq +s$$

بنابراین s_{1z} یکی از مقادیر صفر یا یک را می‌تواند داشته باشد. در صورتی که دارای مقدار صفر باشد مقدار $s, \frac{1}{2}$ خواهد بود و در این صورت مقدار $m, \pm \frac{1}{2}$ خواهد بود. اما اگر s_{1z} مقداری برابر یک داشته باشد در این صورت $s, 1$ مقادیر $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{2}$ را خواهد داشت و متناظر با $s = \frac{1}{2}$ مقدار $m, \pm \frac{1}{2}$ و متناظر با $s = \frac{3}{2}$ مقدار $m, \pm \frac{1}{2}$ یا $\pm \frac{3}{2}$ خواهد بود.

با توجه به این توضیحات اگر ویژه مقدار هامیلتونی را با $E_{s,s_{1z},m}$ نشان دهیم داریم:

$$E_{s,s_{1z},m} = \frac{\epsilon_1}{\hbar} \left[s(s+1) - s_{1z}(s_{1z}+1) - \frac{3}{4} \right] + m \epsilon_r$$

لذا:

$$E_{\frac{1}{2},0,\pm\frac{1}{2}} = \frac{\epsilon_1}{\hbar} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - 0 \cdot (0+1) - \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{\hbar} \epsilon_r = \frac{1}{\hbar} \epsilon_r$$

تبهگنی دوگانه ؛

$$E_{\frac{1}{2},1,\pm\frac{1}{2}} = \frac{\epsilon_1}{\hbar} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - 1(1+1) - \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{\hbar} \epsilon_r = -\epsilon_1 + \frac{1}{\hbar} \epsilon_r$$

تبهگنی دوگانه ؛

$$E_{\frac{3}{2},1,\pm\frac{3}{2}} = \frac{\epsilon_1}{\hbar} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - 1(1+1) - \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{\hbar} \epsilon_r = \epsilon_1 + \frac{1}{\hbar} \epsilon_r$$

تبهگنی دوگانه ؛

$$E_{\frac{r}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}} = \frac{\varepsilon_1}{2} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - 1(1+1) - \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{4} \varepsilon_r = \frac{\varepsilon_1}{2} + \frac{1}{4} \varepsilon_r$$

تبهگنی دوگانه ؛

تمرین ۷-۳۳

سیستمی از سه ذره غیر یکسان، هریک با تکانه‌ی زاویه‌ای $\frac{3}{2}$ را در نظر بگیرید. مقدارهای ممکن اسپین کل S این سیستم را بیابید و تعداد ویژه حالت‌های تکانه‌ی زاویه‌ای متناظر با هر مقدار S را مشخص کنید.

حل:

تعاریف زیر را انجام می‌دهیم:

$$\vec{S}_{12} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$$

$$\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3 = \vec{S}_{12} + \vec{S}_3$$

طبق قواعد جمع اندازه حرکت زاویه‌ای داریم:

$$|s_1 - s_2| \leq s_{12} \leq |s_1 + s_2|$$

$$-s_{12} \leq m_{12} \leq s_{12}$$

$$|s_{12} - s_3| \leq s \leq |s_{12} + s_3|$$

$$-s \leq m \leq s$$

پس با توجه به اینکه: $s_1 = s_2 = s_3 = \frac{3}{2}$ ؛ داریم:

$$s_{12} = 0, 1, 2, 3$$

به‌ازای $s_{12} = 0$ ؛ مقدار s ، $\frac{3}{2}$ خواهد بود.

به‌ازای $s_{12} = 1$ ؛ مقادیر s عبارتند از: $\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$.

به‌ازای $s_{12} = 2$ ؛ مقادیر s عبارتند از: $\frac{7}{2}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2}$.

به‌ازای $s_{12} = 3$ ؛ مقادیر s عبارتند از: $\frac{9}{2}, \frac{7}{2}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2}$.

به‌ازای $s = \frac{1}{2}$ تبهگنی چهارگانه وجود دارد که دوتای آن مربوط به $s_{12} = 1$ و دوتای آن مربوط به

$s_{12} = 2$ است. به‌ازای $s = \frac{3}{2}$ ، تبهگنی شانزده‌گانه داریم که چهارتای آن مربوط به $s_{12} = 0$ ، چهارتای

آن مربوط به $s_{12} = 1$ ، چهارتای آن مربوط به $s_{12} = 2$ و چهارتای آن مربوط به $s_{12} = 3$ است. به‌ازای

$s = \frac{5}{2}$ ، تبهگنی هجده‌گانه داریم که به‌ترتیب شش تا شش تا مربوط به $s_{12} = 1, 2, 3$ می‌باشند. به‌ازای

$s = \frac{7}{2}$ ، تبهگنی شانزده‌گانه داریم که هشت تا هشت تا مربوط به $s_{12} = 2, 3$ می‌باشند و به‌ازای $s = \frac{9}{2}$

نیز تبهگنی ده‌گانه متناظر با $s_{12} = 3$ داریم.

فصل هشتم

ذرات یکسان

تمرین ۸-۱

سیستمی متشکل از سه بوزون یکسان غیر برهم کنشی را در نظر بگیرید که در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بُعدی خارجی مشترک حرکت می کنند. ترازهای انرژی و توابع موج حالت پایه، نخستین حالت برانگیخته و دومین حالت برانگیخته سیستم را بیابید.

حل:

هر ذره در پتانسیلی که توسط $\hat{V}_i(x_i) = \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}_i^2$ تعریف می شود حرکت می کند. در این مورد، معادله شرودینگر سیستم سه ذره ای عبارت است از:

$$\sum_{i=1}^3 \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx_i^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}_i^2 \right) \psi_{n_1 n_2 n_3}(x_1, x_2, x_3) = E_{n_1 n_2 n_3} \psi_{n_1 n_2 n_3}(x_1, x_2, x_3)$$

که به سه معادله تک ذره ای جدا می شود:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_{n_i}(x_i)}{dx_i^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}_i^2 = \varepsilon_{n_i} \psi_{n_i}(x_i) \quad ; \quad i = 1, 2, 3$$

$$\varepsilon_{n_i} = \hbar \omega \left(n_i + \frac{1}{2} \right) , \quad \psi_{n_i}(x_i) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} 2^{n_i} n_i! x_0}} e^{-\frac{x_i^2}{2x_0^2}} H_{n_i} \left(\frac{x_i}{x_0} \right)$$

که در رابطه‌ی اخیر $x_i = \sqrt{\frac{\hbar}{mw}}$ انرژی کل و تابع موج کل توسط:

$$E_{n_1 n_2 n_3} = \sum_{i=1}^3 \varepsilon_{n_i} = \hbar w \left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2} \right)$$

و

$$\psi_{n_1 n_2 n_3}(x_1, x_2, x_3) = \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \psi_{n_3}(x_3)$$

داده می‌شوند.

با در نظر گرفتن اینکه سه ذره در واقع سه بوزن مشابه هستند، حالت پایه، متناظر با موردی است که سه ذره در پایین‌ترین حالت ($n_1 = n_2 = n_3 = 0$) قرار داشته باشند:

$$E^{(0)} = E_{\dots} = \frac{3}{2} \hbar w$$

$$\psi^{(0)} = \psi_0(x_1) \psi_0(x_2) \psi_0(x_3)$$

در حالت برانگیخته‌ی اول، دو ذره در حالت ψ_1 (هر یک با انرژی $\varepsilon_1 = \frac{\hbar w}{2}$) و دیگری در حالت ψ_0 (با انرژی $\varepsilon_0 = \frac{\hbar w}{2}$) خواهد بود:

$$E^{(1)} = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_0 = 2 \left(\frac{\hbar w}{2} \right) + \frac{\hbar w}{2} = \frac{5}{2} \hbar w$$

در مورد تابع موج حالت برانگیخته‌ی اول؛ چون ذرات مشابه هستند نمی‌توان گفت کدام یک از آن‌ها در کدام حالت قرار دارد و فقط می‌توان بیان کرد که دو ذره در حالت ψ_1 و دیگری در حالت ψ_0 است. چون مقدار $n = 0$ دو بار اتفاق می‌افتد (دو ذره در ψ_1 هستند) با توجه به روابط ۸-۶۰ و ۸-۶۱ نتیجه می‌شود که:

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{\frac{2!}{3!}} \left[\psi_1(x_1) \psi_1(x_2) \psi_0(x_3) + \psi_1(x_1) \psi_0(x_2) \psi_1(x_3) + \psi_0(x_1) \psi_1(x_2) \psi_1(x_3) \right]$$

در حالت برانگیخته‌ی دوم، یک ذره در ψ_2 و دو ذره در ψ_1 خواهند بود. پس:

$$E^{(2)} = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_1 = \frac{\hbar w}{2} + 2 \left(\frac{\hbar w}{2} \right) = \frac{7}{2} \hbar w$$

اکنون چون مقدار $n = 1$ دوبار اتفاق می‌افتد (دو ذره در ψ_1 هستند) و $n = 0$ فقط یک بار، لذا ۸-۶۰ و ۸-۶۱ منجر می‌شوند به:

$$\psi^{(r)}(x_1, x_r, x_r) = \sqrt{\frac{2!}{3!}} [\psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_r) + \psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_r) + \psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_r)]$$

تمرین ۸-۲

دو ذره ی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ را در نظر بگیرید که در یک جعبه‌ی مکعبی به ضلع L محدود شده‌اند. انرژی و تابع موج این سیستم در حالتی که بین ذرات برهمکنش وجود نداشته باشد را پیدا کنید.

حل:

هر ذره در پتانسیلی که توسط:

$$V_i(\vec{r}_i) = \begin{cases} 0 & ; 0 < x_i < L, 0 < y_i < L, 0 < z_i < L \\ \infty & ; \text{جاهای دیگر} \end{cases}$$

توصیف می‌شود قرار داد. در این مورد، معادله شرودینگر سیستم دو ذره‌ای:

$$\sum_{i=1}^2 \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V_i(\vec{r}_i) \right) \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

به دو معادله‌ی تک ذره‌ای جدا می‌شود:

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V_i(\vec{r}_i) \right) \psi_{n_i}(\vec{r}_i) = \varepsilon_{n_i} \psi_{n_i}(\vec{r}_i) \quad ; \quad i = 1, 2$$

بنابراین طبق روابط ۶-۲۵ و ۶-۲۶ خواهیم داشت:

$$\psi_{n_i}(\vec{r}_i) = \sqrt{\frac{\lambda}{L^3}} \sin\left(\frac{n_{ix}\pi x_i}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{iy}\pi y_i}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{iz}\pi z_i}{L}\right)$$

$$\varepsilon_{n_i} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} (n_{ix}^2 + n_{iy}^2 + n_{iz}^2)$$

پس انرژی کل و تابع موج کل توسط:

$$E = E_{n_{1x}n_{1y}n_{1z}n_{2x}n_{2y}n_{2z}} = \sum_{i=1}^2 \varepsilon_{n_i} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} (n_{1x}^2 + n_{1y}^2 + n_{1z}^2 + n_{2x}^2 + n_{2y}^2 + n_{2z}^2)$$

و

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \psi_{n_{1x}n_{1y}n_{1z}n_{2x}n_{2y}n_{2z}}(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2) = \prod_{i=1}^2 \psi_{n_i}(\vec{r}_i) \\ &= \frac{\lambda}{L^3} \sin\left(\frac{n_{1x}\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1y}\pi y_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1z}\pi z_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2x}\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2y}\pi y_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2z}\pi z_2}{L}\right) \end{aligned}$$

با در نظر گرفتن اینکه دو ذره مورد نظر فرمیون‌های یکسان هستند لذا تابع موج کلی باید پاد متقارن باشد. از آنجا که تابع موج کلی از حاصل ضرب بخش فضایی و بخش اسپینی حاصل می‌شود بنابراین یا بخش فضایی پاد متقارن است و بخش اسپینی متقارن است یا بخش فضایی متقارن است و بخش اسپینی پاد متقارن که این موارد عبارتند از:

۱. با شرط $n_1 \neq n_2$

$$\begin{aligned}\psi_a(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{n_1}(\vec{r}_1) \psi_{n_2}(\vec{r}_2) - \psi_{n_1}(\vec{r}_2) \psi_{n_2}(\vec{r}_1) \right] \chi_{\text{همگانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\Lambda}{L^3} \left[\sin\left(\frac{n_{1x}\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1y}\pi y_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1z}\pi z_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2x}\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2y}\pi y_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2z}\pi z_2}{L}\right) \right. \\ &\quad \left. - \sin\left(\frac{n_{1x}\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1y}\pi y_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1z}\pi z_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2x}\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2y}\pi y_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2z}\pi z_1}{L}\right) \right] \chi_{\text{همگانه}} \\ &\quad n_1 \neq n_2 \text{ شرط } 2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_a(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{n_1}(\vec{r}_1) \psi_{n_2}(\vec{r}_2) + \psi_{n_1}(\vec{r}_2) \psi_{n_2}(\vec{r}_1) \right] \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\Lambda}{L^3} \left[\sin\left(\frac{n_{1x}\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1y}\pi y_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1z}\pi z_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2x}\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2y}\pi y_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2z}\pi z_2}{L}\right) \right. \\ &\quad \left. + \sin\left(\frac{n_{1x}\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1y}\pi y_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{1z}\pi z_2}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2x}\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2y}\pi y_1}{L}\right) \sin\left(\frac{n_{2z}\pi z_1}{L}\right) \right] \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)\end{aligned}$$

تمرین ۸-۳

(آ) سیستمی دارای دو ذره‌ی غیریکسان هر کدام با اسپین ۱ و فاقد اندازه‌ی حرکت زاویه‌ای (یعنی هر دو ذره در حالت‌های s هستند) را در نظر بگیرید. تمام حالت‌های ممکن برای این سیستم را تشریح کنید.

(ب) اگر دو ذره یکسان باشند، چه محدودیت‌هایی را می‌توانیم در نظر بگیریم؟ تمام حالت‌های ممکن برای سیستم دارای دو ذره‌ی یکسان با اسپین ۱ را تشریح کنید.

حل:
(آ)

اگر بخش فضایی تابع موج را با $\phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ نشان دهیم و بخش اسپینی آن را با $\chi(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$ در حالت کلی تابع موج به صورت حاصل ضرب بخش فضایی و بخش اسپینی خواهد بود یعنی:

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

(ب) $\chi(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$ در مجموع دارای ۹ حالت می‌باشد که در فصل هفتم به تفصیل شرح آن رفته است.

در صورتی که مجموع دو بردار $\vec{S}_1$ و $\vec{S}_2$ را با $\vec{S}$ نشان دهیم، از $|S_1 - S_2|$ تا $|S_1 + S_2|$ تغییر می‌کند. با توجه به اینکه $S_1 = S_2 = 1$ پس S مقادیر صفر، یک و دو را اختیار می‌کند. طبق مسأله ۷-۳، پنج حالت مربوط به $S = 2$ (یعنی: حالات $|2, \pm 2\rangle$ ، $|2, \pm 1\rangle$ و $|2, 0\rangle$) و نیز تنها حالت مربوط به $S = 0$ (یعنی: $|0, 0\rangle$) نسبت به جابه‌جایی ذرات، متقارن هستند و سه حالت مربوط به $S = 1$ (یعنی: حالات $|1, 0\rangle$ ، $|1, \pm 1\rangle$) نسبت به جابه‌جایی دو ذره، پادمقارن می‌باشند. از آنجا که حالت $L = 0$ تحت جابه‌جایی ذرات متقارن است (چون تابع موج سیستمی متشکل از دو ذره‌ی مشابه اسپین یک، باید متقارن باشد) لذا در این مورد تابع موج ممکن یکی از موارد زیر خواهد بود:

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) |2, m_s\rangle ; m_s = 0, \pm 1, \pm 2$$

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) |0, 0\rangle$$

یعنی در مجموع ۶ حالت خواهیم داشت.

تمرین ۸-۴

دو ذره‌ی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ در یک جعبه‌ی پتانسیل یک بُعدی به طول L با دیواره‌هایی صلب در $x=0$ و $x=L$ محبوس شده‌اند. با فرض اینکه سیستم دو ذره‌ای در یک حالت اسپینی سه‌تایی قرار دارد، ترازهای انرژی، توابع موج و تبهگنی‌های متناظر با پایین‌ترین سه حالت را پیدا کنید.

حل:

با توجه به اینکه تابع موج سیستم متشکل از دو فرمیون یکسان باید پاد متقارن باشد لذا تابع موج سیستم به صورت زیر خواهد بود:

$$\psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) - \psi_{n_1}(x_2) \psi_{n_2}(x_1) \right] \chi_{\text{سه‌گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2) \quad (*)$$

در اینجا:

$$\psi_{n_i}(x_i) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n_i \pi x_i}{L}\right) ; i = 1, 2$$

انرژی سیستم نیز عبارت خواهد بود از:

$$E_{n_1, n_2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n_1^2 + n_2^2)$$

طبق رابطه (*) واضح است که n_1 نمی‌تواند با n_2 برابر باشد. اما برای پایین‌ترین سه حالت داریم:

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) - \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) \right] \chi_{\text{سه‌گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

بنابراین حالت پایه، تبهگنی سه‌گانه دارد و انرژی متناظر با آن $E_1 = \frac{\Delta \hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$ است.

$$\psi^{(2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{3\pi x_2}{L}\right) - \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{3\pi x_1}{L}\right) \right] \chi_{\text{سه‌گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

پس اولین حالت برانگیخته نیز تبهگنی سه‌گانه با انرژی $E_2 = \frac{10 \hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$ دارد.

$$\psi^{(3)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{3\pi x_2}{L}\right) - \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{3\pi x_1}{L}\right) \right] \chi_{\text{سه‌گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

لذا دومین حالت برانگیخته، تبهگنی سه‌گانه با انرژی $E_3 = \frac{13 \hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$ دارد.

در پایان متذکر می‌شویم که در حالت پایه، یکی از دو ذره در حالت ψ_1 و دیگری در ψ_2 خواهد بود، در اولین حالت برانگیخته یکی از دو ذره در حالت ψ_1 و دیگری در ψ_3 خواهد بود و در دومین حالت برانگیخته یکی از دو ذره در حالت ψ_2 و دیگری در ψ_3 خواهد بود که با استفاده از این نکات، انرژی و توابع موج متناظر با حالت پایه، اولین و دومین حالت برانگیخته بررسی شدند.

تمرین ۸-۵

دو ذره یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ در یک جعبه‌ی پتانسیل یک بُعدی به طول L با دیواره‌هایی صلب در $x=0$ و $x=L$ محبوس شده‌اند. با فرض این که سیستم دو ذره‌ای در یک حالت اسپین یکتایی باشد، ترازهای انرژی، توابع موج و تبهگنی‌های متناظر با پایین‌ترین سه حالت را پیدا کنید.

حل:

با توجه به حل مسئله‌ی ۸-۴ و توضیحات مربوط به آن در اینجا داریم:

$$\psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) + \psi_{n_1}(x_2) \psi_{n_2}(x_1) \right) \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

اما در صورتی که $n_1 = n_2$ ، آنگاه:

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_1}(x_2) \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

پس برای حالت پایه داریم:

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

$$E^{(1)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (1^2 + 1^2) = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$$

پس حالت پایه فاقد تبهگنی است.
برای اولین حالت برانگیخته داریم:

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{L} \left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \right] \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

$$E^{(1)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (1^2 + 2^2) = \frac{5\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$$

لذا اولین حالت برانگیخته نیز فاقد تبهگنی است.
برای دومین حالت برانگیخته داریم:

$$\psi^{(2)}(x_1, x_2) = \frac{2}{L} \sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) \chi_{\text{منفرد}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

$$E^{(2)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (2^2 + 2^2) = \frac{4\hbar^2 \pi^2}{mL^2}$$

پس دومین حالت برانگیخته نیز فاقد تبهگنی است.

تمرین ۸-۶

دو ذره ی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ تحت اثر یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بُعدی، در حرکت هستند. با فرض این که سیستم دو ذره ای در یک حالت اسپینی سه تایی باشد، ترازهای انرژی، توابع موج و تبهگنی های متناظر با پایین ترین سه حالت را بیابید.

حل:

از آنجا که حالت اسپین سه گانه متقارن است و با توجه به اینکه تابع موج سیستمی متشکل از فرمیون های مشابه پاد متقارن است پس بخش فضایی تابع موج باید متقارن باشد. به عبارتی تابع موج سیستم باید به صورت زیر باشد:

$$\psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) - \psi_{n_1}(x_2) \psi_{n_2}(x_1) \right] \chi_{\text{سه گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2) \quad (*)$$

که در اینجا $\psi_n(x)$ تابع موج نوسانگر هماهنگ برای حالت n ام است.
انرژی سیستم نیز عبارت خواهد بود از:

$$E_{n_1 n_2} = \sum_{i=1}^2 \left[\hbar \omega \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \right] = \hbar \omega (n_1 + n_2 + 1)$$

اکنون حالت‌های پایه، اولین حالت برانگیخته و دومین حالت برانگیخته را بررسی می‌کنیم. پیش از ادامه کار با توجه به رابطه (*) واضح است که n_1 و n_2 نباید دارای مقادیر یکسان باشند.

اگر تابع موج و انرژی حالت پایه را به ترتیب $\psi^{(0)}$ و $E^{(0)}$ نشان دهیم، با توجه به اینکه حالت پایه در اینجا متناظر با موردی است که یکی از ذرات در ψ_1 و دیگری در ψ_2 قرار بگیرد لذا می‌توان گفت:

$$\psi^{(0)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_2(x_1) \psi_1(x_2)) \chi_{\text{سه گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

از آنجا که $\chi_{\text{سه گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$ دارای سه حالت مستقل است بنابراین حالت پایه دارای تبهگنی سه گانه است و انرژی متناظر با آن یعنی $E^{(0)}$ ، از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$E^{(0)} = E_{1,2} = E_{2,1} = \hbar \omega (0 + 1 + 1) = 2 \hbar \omega$$

به طور مشابه اگر تابع موج و انرژی اولین حالت برانگیخته را با $\psi^{(1)}$ و $E^{(1)}$ نشان دهیم با توجه به اینکه اولین حالت برانگیخته از قرار گرفتن یکی از ذرات در ψ_1 و دیگری در ψ_2 به دست می‌آید پس:

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_2(x_1) \psi_1(x_2)) \chi_{\text{سه گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

$$E^{(1)} = \hbar \omega (0 + 2 + 1) = 3 \hbar \omega$$

در اینجا نیز تبهگنی سه گانه وجود دارد.

در مورد دومین حالت برانگیخته قضیه قدری متفاوت است. اگر انرژی این حالت را با $E^{(2)}$ نشان دهیم داریم:

$$E^{(2)} = 4 \hbar \omega$$

این حالت در دو مورد اتفاق می‌افتد:

۱. یکی از دو ذره در حالت ψ_1 و دیگری در ψ_2 باشد. اگر تابع موج متناظر با این مورد را با $\psi_1^{(2)}$ نشان دهیم داریم:

$$\psi_1^{(2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_2(x_1) \psi_1(x_2)) \chi_{\text{سه گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$$

$\psi_1^{(r)}$ از سه حالت مستقل تشکیل شده است.

۲. یکی از دو ذره در حالت ψ_1 و دیگری در ψ_r باشد. اگر تابع موج متناظر با این مورد را با $\psi_r^{(r)}$ نشان دهیم داریم:

$$\psi_r^{(r)}(x_1, x_r) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1) \psi_r(x_r) - \psi_r(x_1) \psi_1(x_r)) \chi_{\text{سه گانه}}(\vec{S}_1, \vec{S}_r)$$

$\psi_r^{(r)}$ نیز از سه حالت مستقل تشکیل شده است.

بنابراین طبق توضیحات فوق دومین حالت برانگیخته با ویژه توابع $\psi_1^{(r)}$ و $\psi_r^{(r)}$ و انرژی $E^{(r)}$ دارای تپه‌گی شش گانه می‌باشد.

تمرین ۸-۷

انرژی حالت پایه و انرژی میانگین حالت پایه به ازای هر ذره و تابع موج حالت پایه‌ی سیستمی متشکل از N بوزون یکسان غیرهم‌کنشی در حال حرکت تحت اثر یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بعدی را بیابید.

حل:

اگر $\psi_n(x)$ تابع موج نوسانگر هماهنگ برای حالت n ام باشد، برای N بوزون که با هم برهم‌کنش نمی‌کنند، تمام ذرات در حالت $n=0$ (یعنی حالت پایه) هستند و بنابراین انرژی این حالت برابر است با:

$$E^{(0)} = N \frac{\hbar \omega}{2}$$

از این رو انرژی بر ذره برابر است با:

$$\frac{E^{(0)}}{N} = \frac{\hbar \omega}{2}$$

و تابع موج متناظر با آن نیز عبارت است از:

$$\psi^{(0)}(x_1, x_2, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N \psi_0(x_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{\pi x_0}} \right)^N \exp \left(-\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{2x_0^2} \right)$$

تمرین ۸-۸

انرژی حالت پایه، انرژی میانگین حالت پایه به ازای هر ذره و تابع موج حالت پایه سیستمی متشکل

از N ذره‌ی اسپین $\frac{1}{2}$ یکسان غیربرهم‌کنشی در حال حرکت تحت اثر یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بُعدی را برای دو حالت زیر بیابید:

(آ) هنگامی که N زوج است.

(ب) هنگامی که N فرد است.

حل:

(آ)

در اینجا برای یک تک‌ذره، تابع موج و انرژی آن عبارتند از:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi x_0}} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right); \quad x_0 = \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

بنابر اصل طرد پائولی، برای N فرمیون یکسان فقط دو تا از آنها می‌توانند به هر یک از حالت‌های

$n = 0, 1, 2, \dots$ بروند به‌طوری‌که تعداد $\frac{N}{2}$ حالت پر می‌شوند. بنابراین انرژی کل برابر است با:

$$E^{(0)} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega \frac{N}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{N}{2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{N^2}{2} \hbar\omega$$

از این‌رو انرژی بر ذره برابر است با:

$$\frac{E^{(0)}}{N} = \frac{N}{2} \hbar\omega$$

و تابع موج $\psi^{(0)}(x_1, x_2, \dots, x_N)$ نیز توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$\psi^{(0)}(x_1, x_2, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_0(x_1)\chi(S_1) & \psi_0(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_0(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_1(x_N)\chi(S_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{\frac{N}{2}-1}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{N}{2}-1}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{N}{2}-1}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{N}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{N}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{N}{2}}(x_N)\chi(S_N) \end{vmatrix}$$

که در رابطه‌ی فوق $\chi(S_i) = \left| \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\rangle$ حالت اسپینی ذره i ام با $1 - \frac{N}{2}, 1, \dots, \frac{N}{2}$ می‌باشد.

(ب) برای حالتی که N فرد باشد، انرژی حالت پایه را می‌توان مجموع انرژی حالت پایه یک سیستم $(N-1)$ ذره‌ای به علاوه $E_{\frac{N-1}{2}}$ در نظر بگیریم:

$$E^{(0)} = \frac{\hbar \omega}{2} (N-1)^2 + \hbar \omega \left(\frac{N-1}{2} + 1 \right) = \frac{\hbar \omega}{2} \left[(N-1)^2 + N + 1 \right] = \frac{\hbar \omega}{2} (N^2 - N + 2)$$

از این‌رو انرژی بر ذره برابر است با:

$$\frac{E^{(0)}}{N} = \frac{\hbar \omega}{2} \left(N - 1 + \frac{2}{N} \right)$$

و تابع موج $\psi^{(0)}(x_1, x_2, \dots, x_N)$ نیز توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$\psi^{(0)}(x_1, x_2, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_{\frac{1}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{1}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{1}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{3}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{3}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{3}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{5}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{5}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{5}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{7}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{7}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{7}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{9}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{9}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{9}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_N)\chi(S_N) \\ \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_1)\chi(S_1) & \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_2)\chi(S_2) & \dots & \psi_{\frac{N-1}{2}}(x_N)\chi(S_N) \end{vmatrix}$$

تمرین ۸-۹

سیستمی متشکل از چهار ذره‌ی غیربرهمکنشی که به حرکت در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بُعدی به طول a محدود شده‌اند را در نظر بگیرید. $V(x) = 0$ به ازای $0 < x < a$ و $V(x) = \infty$ برای سایر مقادیر x می‌باشد. انرژی‌ها و توابع موج حالت پایه، اولین و دومین حالت برانگیخته را زمانی که چهار ذره:

(آ) بوزون‌هایی متمایز باشند به‌طوری که جرم‌های متناظر آنها در رابطه زیر صدق کنند:

$$m_1 < m_r < m_r < m_f$$

(ب) بوزون‌های یکسان (هر کدام به جرم m) باشند تعیین کنید.

حل:

(آ)

در مورد چهار بوزون غیر مشابه، تابع موج و انرژی کل توسط روابط زیر داده می‌شوند:

$$E_{n_1 n_r n_r n_f} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2a^2} \left(\frac{n_1^2}{m_1} + \frac{n_r^2}{m_r} + \frac{n_r^2}{m_r} + \frac{n_f^2}{m_f} \right)$$

$$\psi_{n_1 n_r n_r n_f}(x_1, x_r, x_r, x_f) = \frac{4}{a^2} \sin\left(\frac{n_1 \pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{n_r \pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{n_r \pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{n_f \pi x_f}{a}\right)$$

حالت پایه ذره، متناظر با موردی است که هر چهار ذره در حالت پایه متناظرشان (یعنی: $n_1 = n_r = n_r = n_f = 1$) قرار گرفته باشند. بنابراین:

$$E^{(0)} = E_{1111} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2a^2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_r} + \frac{1}{m_r} + \frac{1}{m_f} \right)$$

$$\psi^{(0)}(x_1, x_r, x_r, x_f) = \frac{4}{a^2} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_f}{a}\right)$$

چون ذره‌ی چهارم از همه سنگین‌تر است، اولین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که ذره‌ی چهارم در $n_f = 2$ و سه ذره‌ی دیگر در $n_1 = n_r = n_r = 1$ باقی بمانند:

$$E^{(1)} = E_{1112} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2a^2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_r} + \frac{1}{m_r} + \frac{4}{m_f} \right)$$

$$\psi^{(1)}(x_1, x_r, x_r, x_f) = \frac{4}{a^2} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_f}{a}\right)$$

به‌طور مشابه، دومین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که ذرات سوم و چهارم در $n_r = n_f = 2$ و ذرات اول و دوم در $n_1 = n_r = 1$ باقی بمانند:

$$E^{(2)} = E_{1122} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2a^2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_r} + \frac{4}{m_r} + \frac{4}{m_f} \right)$$

$$\psi^{(2)}(x_1, x_r, x_r, x_f) = \frac{4}{a^2} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_f}{a}\right)$$

(ب)

در مورد چهار بوزون مشابه، حالت پایه متناظر با موردی است که هر چهار ذره در پایین‌ترین حالت ($n_1 = n_r = n_f = n_f = 1$) قرار بگیرند:

$$E^{(0)} = E_{1111} = 4\varepsilon_1 = \frac{4\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(0)} = \psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_f)\psi_1(x_f) = \frac{4}{a^2} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_r}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_f}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_f}{a}\right)$$

در دومین حالت برانگیخته سه تا از چهار ذره در ψ_1 (هر کدام با انرژی $\varepsilon_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$) و یکی از آنها

در ψ_r (با انرژی $\varepsilon_r = \frac{4\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$) قرار می‌گیرند:

$$E^{(1)} = 3\varepsilon_1 + \varepsilon_r = 3\varepsilon_1 + 4\varepsilon_1 = 7\varepsilon_1 = \frac{7\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(1)}(x_1, x_r, x_f, x_f) = \sqrt{\frac{3!}{4!}} [\psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_f)\psi_r(x_f) + \psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_r(x_r)\psi_1(x_f) + \psi_1(x_1)\psi_r(x_r)\psi_1(x_r)\psi_1(x_f) + \psi_r(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_r)\psi_1(x_f)]$$

در دومین حالت برانگیخته دو تا از چهار ذره در ψ_1 (هر کدام با انرژی $\varepsilon_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$) و دو تا از آنها

در ψ_r (با انرژی $\varepsilon_r = 4\varepsilon_1$) قرار می‌گیرند:

$$E^{(2)} = 2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_r = 2\varepsilon_1 + 2(4\varepsilon_1) = 10\varepsilon_1 = \frac{10\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(2)}(x_1, x_r, x_f, x_f) = \sqrt{\frac{2!2!}{4!}} [\psi_1(x_1)\psi_1(x_r)\psi_r(x_r)\psi_r(x_f) + \psi_1(x_1)\psi_r(x_r)\psi_1(x_r)\psi_r(x_f) + \psi_1(x_1)\psi_r(x_r)\psi_r(x_r)\psi_1(x_f) + \psi_r(x_1)\psi_1(x_r)\psi_1(x_r)\psi_r(x_f) + \psi_r(x_1)\psi_1(x_r)\psi_r(x_r)\psi_1(x_f) + \psi_r(x_1)\psi_r(x_r)\psi_1(x_r)\psi_1(x_f)]$$

تمرین ۸-۱۰

سیستمی متشکل از چهار ذره غیربرهم‌کنشی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ (هر کدام به جرم m) را در نظر بگیرید که حرکت آنها در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بُعدی به طول a محدود شده است.

$V(x) = 0$ به ازای $0 < x < a$ و $V(x) = \infty$ برای سایر مقادیر x می‌باشد. انرژی‌ها و توابع موج حالت پایه را محاسبه و چگونگی توزیع ذرات در میان ترازها را ترسیم کنید.

حل:

در مورد چهار فرمیون مشابه، حالت پایه متناظر با موردی است که دو ذره در پایین‌ترین حالت ψ_1 (یکی دارای اسپین بالا $|+\rangle = |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ و دیگری با اسپین پایین $|-\rangle = |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$) و دو ذره دیگر در حالت ψ_2 (یکی دارای اسپین بالا و دیگری دارای اسپین پایین) قرار بگیرند (مطابق شکل). انرژی حالت پایه عبارتست از:

$$E^{(1)} = 2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 = 2\varepsilon_1 + 2(4\varepsilon_1) = 10\varepsilon_1 = \frac{10\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

تابع موج حالت پایه باید پاد متقارن باشد. بنابراین:

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_2)\chi(S_2) & \psi_1(x_3)\chi(S_3) & \psi_1(x_4)\chi(S_4) \\ \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_2)\chi(S_2) & \psi_1(x_3)\chi(S_3) & \psi_1(x_4)\chi(S_4) \\ \psi_2(x_1)\chi(S_1) & \psi_2(x_2)\chi(S_2) & \psi_2(x_3)\chi(S_3) & \psi_2(x_4)\chi(S_4) \\ \psi_2(x_1)\chi(S_1) & \psi_2(x_2)\chi(S_2) & \psi_2(x_3)\chi(S_3) & \psi_2(x_4)\chi(S_4) \end{vmatrix}$$

اولین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که دو ذره در پایین‌ترین حالت ψ_1 (یکی دارای اسپین بالا و دیگری با اسپین پایین)، یکی از ذرات در حالت ψ_2 (با اسپین بالا یا پایین) و ذره آخر در حالت ψ_3 (با اسپین بالا یا پایین) قرار بگیرند (مطابق شکل). پس انرژی و تابع موج اولین حالت برانگیخته عبارتند از:

$$E^{(1)} = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 2\varepsilon_1 + 4\varepsilon_1 + 9\varepsilon_1 = 15\varepsilon_1 = \frac{15\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_2)\chi(S_2) & \psi_1(x_3)\chi(S_3) & \psi_1(x_4)\chi(S_4) \\ \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_2)\chi(S_2) & \psi_1(x_3)\chi(S_3) & \psi_1(x_4)\chi(S_4) \\ \psi_2(x_1)\chi(S_1) & \psi_2(x_2)\chi(S_2) & \psi_2(x_3)\chi(S_3) & \psi_2(x_4)\chi(S_4) \\ \psi_3(x_1)\chi(S_1) & \psi_3(x_2)\chi(S_2) & \psi_3(x_3)\chi(S_3) & \psi_3(x_4)\chi(S_4) \end{vmatrix}$$

دومین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که یکی از ذرات در پایین‌ترین حالت ψ_1 (با اسپین بالا یا پایین)، دو تا از آنها در حالت ψ_2 (یکی با اسپین بالا و دیگری با اسپین پایین) و ذره آخر در حالت ψ_3 (با اسپین بالا یا پایین) قرار بگیرند (مطابق شکل). پس:


$$E^{(2)} = \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \varepsilon_1 + 2(4\varepsilon_1) + 9\varepsilon_1 = 18\varepsilon_1 = \frac{18\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(r)}(x_1, x_r, x_r, x_f) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_r)\chi(S_r) & \psi_1(x_r)\chi(S_r) & \psi_1(x_f)\chi(S_f) \\ \psi_r(x_1)\chi(S_1) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_f)\chi(S_f) \\ \psi_r(x_1)\chi(S_1) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_f)\chi(S_f) \\ \psi_r(x_1)\chi(S_1) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_f)\chi(S_f) \end{vmatrix}$$

سومین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که دو تا از آنها در پایین‌ترین حالت ψ_1 (یکی با اسپین بالا و دیگری با اسپین پایین) و دو تای دیگر در حالت ψ_r (یکی با اسپین بالا و دیگری با اسپین پایین) قرار بگیرند (مطابق شکل). پس:

$$E^{(r)} = 2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_r = 2\varepsilon_1 + 2(4\varepsilon_1) = 2 \cdot 5\varepsilon_1 = \frac{2 \cdot \hbar^2 \pi^2}{2 m a^2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{m a^2}$$

$$\psi^{(r)}(x_1, x_r, x_r, x_f) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_r)\chi(S_r) & \psi_1(x_r)\chi(S_r) & \psi_1(x_f)\chi(S_f) \\ \psi_1(x_1)\chi(S_1) & \psi_1(x_r)\chi(S_r) & \psi_1(x_r)\chi(S_r) & \psi_1(x_f)\chi(S_f) \\ \psi_r(x_1)\chi(S_1) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_f)\chi(S_f) \\ \psi_r(x_1)\chi(S_1) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_r)\chi(S_r) & \psi_r(x_f)\chi(S_f) \end{vmatrix}$$



سومین حالت برانگیخته دومین حالت برانگیخته اولین حالت برانگیخته حالت پایه انرژی

تمرین ۸-۱۱

سیستمی متشکل از چهار ذره‌ی غیربرهم‌کنشی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ (هر کدام به جرم m) را در نظر بگیرید که حرکت آنها در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بُعدی به طول a محدود شده است. $V(x) = \infty$ برای سایر مقادیر x می‌باشد. انرژی‌ها و توابع موج حالت پایه، نخستین حالت برانگیخته و دومین حالت برانگیخته را تعیین کنید.

حل:

برای یک تک ذره، انرژی و تابع موج عبارتند از:

$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2 \pi^2}{2ma^2}, \quad \psi_n(x_i) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x_i}{a}\right)$$

تابع موج یک سیستم چهار فرمیونی باید پاد متقارن باشد. در اینجا چون هر چهار ذره، حالت اسپینی یکسانی دارند بنابراین هیچ دو ذره‌ای نمی‌توانند در حالت فضایی یکسانی قرار بگیرند و هر سطح انرژی توسط حداکثر یک ذره اشغال می‌شود. بنابراین حالت پایه متناظر است با موردی که پایین‌ترین چهار سطح $n = 1, 2, 3, 4$ اشغال شوند. انرژی و تابع حالت پایه طبق این توضیحات عبارتند از:

$$E^{(0)} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 = \varepsilon_1 + 4\varepsilon_1 + 9\varepsilon_1 + 16\varepsilon_1 = 30\varepsilon_1 = \frac{30\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(0)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1) & \psi_1(x_2) & \psi_1(x_3) & \psi_1(x_4) \\ \psi_2(x_1) & \psi_2(x_2) & \psi_2(x_3) & \psi_2(x_4) \\ \psi_3(x_1) & \psi_3(x_2) & \psi_3(x_3) & \psi_3(x_4) \\ \psi_4(x_1) & \psi_4(x_2) & \psi_4(x_3) & \psi_4(x_4) \end{vmatrix} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_1 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_2 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_3 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_4$$

اولین حالت برانگیخته متناظر است با موردی که ذره‌ی چهارم به سطح پنجم برود، یعنی سطوح $n = 1, 2, 3, 5$ هر یک توسط یک ذره اشغال شوند و سطح چهارم خالی باشد.

$$E^{(1)} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_5 = \varepsilon_1 + 4\varepsilon_1 + 9\varepsilon_1 + 25\varepsilon_1 = 39\varepsilon_1$$

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1) & \psi_1(x_2) & \psi_1(x_3) & \psi_1(x_4) \\ \psi_2(x_1) & \psi_2(x_2) & \psi_2(x_3) & \psi_2(x_4) \\ \psi_3(x_1) & \psi_3(x_2) & \psi_3(x_3) & \psi_3(x_4) \\ \psi_5(x_1) & \psi_5(x_2) & \psi_5(x_3) & \psi_5(x_4) \end{vmatrix} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_1 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_2 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_3 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_4$$

دومین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که سطوح $n = 1, 2, 4, 5$ هر یک توسط یکی از ذرات اشغال شوند و بقیه‌ی سطوح خالی باشند:

$$E^{(2)} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_4 + \varepsilon_5 = \varepsilon_1 + 4\varepsilon_1 + 16\varepsilon_1 + 25\varepsilon_1 = 46\varepsilon_1 = \frac{46\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

$$\psi^{(2)}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{\sqrt{4!}} \begin{vmatrix} \psi_1(x_1) & \psi_1(x_2) & \psi_1(x_3) & \psi_1(x_4) \\ \psi_2(x_1) & \psi_2(x_2) & \psi_2(x_3) & \psi_2(x_4) \\ \psi_3(x_1) & \psi_3(x_2) & \psi_3(x_3) & \psi_3(x_4) \\ \psi_4(x_1) & \psi_4(x_2) & \psi_4(x_3) & \psi_4(x_4) \end{vmatrix} \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_1 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_2 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_3 \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_4$$

تمرین ۸-۱۲

با فرض این که الکترون‌های موجود در اتم هلیوم، بوزون‌هایی بدون اسپین باشند و با چشم‌پوشی از برهمکنش‌های میان آنها، انرژی و تابع موج حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته‌ی این سیستم (فرضی) را بیابید.

حل:

برای هر تک الکترون، انرژی آن ϵ_n و تابع موج آن $\phi_{nlm}(\vec{r})$ می‌باشد به‌طوری‌که:

$$\epsilon_n = -\frac{4E_1}{n^2} = -\frac{4 \times 13.6 \text{ eV}}{n^2} = -\frac{54.4 \text{ eV}}{n^2}$$

اگر الکترون را بوزون بدون اسپین در نظر بگیریم، در اینجا حالت پایه متناظر با موردی است که هر دو الکترون در حالت پایه خود قرار بگیرند یعنی $n_1 = n_2 = 1$ و در نتیجه:

$$E^{(0)} = \epsilon_1 + \epsilon_2 = 2\epsilon_1 = -2 \times 54.4 / 4 \text{ eV} = -10.8 / 1 \text{ eV}$$

$$\psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi_{1..}(\vec{r}_1) \phi_{1..}(\vec{r}_2)$$

اولین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که یکی از الکترون‌ها در سطح $n=1$ و دیگری در سطح $n=2$ قرار بگیرد. بنابراین:

$$E^{(1)} = \epsilon_1 + \epsilon_2 = \epsilon_1 + \frac{\epsilon_1}{4} = 1/4 \epsilon_1 = -6.8 \text{ eV}$$

$$\psi^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{1..}(\vec{r}_1) \psi_{2lm_l}(\vec{r}_2) + \psi_{2lm_l}(\vec{r}_1) \psi_{1..}(\vec{r}_2) \right]$$

واضح است که در اینجا l می‌تواند مقادیر صفر یا یک را اختیار کند و $-l \leq m_l \leq l$.

تمرین ۸-۱۳

با فرض این که الکترون‌های موجود در اتم لیتیم، بوزون‌هایی بدون اسپین باشند و با چشم‌پوشی از برهمکنش‌های میان آنها، انرژی و تابع موج حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته‌ی این سیستم (فرضی) را بیابید.

حل:

در مورد اتم لیتیم $Z = 3$ می باشد به طوری که:

$$\varepsilon_n = -\frac{9E_1}{n^2} = -\frac{9 \times 13.6 \text{ eV}}{n^2} = -\frac{122.4 \text{ eV}}{n^2}$$

در حالت پایه هر سه الکترون (که در اینجا بوزن در نظر گرفته شده اند) در حالت پایه خود قرار می گیرند یعنی $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ و در نتیجه:

$$E^{(0)} = \varepsilon_1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_1 = -3 \times 122.4 \text{ eV} = -367.2 \text{ eV}$$

در اولین حالت برانگیخته یکی از سه الکترون در سطح $n = 2$ و دو الکترون دیگر در سطح $n = 1$ قرار خواهند گرفت.

$$E^{(1)} = \varepsilon_1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 2\varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_1}{4} = \frac{9}{4}\varepsilon_1 = -275.4 \text{ eV}$$

$$\psi^{(1)}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\psi_{1..}(\vec{r}_1) \psi_{1..}(\vec{r}_2) \psi_{2lm_l}(\vec{r}_3) + \psi_{1..}(\vec{r}_1) \psi_{2lm_l}(\vec{r}_2) \psi_{1..}(\vec{r}_3) + \psi_{2lm_l}(\vec{r}_1) \psi_{1..}(\vec{r}_2) \psi_{1..}(\vec{r}_3) \right]$$

در اینجا واضح است که l می تواند مقادیر صفر و یک را داشته باشد و به ازای هر l نیز $-l \leq m_l \leq +l$.

تمرین ۸-۱۴

سیستمی متشکل از دو ذره یکسان غیربرهمکنشی با اسپین $\frac{1}{2}$ و جرم های یکسان m که حرکت آنها در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بعدی به طول L محدود شده است را در نظر بگیرید. $V(x) = 0$ به ازای $0 < x < L$ و $V(x) = \infty$ برای سایر مقادیر x می باشد. فرض کنید که ذرات در حالتی با تابع موج $\chi(S_1, S_2) = \frac{\sqrt{2}}{L} \left[\sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\Delta\pi x_2}{L}\right) + \sin\left(\frac{\Delta\pi x_1}{L}\right) \sin\left(2\frac{\pi x_2}{L}\right) \right]$ قرار دارند که در آن x_1 و x_2 به ترتیب مکان های ذرات ۱ و ۲ هستند. (آ) آیا $\chi(S_1, S_2)$ می خواهد به یک حالت یکتا یا سه تایی تبدیل شود؟ (ب) انرژی این سیستم را بیابید.

حل:

(آ)

چون تابع موج مربوط به سیستمی متشکل از دو ذره مشابه اسپین $\frac{1}{2}$ باید پاد متقارن باشد با توجه به اینکه قسمت فضایی $\psi(x_1, x_2)$ متقارن است لذا قسمت اسپینی آن باید پاد متقارن باشد و بنابراین

باید منفرد باشد. $\chi(\vec{S}_1, \vec{S}_2)$

(ب) تابع موج داده شده متناظر با موردی است که یکی از ذرات در سطح $n=2$ و دیگری در سطح $n=5$ واقع است و با توجه به اینکه $\varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ لذا:

$$E = \varepsilon_2 + \varepsilon_5 = 4\varepsilon_1 + 25\varepsilon_1 = 29\varepsilon_1 = \frac{29\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

خواننده حتماً می‌داند که تابع موج ذره‌ی محصور در جعبه به عرض a ، $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ می‌باشد.

تمرین ۸-۱۵

سیستی متشکل از دو ذره‌ی غیر برهم‌کنشی (در تقریبی که در آن از برهم‌کنش میان الکترون‌ها چشم‌پوشی می‌شود) با اسپین‌های یکسان $\frac{1}{2}$ (با جرم m) را در نظر بگیرید. ذرات در چاه پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بُعدی حرکت می‌کنند. فرض کنید ذرات در حالتی با تابع موج زیر قرار دارند:

$$\Psi(x_1, x_2) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi x_1 x_2}} (x_2 - x_1) \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2x_1 x_2}\right) \chi(S_1, S_2)$$

که در آن x_1 و x_2 به ترتیب موقعیت ذره‌ها ۱ و ۲ و $\chi(S_1, S_2)$ حالت اسپینی دو ذره است. (آ) آیا $\chi(S_1, S_2)$ حالتی یگانه است و یا حالتی سه‌گانه؟ (ب) انرژی سیستم را بیابید.

حل:
(ا)

با توجه به اینکه برای یک سیستم دو فرمیونی، $\psi(x_1, x_2)$ باید تحت جابه‌جایی ذرات پاد متقارن باشد، چون بخش فضایی آن پاد متقارن است لذا بخش اسپینی آن باید متقارن و یا به عبارتی حالت سه‌گانه باشد.

(ب)

تابع موج داده شده متناظر با موردی است که یکی از دو فرمیون در سطح $n=0$ و دیگری در سطح $n=1$ نوسانگر هماهنگ یک بُعدی قرار گرفته باشد و بنابراین:

$$E = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 = \hbar\omega\left(0 + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 2\hbar\omega$$

تمرین ۸-۱۶

سیستمی متشکل از پنج الکترون غیربرهم‌کنشی (در تقریبی که در آن از برهم‌کنش میان الکترون‌ها چشم‌پوشی می‌شود) که حرکت آنها در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک بُعدی به طول $L = 0.5 \text{ nm}$ مقید است را در نظر بگیرید.

(آ) انرژی حالت پایه‌ی سیستم را بیابید.

(ب) انرژی اولین حالت برانگیخته سیستم را بیابید.

(پ) انرژی تحریک (برانگیختگی) اولین حالت برانگیخته را پیدا کنید.



حل:

برای هر تک ذره، سطح n دارای انرژی $\varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ است. طبق اصل طرد پائولی، حداکثر دو

الکترون در هر سطح می‌تواند قرار بگیرد، بنابراین:

(آ)


حالت پایه متناظر با موردی است که دو الکترون در سطح $n=1$ ، دو تا در سطح $n=2$ و یکی از آنها در سطح $n=3$ قرار بگیرد یعنی:



و در نتیجه:

$$E^{(0)} = 2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 2\varepsilon_1 + 2(4\varepsilon_1) + 9\varepsilon_1 = \frac{19\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad (\text{ب})$$

اولین حالت برانگیخته متناظر با موردی است که در آرایش مربوط به حالت پایه، یکی از الکترون‌های سطح $n=2$ به سطح $n=3$ برود:



و در نتیجه:

$$E^{(1)} = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_r + 2\varepsilon_r = 2\varepsilon_1 + 4\varepsilon_1 + 2(9\varepsilon_1) = 24\varepsilon_1 = \frac{24\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

(ب)

دومین حالت برانگیخته مربوط به حالتی است که در آن دو الکترون در $n=1$ ، دو تا در $n=2$ و یکی در $n=4$ باشد و لذا:

$$E^{(2)} = 26E_1$$



تمرین ۸-۱۷

آرایش‌های الکترون حالت پایه برای اتم‌هایی دارای $z = 40, 53, 70, 82$ الکترون را تعیین کنید.

حل:

طبق رابطی (۷۲-۸) داریم:

آرایش حالت پایه

$$\begin{array}{l}
 Z \\
 40 \quad (1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (3d)^{10} (4s)^2 (4p)^6 (4d)^2 (5s)^2 \\
 52 \quad (1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (3d)^{10} (4s)^2 (4p)^6 (4d)^{10} (5s)^2 (5p)^5 \\
 70 \quad (1s)^2 (2s)^2 (2p)^6 (3s)^2 (3p)^6 (3d)^{10} (4s)^2 (4p)^6 (4d)^{10} (4f)^4 (5s)^2 (5p)^6 (6s)^2
 \end{array}$$

تمرین ۸-۱۸

مقدارهای ممکن J (یعنی اندازه حرکت‌های زاویه‌ای کل) مرتبط با هر کدام از حالت‌های: ${}^1P, {}^4F, {}^2G, {}^1H$ را مشخص کنید.

حل:

در مورد ${}^1P$ داریم:

$$L = 1$$

$$S = 0$$

و در نتیجه:

$$J = |L - S|, \dots, |L + S| = |1 - 0| = 1$$

بنابراین حالت‌های ممکن عبارتند از:

$${}^1P_1$$

در مورد ${}^4F$ داریم:

$$L = 3$$

$$S = \frac{3}{2}$$

و در نتیجه:

$$J = \left| 3 - \frac{3}{2} \right|, \dots, \left| 3 + \frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}$$

بنابراین حالت‌های ممکن عبارتند از:

$${}^4F_{\frac{3}{2}}, {}^4F_{\frac{5}{2}}, {}^4F_{\frac{7}{2}}, {}^4F_{\frac{9}{2}}$$

در مورد ${}^2G$ داریم:

$$L = 4$$

$$S = \frac{1}{2}$$

و در نتیجه:

$$J = \left| 4 - \frac{1}{2} \right|, \dots, \left| 4 + \frac{1}{2} \right| = \frac{7}{2}, \frac{9}{2}$$

بنابراین حالت‌های ممکن عبارتند از:

$${}^4G_{\frac{7}{2}}, {}^4G_{\frac{9}{2}}$$

در مورد ${}^1H$ داریم:

$$L = 0$$

$$S = 0$$

و در نتیجه:

$$J = 0$$

و حالت‌های ممکن عبارتند از:

$${}^1H_0$$

تمرین ۸-۱۹

نمادگذاری طیف‌سنجی ${}^{2S+1}L_J$ (یعنی L ، S و J) را برای آرایش‌های حالت پایه‌ی(ا) $(Z=21) Sc$ و(ب) $(Z=29) Cu$ پیدا کنید.

حل:

(ا)

آرایش حالت پایه Sc عبارتست از:

$$[Ar](4s)^2(3d)^1$$

هم برای $[Ar]$ و هم برای $(4s)^2$ ، L و S هر دو صفر می‌باشد. بنابراین اندازه حرکت زاویه‌ای توسط الکترون $3d$ تعیین می‌شود. چون $S = \frac{1}{2}$ و $L = 2$ و چون پوسته $3d$ کمتر از نیمه پر است، طبق قانون سوم هوند اندازه حرکت زاویه‌ای توسط $J = |L - S| = \frac{3}{2}$ داده می‌شود و داریم:

$${}^2D_{\frac{3}{2}}$$

(ب)

آرایش حالت پایه Cu عبارتست از:

$$[Ar](3d)^{10}(4s)^1$$

هم برای $[Ar]$ و هم برای $(3d)^{10}$ ، L و S هر دو صفر می‌باشند. بنابراین اندازه حرکت زاویه‌ایتوسط الکترون $4s$ تعیین می‌شود. چون $S = \frac{1}{2}$ و $L = 0$ بنابراین $J = \frac{1}{2}$ و لذا داریم:

$${}^2S_{\frac{1}{2}}$$

فصل نهم

روش‌های تقریبی برای حالت‌های مانا

تمرین ۹-۱

انرژی حالت برانگیخته‌ی n ام را برای یک جعبه‌ی پتانسیل یک‌بُعدی به طول $2L$ با دیواره‌هایی در $x = -L$ و $x = L$ تا مرتبه‌ی اول حساب کنید که در کف جعبه با اختلال‌های زیر با $V_0 \ll 1$ مشخص می‌شود:

$$V_p(x) = \begin{cases} -V_0 & -L \leq x \leq L \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases} \quad (a)$$

$$V_p(x) = \begin{cases} -V_0 & -\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases} \quad (b)$$

حل:

از قبل می‌دانیم که سطوح انرژی و ویژه توابع مربوط به هامیلتونی مختل نشده H_0 عبارتند از:

$$E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8mL^2}$$

$$\phi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) & ; n = 1, 3, 5, \dots \\ \sqrt{\frac{1}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) & ; n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

طبق تئوری اختلال غیرتبهگن، انرژی حالت n ام تا مرتبه اول عبارتست از:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8mL^2} + E_n^{(1)}$$

که:

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | V_p(x) | \phi_n \rangle$$

پس:

(آ)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \cdot \int_{-L}^{+L} \frac{1}{L} \cos^2\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & ; n = 1, 3, 5, \dots \\ -V \cdot \int_{-L}^{+L} \frac{1}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & ; n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

که نتیجه می‌دهد:

$$E_n^{(1)} = -V \quad ; \quad n = 1, 3, \dots$$

(ب)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \cdot \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{1}{L} \cos^2\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & ; n = 1, 3, 5, \dots \\ -V \cdot \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{1}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & ; n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

که نتیجه می‌دهد:

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} 0 & ; n = 2, 4, 6, \dots \\ -V \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{n\pi} \right) & ; n = 1, 5, 9, \dots \\ -V \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{n\pi} \right) & ; n = 3, 7, 11, \dots \end{cases}$$

تمرین ۹-۲

انرژی حالت برانگیخته‌ی n ام را برای یک جعبه‌ی پتانسیل یک‌بُعدی به طول $2L$ با دیوارهایی در $x = -L$ و $x = L$ تا مرتبه‌ی اول اختلال محاسبه کنید که در کف جعبه با اختلال‌های زیر با $V_0 \ll 1$ مشخص می‌شود:

$$V_p(x) = \begin{cases} -V_0 & -\frac{L}{2} \leq x \leq 0 \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases} \quad (\text{آ})$$

$$V_p(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases} \quad (\text{ب})$$

$$V_p(x) = \begin{cases} -V_0 & -\frac{L}{2} \leq x \leq 0 \\ V_0 & 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases} \quad (\text{پ})$$

حل:

سطوح انرژی و ویژه توابع مربوط به هامیلتونی مختل نشده H_0 عبارتند از:

$$E_n^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8mL^2}$$

$$\phi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) & ; n = 1, 3, 5, \dots \\ \sqrt{\frac{1}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) & ; n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

طبق تئوری اختلال غیرتبه‌گن، انرژی حالت n ام تا مرتبه‌ی اول عبارتست از:

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8mL^2} + E_n^{(1)}$$

که:

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | V_p(x) | \phi_n \rangle$$

پس:

(ا)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \cos^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ -V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

که نتیجه می دهد:

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \cdot \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{n\pi} \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right) \right) & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ -V \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{n\pi} \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right) \right) & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

یا:

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \cdot \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{n\pi} \right) & ; \quad n = 1, 5, 9, \dots \\ -V \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{n\pi} \right) & ; \quad n = 3, 7, 11, \dots \\ -\frac{V}{r} & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

(ب)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \cos^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

که نتیجه می دهد:

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} V \cdot \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{n\pi} \right) & ; \quad n = 1, 5, 9, \dots \\ V \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{n\pi} \right) & ; \quad n = 3, 7, 11, \dots \\ \frac{V}{r} & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

(پ)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \cos^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx + V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \cos^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ -V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx + V \int_{-L}^L \frac{1}{r} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

که نتیجه می‌دهد:

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{n\pi} \right) + V \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{n\pi} \right) & ; \quad n = 1, 5, 9, \dots \\ -V \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n\pi} \right) + V \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n\pi} \right) & ; \quad n = 3, 7, 11, \dots \\ -\frac{V}{4} + \frac{V}{4} & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

یا:

$$E_n^{(1)} = 0 \quad ; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

این نتیجه از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود زیرا $\phi_n(x)$ دارای پاریتته معینی است و از طرفی $V_p(x)$ نیز تابعی فرد است لذا نتیجه‌ی عبارت:

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | V_p(x) | \phi_n \rangle$$

باید مقداری برابر صفر باشد.

تمرین ۹-۳

انرژی n امین حالت برانگیخته را تا اختلال مرتبه‌ی دوم و تابع موج را تا اختلال مرتبه‌ی اول برای یک جعبه‌ی پتانسیل یک بعدی به طول $2L$ با دیواره‌هایی در $x = -L$ و $x = L$ حساب کنید که در کف جعبه با اختلال‌های زیر با $V_0 \ll 1$ مشخص می‌شود:

$$V_p(x) = \begin{cases} 0 & -L \leq x \leq 0 \\ V_0 & 0 \leq x \leq L \end{cases} \quad (a)$$

(ب)

$$V_p(x) = \begin{cases} -V_0 \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) & |x| < L \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases}$$

حل:

سطوح انرژی و ویژه توابع مربوط به هامیلتونی مختل نشده H_0 عبارتند از:

$$E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8mL^2}$$

$$\phi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) & ; n = 1, 3, 5, \dots \\ \sqrt{\frac{1}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) & ; n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

طبق تئوری اختلال غیرتبهگن، انرژی حالت n ام تا مرتبه دوم و ویژه تابع مربوطه آن تا مرتبه اول عبارتند از:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8mL^2} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}, \quad |\psi_n\rangle = |\phi_n\rangle + |\psi_n^{(1)}\rangle$$

که:

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | V_p(x) | \phi_n \rangle, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

و:

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |\phi_m\rangle$$

پس:

(۱)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} V \cdot \int_0^L \frac{1}{L} \cos^2\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & ; n = 1, 3, 5, \dots \\ V \cdot \int_0^L \frac{1}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & ; n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

که نتیجه می‌دهد:

$$E_n^{(1)} = \frac{V}{2} \quad ; \quad n = 1, 2, \dots$$

برای محاسبه $\langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle$ چهار حالت را در نظر می‌گیریم:

۱. n و m هر دو فرد باشند:

$$\begin{aligned} \langle \phi_m | V_p(x) | \phi_n \rangle &= \frac{V}{L} \int_0^L \cos\left(\frac{m\pi x}{2L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx \\ &= \frac{V}{2L} \int_0^L \left\{ \cos\left[\frac{(m+n)\pi x}{2L}\right] + \cos\left[\frac{(m-n)\pi x}{2L}\right] \right\} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{V}{2L} \left\{ \frac{2L}{(m+n)\pi} \sin \left[\frac{(m+n)\pi x}{2L} \right] \Big|_0^L + \frac{2L}{(m-n)\pi} \sin \left[\frac{(m-n)\pi x}{2L} \right] \Big|_0^L \right\} \\
 &= \frac{V}{2L} \left\{ \frac{2L}{(m+n)\pi} \sin \left[\frac{(m+n)\pi x}{2L} \right] + \frac{2L}{(m-n)\pi} \sin \left[\frac{(m-n)\pi x}{2L} \right] \right\}
 \end{aligned}$$

چون مجموع و تفاضل m و n عددی زوج است لذا حاصل عبارت اخیر صفر است و داریم:

$$\langle \phi_m | V_p | \phi_n \rangle = 0.$$

۲. m و n هر دو زوج باشند:

$$\langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle = \frac{V}{L} \int_0^L \sin \left(\frac{m\pi x}{2L} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx = \frac{V}{2L} \int_0^L \left\{ \cos \left[\frac{(m-n)\pi x}{2L} \right] - \cos \left[\frac{(m+n)\pi x}{2L} \right] \right\} dx = 0.$$

۳. n فرد و m زوج باشد:

$$\begin{aligned}
 \langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle &= \frac{V}{L} \int_0^L \sin \left(\frac{m\pi x}{2L} \right) \cos \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx = \frac{V}{2L} \int_0^L \left\{ \sin \left[\frac{(m+n)\pi x}{2L} \right] + \sin \left[\frac{(m-n)\pi x}{2L} \right] \right\} dx \\
 &= -\frac{V}{2L} \left\{ \frac{2L}{(m+n)\pi} \left[\cos \left(\frac{(m+n)\pi}{2} \right) - 1 \right] + \frac{2L}{(m-n)\pi} \left[\cos \left(\frac{(m-n)\pi}{2} \right) - 1 \right] \right\}
 \end{aligned}$$

چون مجموع و تفاضل m و n عددی فرد است، لذا:

$$\langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle = \frac{-V}{2L} \left(\frac{-2L}{(m+n)\pi} + \frac{-2L}{(m-n)\pi} \right) = \frac{2mV}{(m^2 - n^2)\pi}$$

۴. n زوج و m فرد باشد:

$$\langle \phi_m | \hat{V}_p | \phi_n \rangle = \frac{V}{L} \int_0^L \sin \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) \cos \left(\frac{m\pi x}{2L} \right) dx = \frac{2nV}{(n^2 - m^2)\pi}$$

پس:

$$E_n^{(r)} = \begin{cases} \sum_{m=\text{even}} \frac{\left[\frac{2mV}{(m^2 - n^2)\pi} \right]^r}{E_n - E_m} & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ \sum_{m=\text{odd}} \frac{\left[\frac{2nV}{(n^2 - m^2)\pi} \right]^r}{E_n - E_m} & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

در نتیجه:

$$E_n^{(r)} = \begin{cases} \sum_{l=\text{even}} \frac{\epsilon l^r V^r}{(l^r - n^r)^r \pi^r \frac{\pi^r \hbar^r}{\lambda m L^r} (n^r - l^r)} ; & n = 1, 2, 3, \dots \\ \sum_{l=\text{odd}} \frac{\epsilon n^r V^r}{(n^r - l^r)^r \pi^r \frac{\pi^r \hbar^r}{\lambda m L^r} (n^r - l^r)} ; & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

یا:

$$E_n^{(r)} = \begin{cases} \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{12 \lambda m l^r L^r V^r}{\pi^r \hbar^r (n^r - \epsilon l^r)^r} ; & n = 1, 2, 3, \dots \\ \sum_{l=1}^{\infty} \frac{12 \lambda m n^r L^r V^r}{\pi^r \hbar^r (n^r - (2l-1)^r)^r} ; & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

و:

$$|\psi_n^{(i)}\rangle = \begin{cases} \sum_{l=\text{even}} \frac{\epsilon l V^r |\phi_l\rangle}{(n^r - l^r)^r \pi^r \frac{\pi^r \hbar^r}{\lambda m L^r} (n^r - l^r)} ; & n = 1, 2, 3, \dots \\ \sum_{l=\text{odd}} \frac{\epsilon n V^r |\phi_l\rangle}{(n^r - l^r)^r \pi^r \frac{\pi^r \hbar^r}{\lambda m L^r} (n^r - l^r)} ; & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

یا:

$$\langle x | \psi_n^{(i)} \rangle = \begin{cases} \sum_{l=\text{even}} \frac{16 m l^r L^r V^r \sqrt{\frac{1}{L}} \sin\left(\frac{l\pi x}{2L}\right)}{\pi^r \hbar^r (n^r - l^r)^r} ; & n = 1, 2, 3, \dots \\ \sum_{l=\text{odd}} \frac{16 m n^r L^r V^r \sqrt{\frac{1}{L}} \cos\left(\frac{l\pi x}{2L}\right)}{\pi^r \hbar^r (n^r - l^r)^r} ; & n = 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$

(ب)

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -V \cdot \int_{-L}^{+L} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) \frac{1}{L} \cos^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ -V \cdot \int_{-L}^{+L} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) \frac{1}{L} \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

محاسبه‌ی انتگرال‌ها نتیجه می‌دهد که:

$$E_n^{(1)} = \begin{cases} -2V \cdot \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{(n\pi)^2} \right] & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ -2V \cdot \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{(n\pi)^2} \right] & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

برای محاسبه‌ی $\langle \phi_m | V_p | \phi_n \rangle$ چهار حالت را در نظر می‌گیریم:۱. m فرد و n زوج باشد:

$$\langle \phi_m | V_p | \phi_n \rangle = \int_{-L}^{+L} -V \cdot \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) \frac{1}{L} \cos \left(\frac{m\pi x}{2L} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx = 0$$

علت صفر شدن انتگرال، فرد بودن انتگرالده و مقارن بودن بازه‌ی انتگرال‌گیری است.

۲. m زوج و n فرد باشد:

$$\langle \phi_m | V_p | \phi_n \rangle = 0 \quad \text{مشابه مورد اول،}$$

۳. m و n هر دو فرد باشند:

$$\begin{aligned} \langle \phi_m | V_p | \phi_n \rangle &= \int_{-L}^{+L} -V \cdot \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) \frac{1}{L} \cos \left(\frac{m\pi x}{2L} \right) \cos \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx = \frac{V}{L^2} \int_{-L}^{+L} x^2 \cos \left(\frac{m\pi x}{2L} \right) \cos \left(\frac{n\pi x}{2L} \right) dx \\ &= \frac{2V}{L^2} \left[\int_0^L x^2 \cos \left[\frac{\pi x}{2L} (m+n) \right] dx + \int_0^L x^2 \cos \left[\frac{\pi x}{2L} (m-n) \right] dx \right] \\ &= \frac{2V}{L^2} \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{(-1)^{\frac{m+n}{2}}}{(m+n)^2} + \frac{(-1)^{\frac{m-n}{2}}}{(m-n)^2} \right] = \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{(-1)^{\frac{m+n}{2}}}{(m+n)^2} + \frac{(-1)^{\frac{m-n}{2}}}{(m-n)^2} \right] \end{aligned}$$

۴. m و n هر دو زوج باشند:

$$\begin{aligned}\langle \phi_m | V_p | \phi_n \rangle &= \int_{-L}^{+L} -V \cdot \left(1 - \frac{x^r}{L^r}\right) \frac{1}{L} \sin\left(\frac{m\pi x}{2L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx = \frac{V}{L^r} \int_{-L}^{+L} x^r \sin\left(\frac{m\pi x}{2L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx \\ &= \frac{V}{L^r} \left[\int_{-L}^L x^r \cos\left[\frac{\pi x}{2L}(m-n)\right] dx - \int_{-L}^L x^r \cos\left[\frac{\pi x}{2L}(m+n)\right] dx \right] \\ &= \frac{\lambda V}{\pi^r} \left[\frac{(-1)^{\frac{m-n}{r}}}{(m-n)^r} - \frac{(-1)^{\frac{m+n}{r}}}{(m+n)^r} \right]\end{aligned}$$

پس:

$$E_n^{(r)} = \begin{cases} \sum_{\substack{l=\text{odd} \\ l \neq n}} \frac{\left(\frac{\lambda V}{\pi^r}\right)^r \left[\frac{(-1)^{\frac{l+n}{r}}}{(l+n)^r} + \frac{(-1)^{\frac{l-n}{r}}}{(l-n)^r} \right]}{\frac{\hbar^r \pi^r}{\lambda m L^r} (n^r - l^r)} ; & n = 1, 3, 5, \dots \\ \sum_{\substack{l=\text{even} \\ l \neq n}} \frac{\left(\frac{\lambda V}{\pi^r}\right)^r \left[\frac{(-1)^{\frac{l-n}{r}}}{(l-n)^r} - \frac{(-1)^{\frac{l+n}{r}}}{(l+n)^r} \right]}{\frac{\hbar^r \pi^r}{\lambda m L^r} (n^r - l^r)} ; & n = 2, 4, 6, \dots\end{cases}$$

یا:

$$E_n^{(r)} = \frac{\lambda 192 m V_*^r L^r n^r}{\hbar^r \pi^r} \begin{cases} \sum_{\substack{l=\text{odd} \\ l \neq n}} \frac{l^r}{(n^r - l^r)^\delta} ; & n = 1, 3, 5, \dots \\ \sum_{\substack{l=\text{even} \\ l \neq n}} \frac{l^r}{(n^r - l^r)^\delta} ; & n = 2, 4, 6, \dots\end{cases}$$

و نیز داریم:

$$\psi_n^{(1)}(x) = \begin{cases} \sum_{\substack{l=odd \\ l \neq n}} \frac{\frac{\lambda V_0}{\pi^2} \left[\frac{(-1)^{\frac{l+n}{2}}}{(l+n)^2} + \frac{(-1)^{\frac{l-n}{2}}}{(l-n)^2} \right] \sqrt{\frac{1}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{2L}\right)}{\frac{\hbar^2 \pi^2}{\lambda m L^2} (n^2 - l^2)} & ; \quad n = 1, 3, 5, \dots \\ \sum_{\substack{l=even \\ l \neq n}} \frac{\frac{\lambda V_0}{\pi^2} \left[\frac{(-1)^{\frac{l-n}{2}}}{(l-n)^2} - \frac{(-1)^{\frac{l+n}{2}}}{(l+n)^2} \right] \sqrt{\frac{1}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2L}\right)}{\frac{\hbar^2 \pi^2}{\lambda m L^2} (n^2 - l^2)} & ; \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

تمرین ۴-۹

سیستی را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن با $\hat{H} = E_0$ داده می‌شود و در

$$\begin{pmatrix} 3 & 2\lambda & 0 & 0 \\ 2\lambda & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma & \sqrt{2}\lambda \\ 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda & \gamma \end{pmatrix}$$

آن $\lambda \ll 1$.

(آ) ویژه مقادیر دقیق $\hat{H}$ را محاسبه کنید. هر یک از این ویژه مقادیر را تا توان دوم λ بسط دهید.
 (ب) ویژه مقادیر انرژی را تا اختلال مرتبه‌ی دوم حساب کنید و آن‌ها را با نتایج دقیق به دست آمده در (آ) مقایسه کنید.

(پ) ویژه حالت‌های $\hat{H}$ را تا تصحیح مرتبه‌ی اول حساب کنید.

حل:
 (آ)

ویژه مقادیر $\hat{H}$ را می‌توان از قطری کردن ماتریس مربوطه به دست آورد. برای این منظور باید معادله‌ی زیر حل شود:

$$\begin{vmatrix} 3E_0 - E & 2\lambda E_0 & 0 & 0 \\ 2\lambda E_0 & -3E_0 - E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma E_0 - E & \sqrt{2}\lambda E_0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda E_0 & \gamma E_0 - E \end{vmatrix} = 0$$

با تعریف $\varepsilon = \frac{E}{E_0}$ معادله‌ی فوق به معادله‌ی زیر تبدیل می‌شود:

$$\begin{vmatrix} 3-\varepsilon & 2\lambda & 0 & 0 \\ 2\lambda & -3-\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7-\varepsilon & \sqrt{2}\lambda \\ 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda & 7-\varepsilon \end{vmatrix} = 0$$

از حل این معادله نتیجه می شود که:

$$\varepsilon = \pm \sqrt{49 + 2\lambda^2} \quad \text{یا} \quad \varepsilon = \pm \sqrt{9 + 4\lambda^2}$$

و یا به طور معادل:

$$E = \pm E_0 \sqrt{49 + 2\lambda^2} = \pm 7 E_0 \sqrt{1 + \frac{2\lambda^2}{49}} \simeq \pm 7 E_0 \left(1 + \frac{\lambda^2}{49} \right) = \pm 7 E_0 \pm \frac{\lambda^2 E_0}{7}$$

$$E = \pm E_0 \sqrt{9 + 4\lambda^2} = \pm 3 E_0 \sqrt{1 + \frac{4\lambda^2}{9}} \simeq \pm 3 E_0 \left(1 + \frac{2\lambda^2}{9} \right) = \pm 3 E_0 \pm \frac{2\lambda^2 E_0}{3}$$

(ب)

هامیلتونی $\hat{H}$ را می توان به صورت $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$ در نظر گرفت به طوری که:

$$\hat{H}_0 = E_0 \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad \hat{H}_p = E_0 \begin{pmatrix} 0 & 2\lambda & 0 & 0 \\ 2\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda \\ 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

ویژه مقادیر $\hat{H}_0$ عبارتند از:

$$E_1^{(0)} = 3 E_0, \quad E_2^{(0)} = -3 E_0, \quad E_3^{(0)} = -7 E_0, \quad E_4^{(0)} = 7 E_0$$

ویژه بردارهای متناظر با این ویژه مقادیر عبارتند از:

$$|\phi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_4\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

از تئوری اختلال غیر تبهگن، تصحیحات مرتبه اول انرژی عبارتست از:

$$E_1^{(1)} = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} E_0 \begin{pmatrix} 0 & 2\lambda & 0 & 0 \\ 2\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda \\ 0 & 0 & \sqrt{2}\lambda & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

و به همین ترتیب نتیجه می‌شود که:

$$E_r^{(1)} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = 0, \quad E_r^{(1)} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = 0, \quad E_f^{(1)} = \langle \phi_f | \hat{H}_p | \phi_f \rangle = 0.$$

اما تصحیح مرتبه‌ی دوم عبارتست از:

$$E_1^{(2)} = \sum_{m=r,r,f} \frac{|\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{(r\lambda E_0)^2}{rE_0 - (-rE_0)} = \frac{r}{3}\lambda^2 E_0.$$

$$E_r^{(2)} = \sum_{m=1,r,f} \frac{|\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^2}{E_r^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^2}{E_r^{(0)} - E_1^{(0)}} = -\frac{r}{3}\lambda^2 E_0.$$

$$E_r^{(2)} = \sum_{m=1,r,f} \frac{|\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^2}{E_r^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|\langle \phi_f | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^2}{E_r^{(0)} - E_f^{(0)}} = \frac{(\sqrt{r}\lambda E_0)^2}{-rE_0 - rE_0} = -\frac{1}{3}\lambda^2 E_0.$$

$$E_f^{(2)} = \sum_{m=1,r,f} \frac{|\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_f \rangle|^2}{E_f^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_f \rangle|^2}{E_f^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{(\sqrt{r}\lambda E_0)^2}{+rE_0 + rE_0} = \frac{1}{3}\lambda^2 E_0.$$

در محاسبات فوق از روابط زیر سود برده‌ایم:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_f \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_f \rangle = \langle \phi_f | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle \\ &= \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = \langle \phi_f | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle \end{aligned}$$

خواننده می‌تواند با محاسبه‌ای سراسری، درستی این روابط را تحقیق کند.

بنابراین تا تصحیح مرتبه‌ی دوم داریم:

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)} + E_1^{(2)} = rE_0 + \frac{r}{3}\lambda^2 E_0.$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(2)} = -rE_0 - \frac{r}{3}\lambda^2 E_0.$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(2)} = -rE_0 - \frac{1}{3}\lambda^2 E_0.$$

$$E_f = E_f^{(0)} + E_f^{(1)} + E_f^{(2)} = +rE_0 + \frac{1}{3}\lambda^2 E_0.$$

مقایسه نشان می‌دهد که این تقریب‌ها با جواب‌های دقیق همخوانی دارند.

(ب)

از تئوری اختلال غیر تبه‌گن، تصحیح مرتبه‌ی اول ویژه حالت‌های انرژی عبارتست از:

$$|\psi_1^{(1)}\rangle = \sum_{m=r,r,f} \frac{\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi \rangle \langle \phi_m |}{E_1^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi \rangle \langle \phi_r |}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{r\lambda E_r \langle \phi_r |}{rE_r + rE_r} = \frac{1}{r}\lambda |\phi_r\rangle$$

$$|\psi_r^{(1)}\rangle = \sum_{m=1,r,f} \frac{\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_r \rangle \langle \phi_m |}{E_r^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{\langle \phi_f | \hat{H}_p | \phi_r \rangle \langle \phi_f |}{E_r^{(0)} - E_f^{(0)}} = \frac{r\lambda E_r \langle \phi_f |}{rE_r - rE_r} = -\frac{1}{r}\lambda |\phi_f\rangle$$

$$|\psi_r^{(1)}\rangle = \sum_{m=1,r,f} \frac{\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_r \rangle \langle \phi_m |}{E_r^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{\langle \phi_f | \hat{H}_p | \phi_r \rangle \langle \phi_f |}{E_r^{(0)} - E_f^{(0)}} = \frac{\sqrt{r}\lambda E_r \langle \phi_f |}{-rE_r - rE_r} = -\frac{\sqrt{r}}{1f}\lambda |\phi_f\rangle$$

$$|\psi_f^{(1)}\rangle = \sum_{m=1,r,f} \frac{\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_f \rangle \langle \phi_m |}{E_f^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_f \rangle \langle \phi_r |}{E_f^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{\sqrt{r}\lambda E_r \langle \phi_r |}{rE_r + rE_r} = \frac{\sqrt{r}}{1f}\lambda |\phi_r\rangle$$

پس تا تصحیح مرتبه‌ی اول داریم:

$$|\psi_1\rangle = |\phi_1\rangle + |\psi_1^{(1)}\rangle = |\phi_1\rangle + \frac{1}{r}\lambda |\phi_r\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\lambda}{r} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\psi_r\rangle = |\phi_r\rangle + |\psi_r^{(1)}\rangle = |\phi_r\rangle - \frac{1}{r}\lambda |\phi_1\rangle = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{r} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\psi_r\rangle = |\phi_r\rangle + |\psi_r^{(1)}\rangle = |\phi_r\rangle - \frac{\sqrt{r}}{1f}\lambda |\phi_f\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -\frac{\sqrt{r}\lambda}{1f} \end{pmatrix}$$

$$|\psi_f\rangle = |\phi_f\rangle + |\psi_f^{(1)}\rangle = |\phi_f\rangle + \frac{\sqrt{r}}{1f}\lambda |\phi_r\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\sqrt{r}\lambda}{1f} \\ 1 \end{pmatrix}$$

تمرین ۹-۵

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که در پتانسیل سه‌بعدی $V(r) = kr$ حرکت می‌کند و در آن k ثابتی دارای ابعاد نیرو است. با استفاده از روش وردشی انرژی حالت پایه‌ی آن را تخمین بزنید. می‌توانید $R(r) = e^{-r/\alpha}$ را به عنوان تابع شعاعی آزمونی که در آن α یک پارامتر قابل تنظیم است در نظر بگیرید.

حل:

ابتدا $R(r)$ را بهنجار می‌کنیم. برای این منظور تعریف می‌کنیم:

$$\psi(r) = N R(r)$$

که N ثابت بهنجارش است که از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$1 = \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \psi^*(r) \psi(r) r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi$$

و یا:

$$1 = 4\pi N^2 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r}{\alpha}} r^2 dr$$

که نتیجه می‌دهد:

$$N = \alpha^{-\frac{2}{3}} \pi^{-\frac{1}{3}}$$

در رسیدن به این رابطه از تساوی زیر بهره برده‌ایم:

$$\int_0^{+\infty} r^2 e^{-\frac{r}{\alpha}} dr = \frac{1}{4} \alpha^3 \sqrt{\pi}$$

که اثبات آن به عنوان تمرین به خواننده واگذار می‌شود.

بنابراین انرژی حالت پایه توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$E_{\psi}^{VM} = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$$

پس:

$$E_{\psi}^{VM} = \langle \psi | -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + kr | \psi \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int (\vec{\nabla} \psi^*(r)) \cdot (\vec{\nabla} \psi(r)) d^3r + k \langle \psi | r | \psi \rangle$$

اما:

$$\langle \psi | r | \psi \rangle = \alpha^{-2} \pi^{-\frac{1}{3}} \left(4\pi \right) \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r}{\alpha}} r^3 dr = 4\pi \alpha^{-2} \frac{\alpha^4}{4} = \pi \alpha^2$$

$$\bar{\nabla} \psi^*(r) = \bar{\nabla} \psi(r) = \frac{d\psi(r)}{dr} \hat{r} = \alpha^{-\frac{r}{a}} \pi^{\frac{r}{a}} \left(\frac{-r}{ra} \right) e^{\frac{-r}{ra}} \hat{r} = -\alpha^{-\frac{r}{a}} \pi^{\frac{r}{a}} r e^{\frac{-r}{ra}} \hat{r}$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} E_{\cdot}^{VM}(\alpha) &= \frac{\hbar^2}{2m} \left(\alpha^{-\frac{r}{a}} \pi^{\frac{r}{a}} \right) \pi \int_{\cdot}^{+\infty} e^{\frac{-r}{ra}} r^2 dr + 2\alpha k \pi^{-\frac{1}{a}} \\ &= \frac{\hbar^2}{m} \alpha^{-\frac{r}{a}} \pi^{-\frac{1}{a}} \left(\frac{r}{a} \pi^{\frac{1}{a}} \alpha^{\frac{1}{a}} \right) + 2\alpha k \pi^{-\frac{1}{a}} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} + \frac{2ak}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

در رسیدن به نتیجه‌ی اخیر از روابط زیر در انجام محاسبات سود برده‌ایم:

$$\int_{\cdot}^{+\infty} e^{\frac{-r}{ra}} r^2 dr = \frac{a^3}{2}, \quad \int_{\cdot}^{+\infty} e^{\frac{-r}{ra}} r dr = \frac{a^2}{2} \pi^{\frac{1}{a}} \alpha^{\frac{1}{a}}$$

خواننده می‌تواند درستی این روابط را تحقیق کند.

با فرض اینکه $E_{\cdot}^{VM}(\alpha)$ کمینه‌ی مقدار خود را در $\alpha_{\cdot}$ دارد، داریم:

$$\left. \frac{\partial E_{\cdot}^{VM}(\alpha)}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=\alpha_{\cdot}} = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} + \frac{2k}{\sqrt{\pi}} = 0$$

که نتیجه می‌شود:

$$\alpha_{\cdot}^{\frac{1}{a}} = \frac{\hbar^2 \sqrt{\pi}}{2mk}$$

در نتیجه:

$$E_{\cdot}^{VM}(\alpha_{\cdot}) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2mk}{\hbar^2 \sqrt{\pi}} \right)^{\frac{1}{a}} + \frac{2k}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\hbar^2 \sqrt{\pi}}{2mk} \right)^{\frac{1}{a}} = 2 \left(\frac{\hbar^2 k}{m\pi} \right)^{\frac{1}{a}}$$

تمرین ۹-۶

با استفاده از روش WKB انرژی حالت پایه‌ی ذره‌ای به جرم m را تخمین بزنید که در یک پتانسیل سه‌بُعدی $V(r) = kr$ حرکت می‌کند و در آن k ثابتی دارای ابعاد نیرو است.

حل:

ذره، تحت پتانسیل $V(r) = kr$ حرکت می‌کند و بنابراین می‌توان فرض کرد که بین دو دیواره‌ی سخت در $r=0$ و $r=a$ حرکت می‌کند به‌طوری‌که:

$$E = V(a) = k a$$

و یا:

$$a = \frac{E}{k}$$

و در نتیجه:

$$\int_0^a \sqrt{2m(E - kr)} dr = n\pi\hbar \quad ; \quad n = 1, 2, \dots$$

پس:

$$n\pi\hbar = \frac{-1}{2mk} \left[(2m(E - kr))^{\frac{3}{2}} \right]_0^a = \frac{-1}{2mk} \left\{ (2m(E - ka))^{\frac{3}{2}} - (2mE)^{\frac{3}{2}} \right\} = \frac{+1}{2mk} (2mE)^{\frac{3}{2}}$$

که نتیجه می‌دهد:

$$E_n = \frac{(2mk n \pi \hbar)^{\frac{2}{3}}}{2m} = \frac{1}{2} \left(\frac{2k n \pi \hbar}{m^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{2}{3}} \quad ; \quad n = 1, 2, \dots$$

تمرین ۷-۹

همیلتونی نوسانگر هماهنگ دوبعدی زیر را در نظر بگیرید:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \frac{1}{2} m \omega^2 (\hat{X}^2 + \hat{Y}^2) (1 + \lambda \hat{X} \hat{Y})$$

که در آن $\lambda \ll 1$.(ا) توابع موج را برای سه تراز اول انرژی که در آن $\lambda = 0$ به دست آورید.(ب) با استفاده از نظریه اختلال تصحیح‌های مرتبه‌ی اول این ترازهای انرژی را هنگامی که $\lambda \neq 0$ تعیین کنید.

حل:

(ا)

با روش جداسازی متغیرها نتیجه می‌شود که:

$$\phi_{n_x n_y}(x, y) = \phi_{n_x}(x) \phi_{n_y}(y), \quad E_{n_x n_y} = \hbar \omega (n_x + n_y + 1)$$

که در این رابطه $\phi_{n_x}(x)$ و $\phi_{n_y}(y)$ ویژه تابع حالت (n_x, n_y) ام ذره وقتی که تحت تأثیر پتانسیل یکبعدی $\frac{1}{2} m \omega^2 \hat{X}^2$ است، می‌باشد.بنابراین حالت پایه فاقد تبهگنی و ویژه تابع آن $\phi_{00}(x, y)$ است. اولین حالت برانگیخته دارای تبهگنی

دوگانه و ویژه توابع آن $\phi_1(x, y)$ و $\phi_2(x, y)$ می‌باشند. دومین حالت برانگیخته دارای تبهگنی سه‌گانه و ویژه توابع آن $\phi_1(x, y)$ ، $\phi_2(x, y)$ و $\phi_3(x, y)$ می‌باشند.

(ب)

حالت پایه فاقد تبهگنی و تصحیح مرتبه‌ی اول آن عبارتست از:

$$E_{..}^{(1)} = \langle \phi_{..} | \hat{H}_p | \phi_{..} \rangle$$

که:

$$\hat{H}_p = \frac{\lambda}{\gamma} m w^r (\hat{X}^r + \hat{Y}^r) \hat{X} \hat{Y} = \frac{\lambda}{\gamma} m w^r (\hat{X}^r \hat{Y} + \hat{X} \hat{Y}^r)$$

پس:

$$E_{..}^{(1)} = \langle \phi_{..} | \frac{\lambda}{\gamma} m w^r (\hat{X}^r \hat{Y} + \hat{X} \hat{Y}^r) | \phi_{..} \rangle = \frac{\lambda}{\gamma} m w^r [\langle \phi_{..} | \hat{X}^r | \phi_{..} \rangle \langle \phi_{..} | \hat{Y} | \phi_{..} \rangle + \langle \phi_{..} | \hat{X} | \phi_{..} \rangle \langle \phi_{..} | \hat{Y}^r | \phi_{..} \rangle] = 0.$$

علت صفر شدن عبارت فوق نیز آن است که ϕ تحت پاریت، زوج است اما x ، y ، x^r و y^r تحت پاریت، فرد هستند. حالت برانگیخته‌ی اول تبهگنی دوگانه دارد. چون ϕ_1 و ϕ_2 ویژه حالت‌های مربوط به اولین حالت برانگیخته هستند لذا تصحیح مرتبه‌ی اول انرژی مربوط به اولین حالت برانگیخته در واقع ویژه مقادیر مربوط به ماتریس زیر است:

$$V_p = \begin{pmatrix} \langle \phi_{..} | V_p | \phi_{..} \rangle & \langle \phi_{..} | V_p | \phi_{.1} \rangle \\ \langle \phi_{.1} | V_p | \phi_{..} \rangle & \langle \phi_{.1} | V_p | \phi_{.1} \rangle \end{pmatrix}$$

حال به محاسبه‌ی عناصر این ماتریس می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} \langle \phi_{..} | V_p | \phi_{.1} \rangle &= \langle \phi_{..} | \frac{\lambda}{\gamma} m w^r (\hat{X}^r \hat{Y} + \hat{X} \hat{Y}^r) | \phi_{.1} \rangle \\ &= \frac{\lambda}{\gamma} m w^r (\langle \phi_{..} | \hat{X}^r | \phi_{..} \rangle \langle \phi_{..} | \hat{Y} | \phi_{.1} \rangle + \langle \phi_{..} | \hat{X} | \phi_{..} \rangle \langle \phi_{..} | \hat{Y}^r | \phi_{.1} \rangle) = 0. \end{aligned}$$

به‌همین ترتیب:

$$\langle \phi_{.1} | V_p | \phi_{.1} \rangle = 0.$$

علت صفر شدن این دو عنصر، لحاظ کردن پاریت است.

و:

$$\begin{aligned} \langle \phi_{.1} | V_p | \phi_{.1} \rangle &= \langle \phi_{.1} | \frac{\lambda}{\gamma} m w^r (\hat{X}^r \hat{Y} + \hat{X} \hat{Y}^r) | \phi_{.1} \rangle \\ &= \frac{\lambda}{\gamma} m w^r [\langle \phi_{.1} | \hat{X}^r | \phi_{.1} \rangle \langle \phi_{.1} | \hat{Y} | \phi_{.1} \rangle + \langle \phi_{.1} | \hat{X} | \phi_{.1} \rangle \langle \phi_{.1} | \hat{Y}^r | \phi_{.1} \rangle] \end{aligned}$$

اما:

$$\hat{X}|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle)$$

$$\begin{aligned}\hat{X}^\dagger|m\rangle &= \frac{\hbar}{2mw} (\hat{a}^\dagger + \hat{a} + 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1)|m\rangle \\ &= \frac{\hbar}{2mw} (\sqrt{m}\sqrt{m-1}|m-2\rangle + \sqrt{m+1}\sqrt{m+2}|m+2\rangle + (2m+1)|m\rangle)\end{aligned}$$

پس:

$$\langle m|\hat{X}|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}) = \langle m|\hat{Y}|n\rangle$$

$$\begin{aligned}\langle m|\hat{X}^\dagger|n\rangle &= \langle m|\hat{X}^\dagger|\hat{X}|n\rangle = \langle m|\hat{Y}^\dagger|n\rangle \\ &= \frac{\hbar}{2mw} (\sqrt{m}\sqrt{m-1}\langle m-2| + \sqrt{m+1}\sqrt{m+2}\langle m+2| + (2m+1)\langle m|) \\ &\quad \times \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle) = \left(\frac{\hbar}{2mw}\right)^{\frac{r}{2}} (\sqrt{m}\sqrt{n}\sqrt{n-1}\delta_{m-2,n-1} \\ &\quad + \sqrt{m}\sqrt{m-1}\sqrt{n+1}\delta_{m-2,n+1} + \sqrt{m+1}\sqrt{m+2}\sqrt{n}\delta_{m+2,n-1} \\ &\quad + \sqrt{m+1}\sqrt{m+2}\sqrt{n+1}\delta_{m+2,n+1} + (2m+1)\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + (2m+1)\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1})\end{aligned}$$

در نتیجه:

$$\langle \phi_{\cdot} | V_p | \phi_{\cdot} \rangle = \langle \phi_{\cdot} | V_p | \phi_{\cdot} \rangle = 2\lambda m w^r \left(\frac{\hbar}{2mw}\right)^{\frac{r}{2}} \left(\frac{\hbar}{2mw}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2\lambda m w^r \hbar^r}{4 m^r w^r} = \frac{2\lambda \hbar^r}{4 m}$$

پس:

$$V_p = \begin{pmatrix} \cdot & \frac{2\lambda \hbar^r}{4 m} \\ \frac{2\lambda \hbar^r}{4 m} & \cdot \end{pmatrix}$$

از قطری کردن این ماتریس نتیجه می‌شود که سطح انرژی مربوط به اولین حالت برانگیخته (با انرژی

$E_{fe} = \hbar w$) تا مرتبه‌ی اول اختلال به دو سطح $\hbar w \pm \frac{2\lambda \hbar^r}{4 m}$ گسسته می‌شود که ویژه حالت‌های

مربوط به آنها تا مرتبه‌ی صفرم $\frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_{\cdot} \pm \phi_{\cdot})$ می‌باشند.

حالت برانگیخته‌ی دوم، تبهگنی سه‌گانه دارد. چون $\phi_{\cdot}$ ، $\phi_{\cdot}$ و $\phi_{\cdot}$ ویژه حالت‌های مربوط به دومین

حالت برانگیخته (با انرژی $E_{se} = 2\hbar\omega$) هستند لذا تصحیح مرتبه‌ی اول انرژی مربوط به دومین حالت برانگیخته در واقع ویژه مقادیر مربوط به ماتریس زیر است:

$$V_p = \begin{pmatrix} \langle \phi_r | V_p | \phi_r \rangle & \langle \phi_r | V_p | \phi_1 \rangle & \langle \phi_r | V_p | \phi_{r.} \rangle \\ \langle \phi_1 | V_p | \phi_r \rangle & \langle \phi_1 | V_p | \phi_1 \rangle & \langle \phi_1 | V_p | \phi_{r.} \rangle \\ \langle \phi_{r.} | V_p | \phi_r \rangle & \langle \phi_{r.} | V_p | \phi_1 \rangle & \langle \phi_{r.} | V_p | \phi_{r.} \rangle \end{pmatrix}$$

حال به محاسبه‌ی عناصر این ماتریس می‌پردازیم:

$$\langle \phi_r | V_p | \phi_r \rangle = \frac{\lambda}{r} m \omega^r \left[\langle \phi_r | \hat{X}^r | \phi_r \rangle \langle \phi_r | \hat{Y} | \phi_r \rangle + \langle \phi_r | \hat{X} | \phi_r \rangle \langle \phi_r | \hat{Y}^r | \phi_r \rangle \right] = 0.$$

به همین ترتیب دو عنصر دیگر روی قطر اصلی نیز صفر می‌شوند.

$$\begin{aligned} \langle \phi_r | V_p | \phi_1 \rangle &= \langle \phi_1 | V_p | \phi_r \rangle = \frac{\lambda}{r} m \omega^r \left[\langle \phi_r | \hat{X}^r | \phi_1 \rangle \langle \phi_1 | \hat{Y} | \phi_r \rangle + \langle \phi_r | \hat{X} | \phi_1 \rangle \langle \phi_1 | \hat{Y}^r | \phi_r \rangle \right] \\ &= \frac{\lambda}{r} m \omega^r \left[\left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^{\frac{r}{2}} (r+1) \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{r} + \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^{\frac{r}{2}} (\sqrt{r} + \Delta\sqrt{r}) \right] \\ &= \frac{\lambda}{r} m \omega^r \frac{\hbar^r (9\sqrt{r})}{r m^r \omega^r} = \frac{9\sqrt{r} \lambda \hbar^r}{\lambda m} \end{aligned}$$

بنا به ملاحظات مربوط به پارите، دو عنصر $\langle \phi_r | V_p | \phi_{r.} \rangle$ و $\langle \phi_{r.} | V_p | \phi_r \rangle$ نیز صفر می‌شوند.

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 | V_p | \phi_{r.} \rangle &= \langle \phi_{r.} | V_p | \phi_1 \rangle = \frac{\lambda}{r} m \omega^r \left[\langle \phi_1 | \hat{X}^r | \phi_{r.} \rangle \langle \phi_{r.} | \hat{Y} | \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 | \hat{X} | \phi_{r.} \rangle \langle \phi_{r.} | \hat{Y}^r | \phi_1 \rangle \right] \\ &= \frac{\lambda}{r} m \omega^r \left[\left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^r (r\sqrt{r} + r\sqrt{r})(1) + \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^r \sqrt{r}(r) \right] = \frac{9\sqrt{r} \lambda \hbar^r}{\lambda m} \end{aligned}$$

پس:

$$V_p = \begin{pmatrix} 0 & \frac{9\sqrt{r} \lambda \hbar^r}{\lambda m} & 0 \\ \frac{9\sqrt{r} \lambda \hbar^r}{\lambda m} & 0 & \frac{9\sqrt{r} \lambda \hbar^r}{\lambda m} \\ 0 & \frac{9\sqrt{r} \lambda \hbar^r}{\lambda m} & 0 \end{pmatrix}$$

از قطری کردن این ماتریس نتیجه می‌شود که سطح انرژی مربوط به دومین حالت برانگیخته (با انرژی

$E_{se} = 2\hbar\omega$) تا مرتبه‌ی اول اختلال به سه سطح $2\hbar\omega$ و $\pm \frac{9\lambda\hbar^r}{r m}$ گسترده می‌شود که ویژه حالت‌های

مربوط به آنها تا مرتبه‌ی صفرم عبارت از $\frac{\phi_r \pm \sqrt{r}\phi_1 + \phi_{r.}}{r}$ و $\frac{\phi_r - \phi_{r.}}{\sqrt{r}}$ می‌باشند.

تمرین ۸-۹

ذره‌ای را در نظر بگیرید که دارای هامیلتونی $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hbar \omega (\hat{a}^\dagger + \hat{a})$ است که در آن $\hat{H}_0$ هامیلتونی یک نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی ساده است و $\hat{a}$ و $\hat{a}^\dagger$ عملگرهای فنا و خلق معمولی هستند که از رابطه‌ی $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ پیروی می‌کنند. λ یک عدد حقیقی بسیار کوچک است. (آ) انرژی حالت پایه را تا مرتبه‌ی دوم λ حساب کنید.

(ب) انرژی حالت برانگیخته‌ی n ام، E_n را تا مرتبه‌ی دوم λ و ویژه حالت $|\Psi_n\rangle$ را تا مرتبه‌ی اول λ بیابید.

حل:

در اینجا $|\phi_n\rangle$ ها همان ویژه حالت‌های نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی هستند و:

$$E_n^{(0)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

با توجه به این توضیحات کار را ادامه می‌دهیم:
در اینجا هامیلتونی اختلال عبارتست از:

$$\hat{H}_p = \lambda \hbar \omega (\hat{a}^\dagger + \hat{a})$$

پس:

$$\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_n \rangle = \lambda \hbar \omega (\sqrt{n} \sqrt{n-1} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \sqrt{n+2} \delta_{m,n+1})$$

(آ)

با استفاده از نظریه‌ی اختلال غیرتبهگن داریم:

$$E_{\cdot}^{(1)} = \langle \phi_{\cdot} | \hat{H}_p | \phi_{\cdot} \rangle = 0$$

$$E_{\cdot}^{(2)} = \sum_{m \neq \cdot} \frac{|\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_{\cdot} \rangle|^2}{E_{\cdot}^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|\langle \phi_{\cdot} | \hat{H}_p | \phi_{\cdot} \rangle|^2}{E_{\cdot}^{(0)} - E_{\cdot}^{(0)}} = \frac{(\lambda \hbar \omega \sqrt{2})^2}{-2 \hbar \omega} = \frac{2 \lambda^2 \hbar^2 \omega^2}{-2 \hbar \omega} = -\lambda^2 \hbar \omega$$

پس تا مرتبه‌ی دوم λ داریم:

$$E_{\cdot} = E_{\cdot}^{(0)} + E_{\cdot}^{(1)} + E_{\cdot}^{(2)} = \frac{\hbar \omega}{2} + 0 - \lambda^2 \hbar \omega = \frac{\hbar \omega}{2} (1 - 2\lambda^2)$$

(ب)

با استفاده از نظریه‌ی اختلال غیرتبهگن داریم:

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle = 0$$

$$\begin{aligned}
 E_n^{(r)} &= \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \phi_m | H_p | \phi_n \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{|\langle \phi_{n-r} | H_p | \phi_n \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_{n-r}^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_{n+r} | H_p | \phi_n \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_{n+r}^{(0)}} \\
 &= \frac{(\lambda \hbar \omega \sqrt{n} \sqrt{n-1})^2}{2 \hbar \omega} + \frac{(\lambda \hbar \omega \sqrt{n+1} \sqrt{n+2})^2}{-2 \hbar \omega} = \frac{\lambda^2 \hbar \omega n (n-1)}{2} - \frac{\lambda^2 \hbar \omega (n+1)(n+2)}{2} \\
 &= \frac{\lambda^2 \hbar \omega}{2} (n^2 - n - n^2 - 2n - 2) = -\lambda^2 \hbar \omega (2n+1)
 \end{aligned}$$

پس تا مرتبه دوم λ داریم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) + 0 - \lambda^2 \hbar \omega (2n+1) = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) (1 - 2\lambda^2)$$

اما ویژه توابع تصحیح شده تا مرتبه اول λ عبارتند از:

$$|\psi_n\rangle = |\phi_n\rangle + |\psi_n^{(1)}\rangle$$

به طوری که:

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \phi_m | \hat{H}_p | \phi_n \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |\phi_m\rangle$$

پس:

$$\begin{aligned}
 |\psi_n^{(1)}\rangle &= \frac{\langle \phi_{n-r} | H_p | \phi_n \rangle}{E_n^{(0)} - E_{n-r}^{(0)}} |\phi_{n-r}\rangle + \frac{\langle \phi_{n+r} | H_p | \phi_n \rangle}{E_n^{(0)} - E_{n+r}^{(0)}} |\phi_{n+r}\rangle \\
 &= \frac{\lambda \hbar \omega \sqrt{n} \sqrt{n-1} |\phi_{n-r}\rangle}{2 \hbar \omega} + \frac{\lambda \hbar \omega \sqrt{n+1} \sqrt{n+2} |\phi_{n+r}\rangle}{-2 \hbar \omega} \\
 &= \frac{\lambda}{2} (\sqrt{n} \sqrt{n-1} |\phi_{n-r}\rangle - \sqrt{n+1} \sqrt{n+2} |\phi_{n+r}\rangle)
 \end{aligned}$$

تمرین ۹-۹

دو ذره یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ را در نظر بگیرید که در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ سه بعدی همسانگرد و با بسامد ω محدود هستند.

(آ) انرژی حالت پایه و تابع موج متناظر سیستم را وقتی که دو ذره برهم کنش ندارند بیابید.

(ب) اکنون فرض کنید که یک پتانسیل وابسته با جاذبهی ضعیف میان دو ذره وجود دارد، $V(r_1, r_2) = -kr_1 r_2 - \lambda \hat{S}_{1z} \hat{S}_{2z}$ که در آن k و λ دو عدد حقیقی مثبت کوچک هستند. حالت پایه را

نا اختلال مستقل از زمان مرتبه‌ی اول بیابید.

(ب) با استفاده از روش وردشی انرژی حالت پایه‌ی این سیستم دو ذره‌ای غیربرهم‌کنشی اسپین $\frac{1}{2}$ را تخمین بزنید که در یک نوسانگر هماهنگ سه بعدی همسانگرد محدود شده‌اند. چگونه نتایج شما با نتایج به‌دست آمده در (آ) مقایسه می‌شود؟

حل:
(آ)

بنا به اصل طرد پائولی، ویژه تابع مربوط به حالت پایه‌ی این سیستم عبارتست از:

$$\phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{S}_1, \vec{S}_2) = \psi \dots (r_1, \theta_1, \varphi_1) \psi \dots (r_2, \theta_2, \varphi_2) \chi_{\text{مفرد}}$$

که $\psi \dots (r, \theta, \varphi)$ ویژه تابع حالت پایه‌ی تک ذره‌ای است که تحت تأثیر پتانسیل نوسانگر هماهنگ کروی قرار دارد که با رابطه‌ی (۶-۱۰۳) داده می‌شود و انرژی آن نیز از رابطه‌ی (۶-۱۰۰) به‌دست می‌آید و مفرد χ نیز حالت اسپینی یگانه است که:

$$\chi_{\text{مفرد}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{vmatrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \end{vmatrix} \right]$$

با توجه به این توضیحات انرژی حالت پایه‌ی این سیستم دو ذره‌ای عبارتست از:

$$E_{\cdot}^{(0)} = \hbar \omega \left(0 + \frac{3}{2} \right) + \hbar \omega \left(0 + \frac{3}{2} \right) = 3\hbar \omega$$

(ب)

بنا به نظریه‌ی اختلال غیرتبهگن داریم:

$$E_{\cdot}^{(1)} = \langle \phi_{\cdot} | V(r_1, r_2) | \phi_{\cdot} \rangle$$

پس:

$$E_{\cdot}^{(1)} = -k \langle \psi \dots | r | \psi \dots \rangle \langle \psi \dots | r | \psi \dots \rangle - \lambda \langle \phi_{\cdot} | \hat{S}_{1z} \hat{S}_{2z} | \phi_{\cdot} \rangle$$

اما:

$$\langle \phi_{\cdot} | \hat{S}_{1z} \hat{S}_{2z} | \phi_{\cdot} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \langle \phi_{\cdot} | \phi_{\cdot} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4}$$

زیرا:

$$\hat{S}_{1z} \hat{S}_{2z} | \chi_{\text{مفرد}} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[S_{1z} \begin{vmatrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \end{vmatrix} S_{2z} \begin{vmatrix} \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \end{vmatrix} - S_{1z} \begin{vmatrix} \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \end{vmatrix} S_{2z} \begin{vmatrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \end{vmatrix} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{r}} \left[\frac{\hbar}{r} \left| \frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right\rangle \left(\frac{-\hbar}{r} \left| \frac{1}{r}, \frac{-1}{r} \right\rangle - \frac{\hbar}{r} \left| \frac{1}{r}, \frac{-1}{r} \right\rangle \frac{\hbar}{r} \left| \frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right\rangle \right] \right. \\
&= -\frac{\hbar^2}{r} \frac{1}{\sqrt{r}} \left[\left| \frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right\rangle \left| \frac{1}{r}, \frac{-1}{r} \right\rangle - \left| \frac{1}{r}, \frac{-1}{r} \right\rangle \left| \frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right\rangle \right] = -\frac{\hbar^2}{r} \chi_{\text{منفرد}}
\end{aligned}$$

با استفاده از رابطه‌ی (۶-۱۰۳) نیز داریم:

$$\langle \psi \dots | r | \psi \dots \rangle = \left[\frac{r}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^{\frac{r}{2}} \right]^r \int_0^\infty e^{-\frac{mwr^2}{\hbar}} r^r dr = \frac{r}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^{\frac{r}{2}} \frac{1}{r \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^r} = \frac{r}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\hbar}{mw} \right)^{\frac{1}{2}}$$

در نتیجه:

$$E_{\cdot}^{(1)} = -k \left[\frac{r}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\hbar}{mw} \right)^{\frac{1}{2}} \right]^r + \frac{\lambda \hbar^2}{r} = -\frac{rk\hbar}{\pi mw} + \frac{\lambda \hbar^2}{r}$$

(ب)

برای این منظور (استفاده از روش وردشی) از تابع آزمون $\chi = A e^{-\alpha(r_1+r_2)}$ یگانه

استفاده می‌کنیم و مقدار چشمداشتی عملگر هامیلتونی $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_2^2 + \frac{1}{r} m w^r r_1^r + \frac{1}{r} m w^r r_2^r$ را با استفاده از ψ می‌یابیم. پیش از ادامه‌ی کار ابتدا ψ را بهنجار می‌کنیم:

$$1 = \langle \psi | \psi \rangle = |A|^r \left(\pi \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r_1} r_1^r dr_1 \right) \left(\pi \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r_2} r_2^r dr_2 \right) = |A|^r \frac{\pi}{\alpha^r} \frac{\pi}{\alpha^r} = \frac{|A|^r \pi^r}{(\alpha^r)^r}$$

پس:

$$|A|^r = \left(\frac{\alpha^r}{\pi} \right)^r = \frac{\alpha^r}{\pi^r}$$

لذا:

$$\begin{aligned}
\langle \psi | H | \psi \rangle &= r |A|^r \int_W e^{-\alpha r_1} dv_1 \int_W e^{-\alpha r_2} \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 + \frac{1}{r} m w^r r_1^r \right) e^{-\alpha r_2} dv_2 \\
&= \frac{r \alpha^r}{\pi^r} \left(\frac{\pi}{\alpha^r} \left[\left(\frac{1}{r} m w^r \right) \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r_1} \pi r_1^r dr_1 + \frac{\hbar^2}{2m} \int \vec{\nabla}_1 \left[e^{-\alpha r_1} \right]^* \cdot \vec{\nabla}_1 \left(e^{-\alpha r_1} \right) dv_1 \right] \right)
\end{aligned}$$

$$= \frac{2\alpha^2}{\pi} \left(\frac{1}{2} m w^2 \frac{4\pi \times 2}{\alpha^5} + \frac{\hbar^2 \alpha^2 \times 4\pi}{2m} \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r_1} r_1^2 dr_1 \right) = \frac{2\alpha^2}{\pi} \left(\frac{6\pi m w^2}{\alpha^5} + \frac{2\pi \hbar^2 \alpha^2}{m} \frac{1}{\alpha^2} \right)$$

$$= \frac{12 m w^2}{\alpha^2} + \frac{4 \hbar^2 \alpha^2}{m}$$

منظور از W در $\int_W$ ، تمام فضا می‌باشد.

مقدار مینیم $\langle \psi | H | \psi \rangle$ به ازای $\alpha = \left(\frac{\sqrt{3} m w}{\hbar} \right)^{\frac{1}{2}}$ اتفاق می‌افتد و برابر با $\hbar w \sqrt{3}$ می‌باشد. بنابراین حد بالای انرژی حالت پایه، $\hbar w \sqrt{3}$ می‌باشد، درحالی‌که مقدار دقیق انرژی حالت پایه $\frac{2}{3} \hbar w$ می‌باشد. واضح است که اگر برای تابع آزمون انتخابی خود برحسب اتفاق از ویژه تابع دقیق حالت پایه استفاده می‌کردیم دقیقاً به همان مقدار $\frac{2}{3} \hbar w$ می‌رسیدیم.

تمرین ۹-۱۰

دو ذره‌ی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ در یک جعبه‌ی پتانسیل یک‌بعدی به اندازه‌ی L با دیواره‌هایی در $x=0$ و $x=L$ محدود هستند.

(آ) انرژی حالت پایه و انرژی اولین حالت برانگیخته و توابع موج مربوط به آن‌ها را برای این سیستم هنگامی که دو ذره برهم‌کنش ندارند بیابید.

(ب) اکنون فرض کنید که یک پتانسیل با جاذبه‌ی ضعیف میان دو ذره وجود دارد:

$$V_p(x) = \begin{cases} -V_0 & 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \frac{L}{2} \leq x \leq L \end{cases}$$

انرژی حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته را تا اختلال مرتبه‌ی اول بیابید.

(پ) مقادیر عددی را برای انرژی‌های حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته در (آ) برای حالتی که در آن $L = 10^{-10} \text{ m}$ و $V_0 = 2 \text{ eV}$ و جرم هر تک ذره برابر با جرم الکترون در نظر گرفته می‌شود پیدا کنید. اندازه‌های تصحیح‌های انرژی مرتبه‌ی اول را با انرژی حالت پایه و انرژی اولین حالت برانگیخته مقایسه کنید (به سادگی می‌توانید نسبت‌های میان تصحیح‌های مرتبه‌ی اول را با انرژی‌های حالت پایه و اولین حالت برانگیخته محاسبه کنید).

حل:

(آ)

بنابر اصل طرد پائولی تابع موج یک سیستم متشکل از فرمیون‌ها باید تحت جابه‌جایی ذرات پاد متقارن باشد. بنابراین حالت پایه‌ی این سیستم فاقد تبهگنی و ویژه تابع و انرژی متناظر آن عبارتند از:

$$E^{(.)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (1^2 + 1^2) = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}$$

$$\phi(x_1, x_2, S_1, S_2) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \chi_{\text{یگانه}}$$

خواننده حتماً می‌داند که $\chi_{\text{یگانه}}$ تحت جابه‌جایی ذرات پاد متقارن است. زیرا:

$$\chi_{\text{یگانه}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \right]$$

$$E_1^{(.)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (1^2 + 2^2)$$

اما در اولین حالت برانگیخته، تبهگنی چهارگانه وجود دارد و انرژی سیستم

$$\left(\sqrt{\frac{2}{L}} \right)^2 \left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) + \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) \right] \chi_{\text{یگانه}}$$

و

$$\left(\sqrt{\frac{2}{L}} \right)^2 \left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_1}{L}\right) - \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) \right] \chi_{\text{سه‌گانه}}$$

می‌باشند.

(ب)

تمرین ۹-۱۱

یک نوسانگر هماهنگ همسانگرد را در نظر بگیرید.

(آ) انرژی اولین حالت برانگیخته و حالت‌های مختلف متناظر با این انرژی را بیابید.

(ب) اکنون اگر این نوسانگر را تحت تأثیر اختلال $\hat{V}_p(x, y) = -\lambda \hat{x} \hat{y}$ قرار دهیم که در آن λ یک

عدد حقیقی کوچک است، انرژی نخستین حالت برانگیخته را تا اختلال مستقل از زمان مرتبه‌ی اول

تبهگن پیدا کنید. (راهنمایی: می‌توانید از $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_x + \hat{a}_x^\dagger)$ ، $\hat{y} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_y + \hat{a}_y^\dagger)$ استفاده کنید.)

$$\hat{z} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_z + \hat{a}_z^\dagger) \quad \text{با} \quad \hat{a}_x |n_x\rangle = \sqrt{n_x} |n_x - 1\rangle \quad \text{و} \quad \hat{a}_x^\dagger |n_x\rangle = \sqrt{n_x + 1} |n_x + 1\rangle \quad \text{استفاده کنید.}$$

حل:
(ا)

انرژی و ویژه حالت‌های این سیستم به‌طور کلی عبارتند از:

$$E_{n_x n_y n_z} = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$$

$$\phi_{n_x n_y n_z} = |n_x\rangle |n_y\rangle |n_z\rangle$$

اولین حالت برانگیخته دارای تبهگنی سه‌گانه است و ویژه حالت‌های آن عبارتند از $\phi_{1..}$ ، $\phi_{.1.}$ و $\phi_{..1}$.

و انرژی مربوطه آن نیز $E_1^{(0)} = \frac{5}{2} \hbar \omega$ می‌باشد که به‌ازای $n_x + n_y + n_z = 1$ به‌دست می‌آید.

یعنی:

$$n_x = 1, n_y = n_z = 0 \quad \text{یا} \quad n_x = n_z = 0, n_y = 1 \quad \text{یا} \quad n_z = 1, n_x = n_y = 0.$$

(ب)

چون تبهگنی داریم، تصحیح مرتبه‌ی اول انرژی در واقع همان ویژه مقادیر عملگر V_p است که در زیرفضای ویژه حالت‌های مربوط به اولین حالت برانگیخته نوشته شده است؛ یعنی از قطری کردن ماتریس زیر تصحیح مرتبه‌ی اول انرژی حاصل می‌شود:

$$V_p = \begin{pmatrix} \langle \phi_{1..} | V_p | \phi_{1..} \rangle & \langle \phi_{1..} | V_p | \phi_{.1.} \rangle & \langle \phi_{1..} | V_p | \phi_{..1} \rangle \\ \langle \phi_{.1.} | V_p | \phi_{1..} \rangle & \langle \phi_{.1.} | V_p | \phi_{.1.} \rangle & \langle \phi_{.1.} | V_p | \phi_{..1} \rangle \\ \langle \phi_{..1} | V_p | \phi_{1..} \rangle & \langle \phi_{..1} | V_p | \phi_{.1.} \rangle & \langle \phi_{..1} | V_p | \phi_{..1} \rangle \end{pmatrix}$$

اما:

$$\langle \phi_{1..} | V_p | \phi_{1..} \rangle = \langle \phi_{1..} | -\lambda \hat{x} \hat{y} | \phi_{1..} \rangle = -\lambda \langle 1 | \hat{x} | 1 \rangle \langle 0 | \hat{y} | 0 \rangle \langle 0 | 0 \rangle = -\lambda \times 0 \times 0 \times 1 = 0.$$

$$\langle \phi_{1..} | V_p | \phi_{.1.} \rangle = \langle \phi_{.1.} | V_p | \phi_{1..} \rangle = -\lambda \langle 1 | \hat{x} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{y} | 1 \rangle \langle 0 | 0 \rangle = -\lambda \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \right) \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \right) (1) = \frac{-\lambda \hbar}{2m\omega}$$

$$\langle \phi_{1..} | V_p | \phi_{..1} \rangle = \langle \phi_{..1} | V_p | \phi_{1..} \rangle = -\lambda \langle 1 | \hat{x} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{y} | 0 \rangle \langle 0 | 1 \rangle = -\lambda \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \right) (0) (0) = 0.$$

$$\langle \phi_{.1.} | V_p | \phi_{.1.} \rangle = -\lambda \langle 0 | \hat{x} | 0 \rangle \langle 1 | \hat{y} | 1 \rangle \langle 0 | 0 \rangle = -\lambda (0) (0) (1) = 0.$$

$$\langle \phi_{.1.} | V_p | \phi_{..1} \rangle = \langle \phi_{..1} | V_p | \phi_{.1.} \rangle = -\lambda \langle 0 | \hat{x} | 0 \rangle \langle 1 | \hat{y} | 0 \rangle \langle 0 | 1 \rangle = -\lambda (0) \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \right) (0) = 0.$$

$$\langle \phi_{..1} | V_p | \phi_{..1} \rangle = -\lambda \langle \phi_{..1} | \hat{x} | \phi_{..1} \rangle \langle \phi_{..1} | \hat{y} | \phi_{..1} \rangle \langle 1 | 1 \rangle = -\lambda (\cdot) (\cdot) (1) = 0.$$

پس:

$$V_p = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-\lambda \hbar}{2mw} & 0 \\ \frac{-\lambda \hbar}{2mw} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

از قطری کردن این ماتریس نتیجه می‌شود که ویژه مقادیر آن عبارت از ۰ و $\pm \frac{\lambda \hbar}{2mw}$ می‌باشند. بنابراین سطح انرژی اولین حالت برانگیخته تا مرتبه‌ی اول به سه سطح با انرژی‌های:

$$\frac{3}{2} \hbar w$$

و

$$\frac{3}{2} \hbar w \pm \frac{\lambda \hbar}{2mw}$$

تجزیه می‌شود.

تمرین ۹-۱۲

با استفاده از روش وردشی انرژی حالت پایه‌ی نوسانگر هماهنگ کروی را به وسیله‌ی توابع آزمون شعاعی زیر تخمین بزنید:

$$R(r) = A e^{-\alpha r^2} \quad (\bar{A})$$

(ب) $R(r) = A e^{-\alpha r}$ که در آن‌ها A ثابت بهنجارش است که باید در هر حالت محاسبه شود و α یک پارامتر قابل تنظیم است.

(پ) با استفاده از این واقعیت که انرژی دقیق حالت پایه $E^{\text{exact}} = \frac{3\hbar\omega}{2}$ می‌باشد، خطاهای نسبی متناظر با انرژی‌های به‌دست آمده در (آ) و (ب) را بیابید.

حل:
(آ)

از شرط بهنجارش نتیجه می‌شود که:

$$1 = \langle R | R \rangle = \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi A^* e^{-\alpha r} A e^{-\alpha r} r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi |A|^2 \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} r^2 dr$$

$$= 4\pi |A|^2 \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}} = |A|^2 \left(\frac{\pi}{\alpha} \right)^{\frac{3}{2}}$$

در نتیجه:

$$|A|^2 = \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}}$$

پس:

$$\langle R | \hat{H} | R \rangle = \langle R | -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 | R \rangle = \langle R | -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 | R \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 (4\pi) |A|^2 \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} r^4 dr$$

اما:

$$\langle R | -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 | R \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int \vec{\nabla} [R^*(\vec{r})] \cdot \vec{\nabla} (R(\vec{r})) d^3r = \frac{\hbar^2}{2m} |A|^2 \int_0^{+\infty} \left(-2\alpha r e^{-2\alpha r} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{4\hbar^2 |A|^2 \pi \alpha^2}{m} \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} r^4 dr$$

پس:

$$\langle \hat{H} \rangle_R = \langle R | \hat{H} | R \rangle = \left(\frac{4\hbar^2 |A|^2 \pi \alpha^2}{m} + 2\pi m \omega^2 |A|^2 \right) \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha r} r^4 dr$$

$$= 4\pi |A|^2 \left(\frac{\hbar^2 \alpha^2}{m} + m \omega^2 \right) \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}} = \frac{2}{\pi^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{4\hbar^2 \alpha^2}{m} + m \omega^2 \right)$$

$$= \frac{2}{\pi^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{4\hbar^2 \alpha^2}{m} + \frac{m \omega^2}{\alpha} \right)$$

اما کمترین مقدار $\langle \hat{H} \rangle_R$ به‌ازای $\alpha = \frac{m \omega}{2\hbar}$ اتفاق می‌افتد که به‌ازای این مقدار از α نتیجه می‌شود که:

$$\langle H \rangle_R \Big|_{\alpha = \frac{m \omega}{2\hbar}} = \frac{2}{\pi^{\frac{3}{2}}} \left(\frac{4\hbar^2}{m} \frac{m \omega}{2\hbar} + m \omega^2 \left(\frac{2\hbar}{m \omega} \right) \right) = \frac{2}{\pi^{\frac{3}{2}}} (\hbar \omega + \hbar \omega) = \frac{4}{\pi^{\frac{3}{2}}} \hbar \omega = \frac{2}{\pi^{\frac{3}{2}}} \hbar \omega$$

این مقدار دقیقاً برابر با انرژی حالت پایه نوسانگر هماهنگ کروی است.
(ب)

از شرط بهنجارش نتیجه می شود که:

$$1 = \langle R | R \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |A|^2 e^{-\alpha r} r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha r} r^2 dr = \frac{4\pi |A|^2}{\alpha^3} = \frac{\pi |A|^2}{\alpha^3}$$

در نتیجه:

$$|A|^2 = \frac{\alpha^3}{\pi}$$

پس:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle_R &= \langle R | \hat{H} | R \rangle = \langle R | -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 | R \rangle = \langle R | -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 | R \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle R | r^2 | R \rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_W \nabla \left(R^*(r) \right) \cdot \nabla \left(R(r) \right) d^3r + \frac{1}{2} m \omega^2 |A|^2 (4\pi) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha r} r^4 dr \\ &= \frac{\hbar^2 |A|^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-\alpha e^{-\alpha r} \right)^2 4\pi r^3 dr + 2\pi m \omega^2 |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha r} r^4 dr \\ &= \frac{4\pi \hbar^2 |A|^2 \alpha^2}{m} \frac{1}{4\alpha^3} + 2\pi m \omega^2 |A|^2 \frac{3}{4\alpha^4} = \frac{\alpha^2 4\pi \hbar^2 \alpha^2}{m 4\alpha^3} + \frac{2\pi m \omega^2 \alpha^2}{4\alpha^4} \frac{\alpha^3}{\pi} \\ &= \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} + \frac{3m\omega^2}{4\alpha^2} \end{aligned}$$

منظور از W در $\int_W$ ، تمام فضا می باشد.

کمترین مقدار $\langle H \rangle_R$ به ازای $\alpha = \left(\frac{3m\omega^2}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}}$ اتفاق می افتد و به ازای این مقدار داریم:

$$\langle H \rangle_R |_{\alpha=\alpha_0} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3m\omega^2}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}} + \frac{3m\omega^2}{4} \left(\frac{\hbar^2}{3m\omega^2} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar \omega + \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar \omega = \sqrt{3} \hbar \omega$$

پس:

$$E_{\text{vib}}^m = \sqrt{3} \hbar \omega$$

(ب)

در حالت (آ) داریم:

$$\text{خطای نسبی} = \left| \frac{E_{\text{exact}} - E_{\text{VM}}}{E_{\text{exact}}} \right| = \frac{\frac{3}{2} \hbar \omega - \frac{3}{2} \hbar \omega}{\frac{3}{2} \hbar \omega} = 0.$$

در حالت (ب) داریم:

$$\text{خطای نسبی} = \left| \frac{E_{\text{exact}} - E_{\text{VM}}}{E_{\text{exact}}} \right| = \frac{\frac{3}{2} \hbar \omega - \sqrt{2} \hbar \omega}{\frac{3}{2} \hbar \omega} = \frac{2\sqrt{2}}{3} - 1 = \frac{2 \times 1.41}{3} - 1 = 0.13$$

تمرین ۹-۱۳

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که به‌طور عمودی و کشسان بر روی یک سطح بازتابنده‌ی هموار در میدان گرانشی زمین

$$V(z) = \begin{cases} mgz & z > 0 \\ \infty & z \leq 0 \end{cases}$$

می‌افتد که در آن g یک ثابت (شتاب گرانش) است. با استفاده از روش وردشی انرژی حالت پایه‌ی این ذره را به‌وسیله‌ی تابع موج آزمون $\Psi(z) = ze^{-\alpha z}$ تخمین بزنید، که α یک پارامتر قابل تنظیم

است و باید تعیین شود. نتیجه‌ی خود را با مقدار دقیق $E_{\text{exact}} = 2/3 \sqrt{mg^2 \hbar^2}$ مقایسه کنید.

حل:

از روش وردشی، حد بالای انرژی حالت پایه عبارتست از:

$$E_{\text{VM}} = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

حال به محاسبه‌ی $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ و $\langle \psi | \psi \rangle$ می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} z \exp(-\alpha z) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dz^2} + mgz \right) z \exp(-\alpha z) dz \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} z \exp(-\alpha z) (-2\alpha z + \alpha^2 z^2) \exp(-\alpha z) dz + mg \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \exp(-\alpha z) dz \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} -2\alpha z^2 \exp(-\alpha z) dz + \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha^2 z^3 \exp(-\alpha z) dz \right] + mg \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \exp(-\alpha z) dz \end{aligned}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \left[-2\alpha \int_0^{+\infty} u^{\frac{r}{2}} \exp(-2\alpha u^r) \frac{du}{r} + 16\alpha^2 \int_0^{+\infty} u^{\frac{v}{2}} \exp(-2\alpha u^r) \frac{du}{r} \right] + mg \left[\frac{-1}{\lambda\alpha} \exp(-2\alpha z^r) \right]_0^{+\infty}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \left[-1\alpha \left(\frac{\Gamma\left(\frac{\delta}{r}\right)}{r(2\alpha)^{\frac{\delta}{r}} \right)} + \lambda\alpha^2 \left(\frac{\Gamma\left(\frac{q}{r}\right)}{r(2\alpha)^{\frac{q}{r}} \right)} \right] + \frac{mg}{\lambda\alpha} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{-\delta\Gamma\left(\frac{\delta}{r}\right)}{\alpha^{\frac{1}{r}} 2^{\frac{\delta}{r}} r^{\frac{\delta}{r}}} + \frac{q\Gamma\left(\frac{q}{r}\right)}{\alpha^{\frac{1}{r}} 2^{\frac{q}{r}} r^{\frac{q}{r}}} \right] + \frac{mg}{\lambda\alpha}$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_0^{+\infty} z^r \exp(-2\alpha z^r) dz = \int_0^{+\infty} u^{\frac{1}{r}} \exp(-2\alpha u^r) \frac{du}{r} = \frac{1}{r} \frac{\Gamma\left(\frac{r}{r}\right)}{2^{\frac{1}{r}} (2\alpha)^{\frac{r}{r}}}$$

در محاسبات فوق از تغییر متغیر $u = z^r$ و رابطه‌ی $\int_0^{+\infty} u^m e^{-\alpha u^r} du = \frac{\Gamma\left[\frac{m+1}{r}\right]}{r\alpha^{\left(\frac{m+1}{r}\right)}}$ استفاده شده

است.

پس:

$$E_{\cdot}^{VM} = \frac{\delta \hbar^2 \Gamma\left(\frac{1}{r}\right) \alpha^{\frac{1}{r}}}{r^{\frac{\delta}{r}} m \Gamma\left(\frac{r}{r}\right)} + \frac{mg}{r^{\frac{1}{r}} \Gamma\left(\frac{r}{r}\right) \alpha^{\frac{1}{r}}}$$

کمترین مقدار $E_{\cdot}^{VM}$ به‌ازای $\alpha = \left[\frac{r^{\frac{\delta}{r}} m^r g}{\delta \hbar^2 \Gamma\left(\frac{1}{r}\right)} \right]^{\frac{r}{r}}$ اتفاق می‌افتد و به‌ازای این مقدار داریم:

$$E_{\cdot}^{VM}(\alpha) = \frac{r}{\Gamma\left(\frac{r}{r}\right)} \left(\frac{\delta \hbar^2 m g^r}{r^{\delta}} \right)^{\frac{1}{r}}$$

تمرین ۹-۱۴

انرژی حالت پایه را برای ذره‌ای که در حال حرکت در یک جعبه‌ی پتانسیل یک بُعدی به طول L با دیواره‌هایی در $x=0$ و $x=L$ است تا مرتبه‌ی اول اختلال، هنگامی که پتانسیل ضعیف $\hat{H}_p = \lambda x^r$ افزوده شود حساب کنید که در آن $\lambda \ll 1$ است.

حل:

در اینجا داریم:

$$E_1^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}, \quad |\phi_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

طبق نظریه اختلال غیرتبهگن (چون ϕ_1 فاقد تبهگنی است) انرژی حالت پایه تا مرتبه اول λ عبارتست از:

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)}$$

به‌طوری‌که:

$$E_1^{(1)} = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle$$

پس:

$$E_1^{(1)} = \int_0^L \lambda x^2 \left(\sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \right)^2 dx = \frac{2\lambda}{L} \int_0^L x^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{\lambda}{L} \int_0^L x^2 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right) dx$$

اما استفاده‌ی مکرر از روش انتگرال‌گیری جزء به جزء نتیجه می‌دهد:

$$\int x^2 \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx = \frac{Lx^2}{2\pi} \sin\frac{2\pi x}{L} + \frac{L^2}{2\pi^2} x \cos\frac{2\pi x}{L} - \frac{L^3}{4\pi^2} \sin\frac{2\pi x}{L}$$

پس:

$$E_1^{(1)} = \frac{\lambda}{L} \left(\frac{L^3}{3} - \frac{L^3}{2\pi^2} L \cos 2\pi \right) = \lambda \left(\frac{L^2}{3} - \frac{L^2}{2\pi^2} \right) = \lambda L^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right) = \lambda L^2 \left(\frac{2\pi^2 - 3}{6\pi^2} \right)$$

و:

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} + \lambda L^2 \left(\frac{2\pi^2 - 3}{6\pi^2} \right)$$

تمرین ۹-۱۵

یک سیستم نیمه کلاسیکی را در نظر بگیرید که انرژی آن با:

$$E = a^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{4} - a^2 \right) p^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{4a^2}{\frac{b^2}{4} - a^2} \right) q^2$$

داده می‌شود و در آن a و b ثابت‌هایی حقیقی و مثبت هستند. با استفاده از قاعده‌ی کوانتس بور-

سامرفلد عبارت انرژی حالت مقید E_n را برای حالت برانگیخته n م بر حسب a به دست آورید.

حل:

ابتدا نقاط بازگشت q را از رابطه $P(q) = 0$ می یابیم. پس:

$$E = a^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{4a^2}{\frac{b^2}{4} - a^2} \right) q^2$$

که نتیجه می دهد:

$$q_{\pm} = \pm \frac{\sqrt{(E - a^2)(\frac{b^2}{4} - 4a^2)}}{a\sqrt{\lambda}}$$

از قاعده ی کوانتش ویلسون - سامرفلد داریم:

$$\oint P_q(q, E_n) dq = 2 \int_{q_1}^{q_2} P_q dq = nh$$

که در این رابطه، q_1 و q_2 نقاط بازگشتی، q مختصه تعمیم یافته و P_q تکانه تعمیم یافته ی متناظر با q می باشد. پس:

$$q_1 = -\frac{\sqrt{(E - a^2)(\frac{b^2}{4} - 4a^2)}}{a\sqrt{\lambda}}, \quad q_2 = \frac{\sqrt{(E - a^2)(\frac{b^2}{4} - 4a^2)}}{a\sqrt{\lambda}}$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} nh &= 2 \int_{q_1}^{q_2} \frac{E_n - a^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{4a^2}{\frac{b^2}{4} - a^2} \right) q^2}{\frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{4} - a^2 \right)} dq = \frac{2(E_n - a^2)}{\frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{4} - a^2 \right)} \int_{q_1}^{q_2} \sqrt{1 - \frac{4a^2 q^2}{E_n - a^2}} dq \\ &= \frac{2(E_n - a^2)}{\frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{4} - a^2 \right)} \frac{2}{\sqrt{1 - \frac{4a^2}{E_n - a^2}}} \left\{ \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{4a^2}{E_n - a^2}} q \right) + \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{4a^2}{E_n - a^2}} q \right) \right\} \Bigg|_{q_1}^{q_2} \end{aligned}$$

$$= \frac{|E_n - a^r|}{\sqrt{a^r \left(\frac{b^r}{r} - a^r \right)}} \left[r \sin^{-1} \left| \left(\frac{b^r}{r} - a^r \right)^{\frac{1}{r}} \right| + \frac{r \sqrt{r} a \sqrt{E_n - r a^r}}{|E_n - a^r|} \right]$$

تمرین ۹-۱۶

با استفاده از روش وردشی، انرژی حالت پایه ذره‌ای به جرم m را تخمین بزنید که در حال حرکت در یک پتانسیل یک بعدی $V(x) = V_0 x^r$ است. می‌توانید از تابع آزمون $\Psi(x, \alpha) = A e^{-\alpha x^r/r}$ استفاده کنید که در آن A ثابت بهنجارش و α یک پارامتر قابل تنظیم است که باید تعیین شود.

حل:

در روش وردشی داریم:

$$E_{VM} = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$$

که $\hat{H}$ عملگر هامیلتونی است و در اینجا داریم:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^r}{2m} \frac{d^r}{dx^r} + V_0 x^r$$

چون:

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^r dx = |A|^r \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^r} dx = |A|^r \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (*)$$

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) \hat{H} \Psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} A^* e^{-\frac{\alpha x^r}{r}} \left(-\frac{\hbar}{2m} \frac{d^r}{dx^r} + V_0 x^r \right) A e^{-\frac{\alpha x^r}{r}} dx \\ &= |A|^r \left[\int_{-\infty}^{+\infty} V_0 x^r e^{-\alpha x^r} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hbar^r}{2m} \alpha (1 - \alpha x^r) e^{-\alpha x^r} dx \right] \end{aligned}$$

از طرفی با یک و دو بار مشتق گرفتن از رابطه‌ی * نسبت به α داریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^r} x^r dx = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^r}}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^r} x^r dx = \frac{r}{r} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^r}}$$

در نتیجه:

$$E_{VM} = \frac{V_0 \left(\frac{r}{r} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^r}} \right) + \frac{\hbar^r \alpha}{2m} \left[\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} - \alpha \left(\frac{1}{r} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^r}} \right) \right]}{\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}} = \frac{r V_0}{r \alpha^r} + \frac{\hbar^r \alpha}{2m}$$

حال E^{VM} را کمینه می‌کنیم. از برابر صفر قرار دادن $\frac{dE^{VM}}{d\alpha}$ نتیجه می‌شود که:

$$\alpha = \left(\frac{\epsilon m V_0}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

و داریم:

$$E^{VM}(\alpha) = \frac{3V_0}{4} \left(\frac{\hbar^2}{\epsilon m V_0} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\hbar^2}{4m} \left(\frac{\epsilon m V_0}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{81\hbar^2 V_0}{256m^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

و در واقع مقدار به دست آمده، حد بالایی برای انرژی حالت پایه است.

تمرین ۹-۱۷

ذره‌ای به جرم m را در نظر بگیرید که در یک پتانسیل یک‌بعدی $V(x) = V_0 x^2$ در حرکت است. انرژی حالت پایه‌ی این ذره را به روش WKB تخمین بزنید.

حل:

در اینجا داریم:

$$E = \frac{p^2}{2m} + V_0 x^2$$

نقاط بازگشت x نقاطی هستند که در رابطه‌ی $p=0$ و $E = V(x)$ صدق می‌نمایند، پس:

$$x_{1,2} = \pm \left(\frac{E}{V_0} \right)^{\frac{1}{2}}$$

در تقریب WKB داریم:

$$\oint p dx = 2 \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(E_n - V(x))} dx = \left(n + \frac{1}{2} \right) h$$

که x_1 و x_2 نقاط بازگشت هستند؛ پس:

$$2 \int_{-\left(\frac{E_n}{V_0}\right)^{\frac{1}{2}}}^{\left(\frac{E_n}{V_0}\right)^{\frac{1}{2}}} \sqrt{2m(E_n - V_0 x^2)} dx = \left(n + \frac{1}{2} \right) h \quad ; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

پس:

$$\sqrt[4]{2mV} \int_0^{\left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{1}{4}}} \sqrt{\left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{1}{4}} - x} dx = \left(n + \frac{1}{2}\right)h$$

اما از فرمول کلی:

$$\int_0^a x^{\frac{1}{2}} (a^{n'} - x^{n'})^p dx = \frac{a^{m+1+n'p} \Gamma\left(\frac{m+1}{n'}\right) \Gamma(p+1)}{n' \Gamma\left(\frac{m+1}{n'} + p+1\right)}$$

بدازای $a = \left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{1}{4}}$ ، $m=0$ ، $n'=4$ و $p = \frac{1}{2}$ نتیجه می‌شود:

$$\int_0^{\left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{1}{4}}} \sqrt{\left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{1}{4}} - x} dx = \left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{3}{4}} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{4 \Gamma\left(\frac{5}{4}\right)} = \left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{3}{4}} \frac{\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4 \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{\left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{3}{4}} \sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{6 \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}$$

پس:

$$\sqrt[4]{2mV} \frac{\left(\frac{E_n}{V}\right)^{\frac{3}{4}} \sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{6 \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)} = \left(n + \frac{1}{2}\right)h$$

یا:

$$E_n = V \left(\frac{r}{2}\right) \left(\frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \left(n + \frac{1}{2}\right) h}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \sqrt{2m\pi V}} \right)^{\frac{4}{3}}$$

و:

$$E_n = \left(\frac{r}{4} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)} \frac{h V^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{2m\pi}} \right)^{\frac{4}{3}}$$

تمرین ۹-۱۸

با استفاده از $\phi_{l..}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a} \right)^{\frac{r}{a}} e^{-Zr/a}$ نشان دهید که

$$\int \phi_{l..}(\vec{r}_1) \frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \phi_{l..}(\vec{r}_2) d^3r_1 d^3r_2 = \frac{\Delta Z}{\lambda a}$$

حل:

برای محاسبه این انتگرال ابتدا توجه می‌کنیم که:

$$\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \gamma}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \gamma)$$

که در آن $r_{>}$ مقدار بزرگتر (کوچکتر) بین r_1 و r_2 و γ زاویه بین $\vec{r}_1$ و $\vec{r}_2$ است. انتگرال زاویه‌ای به راحتی با نوشتن $P_l(\cos \gamma)$ برحسب $Y_l^m(\theta_1, \varphi_1)$ و $Y_l^m(\theta_2, \varphi_2)$ و استفاده از قضیه جمع هماهنگ‌های کروی انجام می‌شود:

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^{+l} Y_l^{m*}(\theta_1, \varphi_1) Y_l^m(\theta_2, \varphi_2)$$

بدیهی است که:

$$\int Y_l^m(\theta_i, \varphi_i) d\Omega_i = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} (4\pi) \delta_l \delta_m$$

پس:

$$\begin{aligned} & \int \phi_{l..}(\vec{r}_1) \frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \phi_{l..}(\vec{r}_2) d^3r_1 d^3r_2 \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{Z}{a} \right)^2 \int e^{\frac{-rZ(r_1+r_2)}{a}} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_l^{m*}(\theta_1, \varphi_1) d\Omega_1 Y_l^m(\theta_2, \varphi_2) d\Omega_2 r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{Z}{a} \right)^2 \int e^{\frac{-rZ(r_1+r_2)}{a}} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} \sqrt{4\pi} \delta_l \delta_m \sqrt{4\pi} \delta_l \delta_m r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 \\ &= \frac{(4\pi)^2}{\pi^2} \left(\frac{Z}{a} \right)^2 \int e^{\frac{-rZ(r_1+r_2)}{a}} \left(\frac{1}{r_{>}} \right) r_1^2 dr_1 r_2^2 dr_2 = 16 \left(\frac{Z}{a} \right)^2 \left\{ \int_0^{+\infty} \left[\frac{-a}{rZ} e^{\frac{-rZr_1}{a}} \left(r_1^2 + \frac{ar_1}{Z} + \frac{a^2}{rZ^2} \right) \right] \right. \\ & \quad \left. \times e^{\frac{-rZr_2}{a}} r_2 dr_2 + \int_0^{+\infty} \left[\frac{-a}{rZ} e^{\frac{-rZr_2}{a}} \left(r_2^2 + \frac{ar_2}{rZ} \right) \right] e^{\frac{-rZr_1}{a}} r_1^2 dr_1 \right\} = 16 \left(\frac{Z}{a} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \int_0^{+\infty} \left[\frac{-a}{2Z} e^{\frac{-2Zr_1}{a}} \left(r_1^2 + \frac{ar_1}{Z} + \frac{a^2}{2Z^2} \right) - \frac{a^2}{2Z^2} \right] e^{\frac{-2Zr_1}{a}} r_1 dr_1 + \int_0^{+\infty} \frac{+a}{2Z} e^{\frac{-2Zr_1}{a}} \left(r_1 + \frac{a}{2Z} \right) e^{\frac{-2Zr_1}{a}} r_1 dr_1 \right\} \\
& = 16 \left(\frac{Z}{a} \right)^6 \left[\frac{-a^2}{4Z^2} \int_0^{+\infty} e^{\frac{-2Zr_1}{a}} r_1^2 dr_1 - \frac{a^2}{4Z^2} \int_0^{+\infty} e^{\frac{-2Zr_1}{a}} r_1 dr_1 + \frac{a^2}{4Z^2} \int_0^{+\infty} e^{\frac{-2Zr_1}{a}} r_1 dr_1 \right] \\
& = 16 \left(\frac{Z}{a} \right)^6 \left\{ \frac{-a^2}{4Z^2} \frac{-a}{4Z} \left[e^{\frac{-2Zr_1}{a}} \left(r_1^2 + \frac{2ar_1}{4Z} + \frac{2a^2}{(4Z)^2} \right) \right]_0^{+\infty} - \frac{a^2}{4Z^2} \frac{-a}{4Z} \left[e^{\frac{-2Zr_1}{a}} \left(r_1 + \frac{a}{4Z} \right) \right]_0^{+\infty} \right. \\
& \quad \left. + \frac{a^2}{4Z^2} \frac{-a}{4Z} \left[e^{\frac{-2Zr_1}{a}} \left(r_1 + \frac{a}{4Z} \right) \right]_0^{+\infty} \right\} = 16 \left(\frac{Z}{a} \right)^6 \left[\frac{a^2}{16Z^2} \left(\frac{-2a^2}{16Z^2} \right) + \frac{a^2}{16Z^2} \left(-\frac{a}{4Z} \right) - \frac{a^2}{16Z^2} \left(\frac{-a}{4Z} \right) \right] = \frac{5Z}{8a}
\end{aligned}$$

تمرین ۹-۱۹

انرژی حالت پایه‌ی اتم بریلیوم دوبار یونیده، Be را به وسیله‌ی دو روش زیر محاسبه کنید و سپس دو نتیجه را مقایسه کنید:

(آ) روش اختلال مرتبه‌ی اول

(ب) روش وردشی با تابع آزمون $\Psi(r_1, r_2) = A e^{\frac{-a(r_1+r_2)}{a}}$ که در آن A ثابت بهنجارش، α یک پارامتر قابل تنظیم و a شعاع بور است.

حل:

این تمرین دقیقاً مسئله‌ی حل شده‌ی (۹-۱۷) است که در آن، Z مقداری برابر با ۴ دارد. پس:

(آ)

طبق رابطه‌ی (۹-۴۷۲) داریم:

$$E = -\frac{4e^2}{a} \left(4 - \frac{5}{8} \right) = \frac{-27e^2}{2a}$$

(ب)

طبق رابطه‌ی (۹-۴۸۳) داریم:

$$E = -\left[1 - \frac{5}{8 \times 4} + \left(\frac{5}{16 \times 4} \right)^2 \right] \frac{4^2 e^2}{a} = -\frac{34 \times 16 e^2}{56 a}$$

تمرین ۹-۲۰

با استفاده از روش وردشی، انرژی دومین حالت برانگیخته‌ی ذره‌ای به جرم m را تخمین بزنید که در

حال حرکت در یک چاه نامتناهی یک بعدی با دیوارهایی در $x=0$ و $x=L$ است. خطای نسبی میان نتیجه‌ی شما و مقدار دقیق را محاسبه کنید (به خاطر آورید که انرژی دومین حالت برانگیخته با

$$E_r^{exact} = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \text{ داده می‌شود.}$$

حل:

با توجه به مسئله‌ی حل شده‌ی (۷-۹) در متن کتاب به حل این تمرین می‌پردازیم. چون تابع موج دقیق دومین حالت برانگیخته، دارای صفرهایی در نقاط $x = \frac{L}{3}$ و $x = \frac{2L}{3}$ است و نسبت به

$x = \frac{L}{2}$ متقارن است و باید بر $\psi_1(x)$ و $\psi_2(x)$ عمود باشد؛ بنابراین آن را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\psi_r(x) = x \left(x - \frac{L}{3} \right) \left(x - \frac{2L}{3} \right) (x - l)$$

برای یافتن E_r^{VM} نیاز به یافتن $\langle \psi_r | \hat{H} | \psi_r \rangle$ و $\langle \psi_r | \psi_r \rangle$ داریم:

$$\langle \psi_r | \psi_r \rangle = \int_0^L \psi_r^2(x) dx = \int_0^L x^2 \left(x - \frac{L}{3} \right)^2 \left(x - \frac{2L}{3} \right)^2 (x - l)^2 dx = \frac{L^9}{17010}$$

$$\begin{aligned} \langle \psi_r | \hat{H} | \psi_r \rangle &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^L \left(\frac{d\psi_r(x)}{dx} \right)^2 dx \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^L \left(16x^6 - 48Lx^5 + \frac{500}{9}L^2x^4 - \frac{280}{9}L^2x^3 + \frac{700}{81}L^2x^2 - \frac{88}{81} \left(x^5 + \frac{4}{81}L^6 \right) \right) dx \\ &= \frac{\hbar^2 L^9}{81(2m)} \left(\frac{1296}{7} - 648 + 900 - 630 + \frac{700}{3} - 44 + 4 \right) = \frac{50\hbar^2 L^9}{17010m} \end{aligned}$$

پس:

$$E_r^{VM} = \frac{\langle \psi_r | \hat{H} | \psi_r \rangle}{\langle \psi_r | \psi_r \rangle} = \frac{\frac{50\hbar^2 L^9}{17010m}}{\frac{L^9}{17010}} = \frac{50\hbar^2}{mL^2}$$

$$\text{خطای نسبی} = \left| \frac{E_r^{exact} - E_r^{VM}}{E_r^{exact}} \right| = \left| \frac{\frac{9\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} - \frac{50\hbar^2}{mL^2}}{\frac{9\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}} \right| \approx \left| \frac{450 - 50}{45} \right| = \frac{1}{9} \approx 11.1\%$$

تمرین ۹-۲۱

یک ذره‌ی بدون اسپین با اندازه حرکت زاویه‌ای $l=1$ را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن

$\hat{H}_0 = \frac{\varepsilon}{\hbar^2} (\hat{L}_x^2 - \hat{L}_y^2)$ می‌باشد و در آن ε ثابتی دارای ابعاد انرژی است.

(آ) ترازهای انرژی دقیق و ویژه حالت‌های متناظر این ذره را حساب کنید.

(ب) اکنون اختلال $\hat{H}_p = \frac{\alpha \hat{L}_z}{\hbar}$ را اضافه می‌کنیم که در آن α یک ثابت کوچک (در مقایسه با ε)

است و دارای ابعاد انرژی می‌باشد. ترازهای انرژی این ذره را تا اختلال مرتبه‌ی دوم حساب کنید.

(پ) ماتریس $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$ را قطری کنید و ویژه مقادیر دقیق انرژی را بیابید. آن‌گاه هر ویژه مقدار را تا توان دوم α بسط دهید و آن‌ها را با نتایج به‌دست آمده از اختلال در (آ) مقایسه کنید.

حل:

(آ)

با استفاده از نمایش ماتریسی $\hat{L}_x$ و $\hat{L}_y$ ، نمایش ماتریسی $\hat{H}_0$ را می‌نویسیم:

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & 0 & i \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

پس:

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= \frac{\varepsilon}{\hbar^2} \left[\left(\frac{\hbar}{\sqrt{2}} \right)^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \left(\frac{\hbar}{\sqrt{2}} \right)^2 \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{\varepsilon}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \varepsilon \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

حال جهت محاسبه‌ی $|\phi_n\rangle$ و $E_n^{(0)} = \lambda_n \varepsilon$ ، ویژه بردارها و ویژه مقادیر متناظر آنها را می‌یابیم. برای

یافتن ویژه مقادیر باید معادله زیر را حل کنیم:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = 1 \\ \lambda_3 = 2 \end{cases}$$

نتیجه عبارتست از:

$$E_1^{(0)} = \lambda_1 \varepsilon = -\varepsilon, \quad E_2^{(0)} = \lambda_2 \varepsilon = \varepsilon, \quad E_3^{(0)} = \lambda_3 \varepsilon = 2\varepsilon$$

ویژه بردارهای متناظر نیز عبارت خواهند بود از:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |\phi_r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\phi_t\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(ب)

با استفاده از نظریه اختلال غیر تبهن تا تصحیح مرتبه دوم داریم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}$$

به طوری که:

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_m \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

با توجه به اینکه:

$$\hat{H}_p = \frac{\alpha L_z}{\hbar} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

نتیجه می شود که:

$$E_1^{(1)} = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ -1) \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{2} (1 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$E_r^{(1)} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ 1) \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{2} (1 \ 0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$E_t^{(1)} = \langle \phi_t | \hat{H}_p | \phi_t \rangle = (0 \ 1 \ 0) \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha (0 \ 1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

و:

$$\langle \phi | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ -1) \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{2} (1 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha$$

$$\langle \phi | \hat{H}_p | \phi_t \rangle = \langle \phi_t | \hat{H}_p | \phi \rangle = (1 \ 0 \ -1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \frac{\alpha^r}{\gamma} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

و بنابراین:

$$E_1^{(r)} = \frac{\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle^{(r)}}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} - \frac{\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle^{(r)}}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{\alpha^r}{-\varepsilon - \varepsilon} + \frac{0}{-\varepsilon - 2\varepsilon} = -\frac{\alpha^r}{2\varepsilon}$$

$$E_r^{(r)} = \frac{\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle^{(r)}}{E_r^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle^{(r)}}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{\alpha^r}{\varepsilon + \varepsilon} + \frac{0}{\varepsilon - 2\varepsilon} = \frac{\alpha^r}{2\varepsilon}$$

$$E_r^{(r)} = \frac{\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle^{(r)}}{E_r^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle^{(r)}}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{0}{2\varepsilon + \varepsilon} + \frac{0}{2\varepsilon - \varepsilon} = 0$$

و لذا:

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)} + E_1^{(r)} = -\varepsilon + 0 - \frac{\alpha^r}{2\varepsilon} = -\varepsilon - \frac{\alpha^r}{2\varepsilon}$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(r)} = \varepsilon + 0 + \frac{\alpha^r}{2\varepsilon} = \varepsilon + \frac{\alpha^r}{2\varepsilon}$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(r)} = 2\varepsilon + 0 + 0 = 2\varepsilon$$

(پ)

نمایش ماتریسی $\hat{H}$ عبارتست از:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \varepsilon \\ 0 & 2\varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 0 & -\alpha \end{pmatrix}$$

از قطری کردن آن نتیجه می شود که:

$$E_1 = \sqrt{\alpha^r + \varepsilon^r} = \varepsilon \sqrt{1 + \frac{\alpha^r}{\varepsilon^r}} = \varepsilon \left(1 + \frac{\alpha^r}{2\varepsilon^r} + \dots \right) = \varepsilon + \frac{\alpha^r}{2\varepsilon} + \dots$$

$$E_r = 2\varepsilon$$

$$E_r = -\sqrt{\alpha^r + \varepsilon^r} = -\varepsilon - \frac{\alpha^r}{2\varepsilon} + \dots$$

ملاحظه می شود که نتایج قسمت (پ) با نتایج قسمت (ب) در توافق است.

تمرین ۹-۲۲

سیستمی را در نظر بگیرید که هامیلتونی آن با $\hat{H} = E_0 \begin{pmatrix} -\delta & 3\lambda & 0 & 0 \\ 3\lambda & \delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda & -\lambda \end{pmatrix}$ داده می‌شود و در آن

$\lambda \gg 1$ است.

(آ) با تجزیه نمودن این هامیلتونی به صورت $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$ ویژه مقادیر و ویژه حالت‌های

هامیلتونی مختل نشده $\hat{H}_0$ را بیابید.

(ب) $\hat{H}$ را قطری کنید و ویژه مقادیر دقیق آن را بیابید. هر ویژه مقدار را تا توان دوم λ بسط

دهید.

(پ) با استفاده از اختلال مرتبه اول و دوم غیرتبه‌گن، انرژی‌های تقریبی $\hat{H}$ را بیابید و آن را با

مقادیر دقیق به دست آمده در (ب) مقایسه کنید.

حل:

(آ)

در صورتی که بخواهیم $\hat{H}$ را به صورت $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$ بنویسیم، خواهیم داشت:

$$\hat{H}_0 = E_0 \begin{pmatrix} -\delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}, \quad \hat{H}_p = E_0 \begin{pmatrix} 0 & 3\lambda & 0 & 0 \\ 3\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

$$|E_1 = -\delta E_0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|E_2 = \delta E_0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|E_3 = \lambda E_0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|E_4 = -\lambda E_0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(ب)

از قطری کردن $\hat{H}$ ، ویژه مقادیر آن یعنی E_n ها عبارت خواهند بود از:

$$E_1 = -E_0 \sqrt{2\delta + 9\lambda^2} = -E_0 \left(\delta + \frac{9}{10} \lambda^2 + O(\lambda^4) \right)$$

$$E_2 = E_0 \sqrt{2\delta + 9\lambda^2} = E_0 \left(\delta + \frac{9}{10} \lambda^2 + O(\lambda^4) \right)$$

$$E_3 = E_0 \sqrt{\lambda^2 + 6\epsilon} = E_0 \left(\lambda + \frac{\lambda^2}{16} + O(\lambda^4) \right)$$

$$E_4 = -E_0 \sqrt{\lambda^2 + 6\epsilon} = E_0 \left(-\lambda - \frac{\lambda^2}{16} + O(\lambda^4) \right)$$

(پ)

با استفاده از نظریه‌ی اختلال غیرتبهگن تا تصحیح مرتبه‌ی دوم داریم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}$$

به‌طوری‌که $E_n^{(0)}$ ویژه مقدار متناظر با ویژه حالت $|\phi_n\rangle$ عملگر $\hat{H}_0$ است و

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_1 | \phi_n \rangle, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \phi_m | \hat{H}_1 | \phi_n \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

در اینجا داریم:

$$E_1^{(0)} = -\delta E_0, \quad E_2^{(0)} = \delta E_0, \quad E_3^{(0)} = \lambda E_0, \quad E_4^{(0)} = -\lambda E_0$$

$$|\phi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\phi_4\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1^{(1)} = \langle \phi_1 | \hat{H}_1 | \phi_1 \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} E_0 \begin{pmatrix} 0 & 3\lambda & 0 & 0 \\ 3\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3\lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$E_2^{(1)} = \langle \phi_2 | \hat{H}_1 | \phi_2 \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} E_0 \begin{pmatrix} 0 & 3\lambda & 0 & 0 \\ 3\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\lambda \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$E_r^{(1)} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} E \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3\lambda & 0 & 0 \\ 3\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = E \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

$$E_r^{(1)} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} E \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3\lambda & 0 & 0 \\ 3\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = E \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

و:

$$\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = E \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\lambda \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 3E\lambda$$

$$\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = E \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

$$\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = E \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\lambda \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

$$\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = E \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

$$\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = E \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\lambda \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

$$\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = E_0 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -E_0 \lambda$$

و بنابراین:

$$E_1^{(r)} = \frac{|\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle|^r}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_1^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{(r E_0 \lambda)^r}{-5 E_0 - 5 E_0} + \frac{\cdot}{-5 E_0 - 8 E_0} + \frac{\cdot}{-5 E_0 + 8 E_0}$$

$$= -\frac{9}{16} \lambda^r E_0$$

$$E_r^{(r)} = \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} = \frac{(r E_0 \lambda)^r}{5 E_0 + 5 E_0} + \cdot + \cdot = \frac{9}{16} \lambda^r E_0$$

$$E_r^{(r)} = \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} = \cdot + \cdot + \frac{(-E_0 \lambda)^r}{8 E_0 + 8 E_0} = \frac{1}{16} \lambda^r E_0$$

$$E_r^{(r)} = \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} + \frac{|\langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle|^r}{E_r^{(0)} - E_r^{(0)}} = \cdot + \cdot + \frac{(-E_0 \lambda)^r}{-8 E_0 - 8 E_0} = -\frac{1}{16} \lambda^r E_0$$

پس تا تصحیح مرتبه دوم داریم:

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)} + E_1^{(r)} = -5 E_0 + \cdot - \frac{9}{16} \lambda^r E_0 = -E_0 \left(5 + \frac{9}{16} \lambda^r \right)$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(r)} = 5 E_0 + \cdot + \frac{9}{16} \lambda^r E_0 = E_0 \left(5 + \frac{9}{16} \lambda^r \right)$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(r)} = 8 E_0 + \cdot + \frac{1}{16} \lambda^r E_0 = E_0 \left(8 + \frac{1}{16} \lambda^r \right)$$

$$E_r = E_r^{(0)} + E_r^{(1)} + E_r^{(r)} = -8 E_0 + \cdot - \frac{1}{16} \lambda^r E_0 = -E_0 \left(8 + \frac{1}{16} \lambda^r \right)$$

نتایج به دست آمده دقیقاً همان نتایج قسمت (ب) هستند.

تمرین ۹-۲۳

انرژی حالت پایه ای اتم هیدروژن را به وسیله روش وردشی با استفاده از دو تابع آزمون زیر تخمین بزنید. خطای نسبی آنها را بیابید. آنگاه دو نتیجه را مقایسه کنید و در مورد قابلیت هر تابع آزمون

بحث کنید.

$$\phi_a = \begin{cases} 1 - \frac{r}{\alpha} & r \leq \alpha \\ 0 & r > \alpha \end{cases} \quad (\bar{A})$$

که در آن α یک پارامتر قابل تنظیم است. رابطه‌ی میان $\alpha_{\min}$ و شعاع بور پیدا کنید.

$$\phi_a(r) = A e^{-\alpha r} \quad (\text{ب})$$

حل:

(\bar{A})

ابتدا به محاسبه‌ی $E(\alpha) = \frac{\langle \phi_a | \hat{H} | \phi_a \rangle}{\langle \phi_a | \phi_a \rangle}$ می‌پردازیم. در اینجا:

$$\hat{H} = \frac{P^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$$

پس:

$$\langle \phi_a | \hat{H} | \phi_a \rangle = \langle \phi_a | \frac{P^2}{2\mu} | \phi_a \rangle - e^2 \langle \phi_a | \frac{1}{r} | \phi_a \rangle$$

اما با توجه به رابطه‌ی (۹-۱۲۸) داریم:

$$\langle \phi_a | \frac{P^2}{2\mu} | \phi_a \rangle = - \langle \phi_a | \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 | \phi_a \rangle = \frac{\hbar^2}{2\mu} \int (\vec{\nabla} \phi_a^*(r)) \cdot (\vec{\nabla} \phi_a(r)) d^3r$$

و چون:

$$\vec{\nabla} \phi_a^*(r) = \vec{\nabla} \phi_a(r) = \frac{d\phi_a(r)}{dr} \hat{r} = -\frac{1}{\alpha} \hat{r}$$

پس:

$$\langle \phi_a | \frac{P^2}{2\mu} | \phi_a \rangle = \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{4}{3} \pi \alpha^3 \right) = \frac{2\pi \hbar^2 \alpha}{3\mu}$$

از طرفی:

$$\langle \phi_a | \frac{1}{r} | \phi_a \rangle = \int_0^\alpha \frac{\phi_a^2(r)}{r} 4\pi r^2 dr = \int_0^\alpha 4\pi r \left(1 - \frac{r}{\alpha} + \frac{r^2}{\alpha^2} \right) dr = 4\pi \left(\frac{\alpha^2}{2} - \frac{r^2}{3\alpha} + \frac{r^3}{3\alpha^2} \right) \Big|_0^\alpha = \frac{\pi \alpha^2}{3}$$

و:

$$\langle \phi_a | \phi_a \rangle = \int \phi_a^2(r) d^3r = 4\pi \int_0^\alpha \left(1 - \frac{r}{\alpha} + \frac{r^2}{\alpha^2} \right) r^2 dr = 4\pi \left(\frac{\alpha^3}{3} - \frac{r^2}{2\alpha} + \frac{1}{3\alpha^2} \frac{\alpha^3}{3} \right) = \frac{2\pi \alpha^3}{15}$$

در نتیجه:

$$E(\alpha) = \frac{\frac{2\pi\hbar^2\alpha}{\mu} - \frac{\pi\alpha^2 e^2}{2}}{\frac{2\pi\alpha^2}{15}} = \frac{15}{2\pi\alpha^2} \left(\frac{2\pi\hbar^2\alpha}{\mu} - \frac{\pi\alpha^2 e^2}{2} \right) = \frac{15}{2} \left(\frac{\hbar^2}{\mu\alpha} - \frac{e^2}{2\alpha} \right)$$

از کمینه کردن $E(\alpha)$ مقدار $\alpha_{\min} = \frac{4\hbar^2}{\mu e^2} = 4a$ حاصل می‌شود و در نتیجه:

$$E_{\text{VM}} = E(\alpha_{\min}) = \frac{15}{2} \left[\frac{\hbar^2}{\mu} \frac{\mu^2 e^2}{16\hbar^2} - e^2 \left(\frac{\mu e^2}{4\hbar^2} \right) \right] = \frac{15}{2} \left(\frac{\mu e^2}{8\hbar^2} - \frac{\mu e^2}{4\hbar^2} \right) = -\frac{15}{16} \frac{\mu e^2}{\hbar^2}$$

و:

$$\text{خطای نسبی} = \left| \frac{E_{\text{ground}} - E_{\text{VM}}}{E_{\text{ground}}} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{2} \frac{\mu e^2}{\hbar^2} + \frac{15}{16} \frac{\mu e^2}{\hbar^2}}{-\frac{1}{2} \frac{\mu e^2}{\hbar^2}} \right| = \left| \frac{-8 + 15}{-8} \right| = \frac{7}{8} = 87.5\%$$

(ب)

در اینجا داریم:

$$\vec{\nabla} \phi_a^*(r) = \vec{\nabla} \phi_a(r) = \frac{d\phi_a(r)}{dr} \hat{r} = -2\alpha A r e^{-\alpha r^2}$$

پس:

$$\begin{aligned} \langle \phi_a | \frac{P^2}{2\mu} | \phi_a \rangle &= \frac{\hbar^2}{2\mu} \int \vec{\nabla}(\phi_a^*(r)) \cdot (\vec{\nabla} \phi_a(r)) d^3r = \frac{\hbar^2}{2\mu} (4\pi) \int_0^\infty 4\alpha^2 A^2 e^{-2\alpha r^2} r^2 r^2 dr \\ &= \frac{4\pi\hbar^2\alpha^2 A^2}{\mu} \int_0^\infty e^{-2\alpha r^2} r^4 dr = \frac{4\pi\hbar^2\alpha^2 A^2}{\mu} \frac{1}{8} \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^3}} \end{aligned}$$

از طرفی:

$$\langle \phi_a | \frac{1}{r} | \phi_a \rangle = \int_0^\infty \frac{\phi_a^2(r)}{r} d^3r = 4\pi \int_0^\infty \frac{A^2 e^{-2\alpha r^2}}{r} r^2 dr = 4\pi A^2 \int_0^\infty e^{-2\alpha r^2} r dr = \frac{\pi A^2}{\alpha}$$

و:

$$\langle \phi_a | \phi_a \rangle = \int_0^\infty \phi_a^2(r) d^3r = 4\pi A^2 \int_0^\infty e^{-2\alpha r^2} r^2 dr = 4\pi A^2 \left(\frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^3}} \right) = \pi A^2 \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^3}}$$

در نتیجه:

$$E(\alpha) = \frac{\frac{2\pi\hbar^2\alpha^2 A^2}{\mu} \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^2}} - \frac{\pi A^2 e^2}{\alpha}}{\pi A^2 \sqrt{\frac{\pi}{(2\alpha)^2}}} = \frac{2\hbar^2\alpha}{\mu} - \frac{2e^2\sqrt{2}\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\pi}}$$

از کمینه کردن $E(\alpha)$ مقدار $\alpha_{\min} = \frac{2e^2\mu^2}{9\pi\hbar^2} = \frac{2}{9\pi a_0^2}$ حاصل می‌شود و در نتیجه:

$$E_{\cdot}^{VM} = E(\alpha_{\min}) = \frac{2\hbar^2}{\mu} \frac{2e^2\mu^2}{9\pi\hbar^2} - \frac{2e^2\sqrt{2}\sqrt{\frac{2e^2\mu^2}{9\pi\hbar^2}}}{\sqrt{\pi}} = \frac{2}{9} \frac{\mu e^2}{\pi\hbar^2} - \frac{4e^2\mu}{9\pi\hbar^2} = \frac{-2\mu e^2}{9\pi\hbar^2}$$

و:

$$\text{خطای نسبی} = \left| \frac{E_{\text{ground}} - E_{\cdot}^{VM}}{E_{\text{ground}}} \right| = \left| \frac{\frac{-1}{2} + \frac{2}{9\pi}}{\frac{-1}{2}} \right| = \left| 1 - \frac{4}{9\pi} \right| \approx 57.5\%$$

بنابراین، خطای نسبی با استفاده از تابع آزمون قسمت (آ) کمتر است و لذا این تابع برای روش وردشی مناسب‌تر می‌باشد.

تمرین ۹-۲۴

(آ) اختلال مرتبه اول انرژی را برای n امین حالت برانگیخته‌ی یک نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی که در اختلال کوچک زیر قرار دارد محاسبه کنید:

$$\hat{H}_p = \lambda(V_1 \hat{x}^2 + V_2 \hat{x}^4)$$

که در آن V_1 و V_2 ثابت هستند و $\lambda \ll 1$.

(ب) با استفاده از رابطه‌ی به دست آمده در (آ) انرژی‌های سه حالت نخست (یعنی $n=0,1,2$) را با اختلال مرتبه‌ی اول پیدا کنید.

حل:

(آ)

از آنجا که ویژه حالات (ویژه توابع) نوسانگر هماهنگ یک بُعدی فاقد تبهگنی هستند لذا از نظریه‌ی اختلال غیر تبهگن استفاده می‌کنیم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + \dots$$

که:

$$E_n^{(0)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad ; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle$$

که $|\phi_n\rangle$ ویژه حالت سطح n ام نوسانگر هماهنگ یک بعدی است. چون به ازای n زوج (فرد)، ویژه توابع نوسانگر هماهنگ یک بعدی، زوج (فرد) هستند لذا حاصل $\langle \phi_n | \hat{x}^2 | \phi_n \rangle$ صفر خواهد بود و بنابراین:

$$E_n^{(1)} = \lambda V_1 \langle \phi_n | x^2 | \phi_n \rangle + \lambda V_2 \langle \phi_n | x^4 | \phi_n \rangle = \lambda V_1 \langle \phi_n | x^2 | \phi_n \rangle$$

با توجه به اینکه:

$$x^2 |\phi_n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2} + 2\hat{a}^{\dagger}\hat{a} + 1 \right) |\phi_n\rangle$$

که در آن $\hat{a}$ و $\hat{a}^{\dagger}$ عملگرهای پایین برنده و بالا برنده هستند که اثر آنها بر $|\phi_n\rangle$ به صورت زیر است:

$$\hat{a} |\phi_n\rangle = \sqrt{n} |\phi_{n-1}\rangle$$

$$\hat{a}^{\dagger} |\phi_n\rangle = \sqrt{n+1} |\phi_{n+1}\rangle$$

پس تعریف می‌کنیم:

$$|\beta\rangle = x^2 |\phi_n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\sqrt{n}\sqrt{n-1} |\phi_{n-2}\rangle + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2} |\phi_{n+2}\rangle + (2n+1) |\phi_n\rangle \right)$$

و از این رابطه نتیجه می‌شود که:

$$\begin{aligned} \langle \phi_n | x^2 | \phi_n \rangle &= \langle \beta | \beta \rangle \\ &= \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2 \left(n(n-1) + (n+1)(n+2) + (2n+1)^2 \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^2 \left((n+1)^2 + n^2 \right) \end{aligned}$$

پس:

$$E_n^{(1)} = \frac{2}{3} \lambda V_1 \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^2 \left[(n+1)^2 + n^2 \right]$$

و:

$$E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{2}{3} \lambda V_1 \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^2 \left[n^2 + (n+1)^2 \right]$$

(ب)

به ازای $n = 0, 1, 2$ نتیجه می شود که:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega + \frac{3}{4} \lambda V_1 \left(\frac{\hbar}{m \omega} \right)^2$$

$$E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega + \frac{15}{4} \lambda V_1 \left(\frac{\hbar}{m \omega} \right)^2$$

$$E_2 = \frac{5}{2} \hbar \omega + \frac{39}{4} \lambda V_1 \left(\frac{\hbar}{m \omega} \right)^2$$

تمرین ۹-۲۵

$$\Psi(x, \alpha) = \begin{cases} A(\alpha^2 - x^2)^2 & |x| \leq \alpha \\ 0 & |x| \geq \alpha \end{cases}$$

با استفاده از تابع آزمون

همانگ یک بعدی را با روش وردشی تخمین بزنید. α یک پارامتر قابل تنظیم و A ثابت بهنجارش است. خطای نسبی را محاسبه و دقت نتیجه را ارزیابی کنید.

حل:

ابتدا به محاسبه $E(\alpha) = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$ می پردازیم. در اینجا $\hat{H}$ عملگر هامیلتونی است که برای نوسانگر همانگ ساده در یک بُعد عبارتست از:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

پس:

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = -\langle \psi | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle \psi | x^2 | \psi \rangle$$

طبق رابطه (۹-۱۲۴) داریم:

$$-\langle \psi | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{d\psi(x)}{dx} \right|^2 dx$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned}
 -\langle \psi_+ | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi_+ \rangle &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-a}^{+a} |A|^2 A(-2x) (\alpha^2 - x^2)^2 dx = \frac{16\hbar^2 |A|^2}{m} \int_0^a x^2 (\alpha^2 - x^2)^2 dx \\
 &= \frac{16\hbar^2 |A|^2}{m} \int_0^a (\alpha^2 x^2 - 2\alpha^2 x^4 + x^6) dx = \frac{16\hbar^2 |A|^2}{m} \left[\alpha^2 \left(\frac{x^3}{3} \right) - 2\alpha^2 \left(\frac{x^5}{5} \right) + \frac{x^7}{7} \right]_0^a \\
 &= \frac{128\hbar^2 |A|^2}{105m}
 \end{aligned}$$

از طرفی:

$$\begin{aligned}
 \langle \psi_+ | x^2 | \psi_+ \rangle &= \int x^2 |\psi_+(x)|^2 dx = \int_{-a}^{+a} |A|^2 x^2 (\alpha^2 - x^2)^2 dx \\
 &= 2|A|^2 \int_0^a (\alpha^2 x^2 - 2\alpha^2 x^4 + x^6) dx \\
 &= 2|A|^2 \left[\alpha^2 \left(\frac{x^3}{3} \right) - 2\alpha^2 \left(\frac{x^5}{5} \right) + \frac{x^7}{7} \right]_0^a = \frac{256|A|^2 \alpha^4}{3465}
 \end{aligned}$$

پس نتیجه می‌شود که:

$$\langle \psi_+ | \hat{H} | \psi_+ \rangle = \frac{128\hbar^2 |A|^2 \alpha^4}{105m} + \frac{128m\omega^2 |A|^2 \alpha^4}{3465}$$

همچنین داریم:

$$\begin{aligned}
 \langle \psi_+ | \psi_+ \rangle &= \int |\psi_+(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-a}^{+a} (\alpha^2 - x^2)^2 dx \\
 &= 2|A|^2 \int_0^a (\alpha^2 - 2\alpha^2 x^2 + x^4) dx \\
 &= 2|A|^2 \left[\alpha^2 x - 2\alpha^2 \left(\frac{x^3}{3} \right) + \frac{x^5}{5} \right]_0^a = \frac{256|A|^2 \alpha^4}{315}
 \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$E(\alpha) = \frac{\frac{128\hbar^2 |A|^2 \alpha^4}{105m} + \frac{128m\omega^2 |A|^2 \alpha^4}{3465}}{\frac{256|A|^2 \alpha^4}{315}} = \frac{3}{2} \frac{\hbar^2}{m\alpha^2} + \frac{1}{22} m\omega^2 \alpha^2$$

از کمینه کردن $E(\alpha)$ مقدار $\alpha = \left(\frac{22\hbar^2}{m^2 w^2} \right)^{\frac{1}{2}}$ حاصل می‌شود و در نتیجه:

$$E_{\dot{}}^{VM} = E(\alpha) = \frac{2}{2} \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{m^2 w^2}{22\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{22} m w^2 \left(\frac{22\hbar^2}{m w^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{2} \frac{1}{\sqrt{22}} + \frac{1}{22} \sqrt{22} \right) \hbar w = \frac{\sqrt{22}}{11} \hbar w$$

یا:

$$E_{\dot{}}^{VM} \simeq 0.45 \hbar w$$

و لذا:

$$\text{خطای نسبی} = \left| \frac{E_{\dot{}}^{VM} - E_{\text{ground}}}{E_{\text{ground}}} \right| = \left| \frac{0.45 \hbar w - 0.5 \hbar w}{0.5 \hbar w} \right| = 0.1 = 10\%$$

تمرین ۹-۲۶

با استفاده از تقریب WKB ضریب عبور یک ذره به جرم m و انرژی E را تخمین بزنید که در حال حرکت در پتانسیل زیر است:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 \left(1 + \frac{x}{a} \right) & -a < x < 0 \\ V_0 \left(1 - \frac{x}{a} \right) & 0 < x < a \\ 0 & \text{در جاهای دیگر} \end{cases}$$

به ازای $0 < E < V_0$ این پتانسیل را رسم کنید.

حل:


در تقریب WKB ضریب عبور از رابطی زیر به دست می‌آید:

$$T = e^{-\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V(x) - E)} dx$$

که در این رابطه x_1 و x_2 نقاط بازگشت هستند. در اینجا نقاط بازگشت عبارتند از:

$$-x_1 = x_2 = a \left(1 - \frac{E}{V_0} \right)$$

این نقاط در شکل زیر نشان داده شده‌اند.



حال به محاسبه γ می‌پردازیم:

$$\begin{aligned}\gamma &= \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V(x) - E)} dx = \frac{\gamma}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{2m \left[V_0 \left(1 - \frac{x}{a} \right) - E \right]} dx \\ &= \frac{\gamma}{\hbar} \left(-\frac{a}{2mV_0} \right)^{\frac{\gamma}{2}} \left[\left(V_0 \left(1 - \frac{x}{a} \right) - E \right)^{\frac{\gamma}{2}} \right]_{-x_1}^{x_2} = \frac{-\frac{\gamma}{2} a (2m)^{\frac{\gamma}{2}}}{\hbar m V_0} \left[\left(V_0 \left(1 - \frac{a \left(1 - \frac{E}{V_0} \right)}{a} \right) - E \right)^{\frac{\gamma}{2}} - (V_0 - E)^{\frac{\gamma}{2}} \right] \\ &= \frac{\gamma a}{2 \hbar m V_0} [2m(V_0 - E)]^{\frac{\gamma}{2}}\end{aligned}$$

و بنابراین ضریب عبور T عبارتست از:

$$T = \exp \left\{ \frac{-\gamma a}{2 \hbar m V_0} [2m(V_0 - E)]^{\frac{\gamma}{2}} \right\}$$

تمرین ۹-۲۷

با استفاده از روش وردشی انرژی حالت پایه‌ی یک نوسانگر هماهنگ یک بعدی را با در نظر گرفتن تابع آزمون زیر تخمین بزنید:

$$\Psi(x, \alpha) = A(1 + \alpha|x|)e^{-\alpha|x|}$$

که در آن α یک پارامتر قابل تنظیم و A ثابت بهنجارش است.

حل:

ابتدا به محاسبه $E(\alpha) = \frac{\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$ می‌پردازیم. در مورد نوسانگر هماهنگ یک بعدی، عملگر هامیلتونی $\hat{H}$ عبارتست از:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

پس:

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = -\langle \psi | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle \psi | x^2 | \psi \rangle$$

اما:

$$\begin{aligned} \langle \psi | x^2 | \psi \rangle &= \int x^2 |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |A|^2 (1 + \alpha|x|)^2 e^{-\alpha|x|} dx \\ &= 2|A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + 2\alpha x^3 + \alpha^2 x^4) e^{-\alpha|x|} dx \end{aligned}$$

اما:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\alpha|x|} dx = \left[\frac{-e^{-\alpha|x|}}{\alpha} \left(x^2 + \frac{x}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\alpha^3}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-\alpha|x|} dx = \left[\frac{e^{-\alpha|x|}}{-\alpha} \left(x^3 + \frac{3x^2}{\alpha} + \frac{3x}{\alpha^2} + \frac{1}{\alpha^3} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\alpha^4}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-\alpha|x|} dx = \left[\frac{e^{-\alpha|x|}}{-\alpha} \left(x^4 + \frac{4x^3}{\alpha} + \frac{6x^2}{\alpha^2} + \frac{4x}{\alpha^3} + \frac{1}{\alpha^4} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\alpha^5}$$

و در نتیجه:

$$\langle \psi | x^2 | \psi \rangle = 2|A|^2 \left(\frac{1}{\alpha^3} + \frac{2\alpha}{\alpha^4} + \frac{\alpha^2}{\alpha^5} \right) = \frac{12|A|^2}{\alpha^3}$$

با توجه به رابطه‌ی (۹-۱۲۴) داریم:

$$\begin{aligned} -\langle \psi | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi \rangle &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{d\psi(x)}{dx} \right|^2 dx = \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| -A\alpha^2 x e^{-\alpha|x|} \right|^2 dx \\ &= \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha^4}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-2\alpha|x|} dx = \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha^4}{m} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\alpha|x|} dx \\ &= \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha^4}{m} \frac{1}{\alpha^3} = \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha}{m} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \frac{13 m w^2 |A|^2}{22 \alpha^2} + \frac{\hbar^2 |A|^2}{4 m \alpha}$$

از طرفی:

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \int |\psi(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + 2\alpha|x| + \alpha^2 x^2) e^{-2\alpha|x|} dx \\ &= 2|A|^2 \int_0^{+\infty} (1 + 2\alpha x + \alpha^2 x^2) e^{-2\alpha x} dx \end{aligned}$$

و چون:

$$\int_0^{+\infty} e^{-2\alpha x} dx = \left[\frac{-1}{2\alpha} e^{-2\alpha x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2\alpha}$$

$$\int_0^{+\infty} x e^{-2\alpha x} dx = \left[\frac{e^{-2\alpha x}}{-2\alpha} \left(x + \frac{1}{2\alpha} \right) \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{4\alpha^2}$$

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2\alpha x} dx = \frac{1}{4\alpha^3}$$

لذا:

$$\langle \psi | \psi \rangle = 2|A|^2 \left(\frac{1}{2\alpha} + \frac{2\alpha}{4\alpha^2} + \frac{\alpha^2}{4\alpha^3} \right) = \frac{5|A|^2}{2\alpha}$$

و نتیجه می‌شود که:

$$E(\alpha) = \frac{\frac{13 m w^2 |A|^2}{22 \alpha^2} + \frac{\hbar^2 |A|^2}{4 m}}{\frac{5|A|^2}{2\alpha}} = \frac{13 m w^2}{10 \alpha^2} + \frac{\hbar^2 \alpha^2}{10 m}$$

مقدار کمینه‌ی $E(\alpha)$ به‌ازای $\alpha = \left(\frac{65 m^2 w^2}{4 \hbar^2} \right)^{\frac{1}{4}}$ حاصل می‌شود. پس:

$$E^{VM} = E(\alpha) = \frac{13 m w^2}{10} \left(\frac{4 \hbar^2}{65 m^2 w^2} \right)^{\frac{1}{4}} + \frac{\hbar^2}{10 m} \left(\frac{65 m^2 w^2}{4 \hbar^2} \right)^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{13}{2}} \hbar w$$

تمرین ۹-۲۸

با استفاده از تقریب WKB ضریب عبور ذره‌ای به جرم m و انرژی E را تخمین بزنید که در حال حرکت در پتانسیل زیر است:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) & |x| < a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

و در آن $0 < E \leq V_0$.

حل:


در تقریب WKB ضریب عبور از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$T = e^{-\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(V(x) - E)} dx$$

که در این رابطه، x_1 و x_2 نقاط بازگشتی هستند که از شرط $E = V(x)$ به دست می‌آیند. در اینجا نقاط بازگشتی عبارتند از:

$$-x_1 = x_2 = a \sqrt{1 - \frac{E}{V_0}}$$

این نقاط در شکل نشان داده شده‌اند:



حال به محاسبه‌ی γ می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{1}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{2m \left[V_0 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) - E \right]} dx = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{V_0 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) - E} dx \\ &= \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{V_0 - E} \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{1 - \frac{V_0}{V_0 - E} \frac{x^2}{a^2}} dx \end{aligned}$$

با تغییر متغیر $\sin \theta = \sqrt{\frac{V_0}{V_0 - E}} \frac{x}{a}$ نتیجه می‌شود که:

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{\gamma}{h} \sqrt{\gamma m (V_0 - E)} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \sqrt{\frac{V_0 - E}{V_0}} \cos^{\gamma} \theta d\theta = \frac{a}{h} \sqrt{\frac{\gamma m}{V_0}} (V_0 - E) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{a}{h} \sqrt{\frac{\gamma m}{V_0}} (V_0 - E) \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a}{h} \sqrt{\frac{\gamma m}{V_0}} (V_0 - E) \pi \end{aligned}$$

و بنابراین ضریب عبور T عبارتست از:

$$T = \exp \left[-\frac{a\pi}{h} \sqrt{\frac{\gamma m}{V_0}} (V_0 - E) \right]$$

تمرین ۹-۲۹

با استفاده از تقریب WKB ترازهای انرژی ذره‌ای به جرم m را بیابید که در حال حرکت در پتانسیل زیر است:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 \left(\frac{x^{\gamma}}{a^{\gamma}} - 1 \right) & |x| < a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

حل:

در اینجا باید از رابطه‌ی زیر استفاده کنیم:

$$\oint p(x, E_n) dx = \gamma \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{\gamma m (E_n - V(x))} dx = \left(n + \frac{1}{2} \right) h$$

که x_1 و x_2 نقاط بازگشت هستند و در اینجا عبارتند از:

$$-x_1 = x_2 = a \sqrt{\frac{E}{V_0} + 1}$$

پس:

$$\begin{aligned} \left(n + \frac{1}{2} \right) h &= \gamma \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{\gamma m \left[E_n - V_0 \left(\frac{x^{\gamma}}{a^{\gamma}} - 1 \right) \right]} dx = \gamma \int_{-x_1}^{x_2} \sqrt{\gamma m (E_n + V_0) - \gamma m V_0 \frac{x^{\gamma}}{a^{\gamma}}} dx \\ &= \gamma \sqrt{\gamma m (E_n + V_0)} \int_{-x_1}^{x_2} \left(1 - \frac{V_0}{V_0 + E} \frac{x^{\gamma}}{a^{\gamma}} \right)^{\frac{1}{2}} dx \end{aligned}$$

با تغییر متغیر $\sin \theta = \sqrt{\frac{V_0}{V_0 + E}} \frac{x}{a}$ نتیجه می‌شود که:

$$\begin{aligned} \left(n + \frac{1}{2}\right)h &= \sqrt{2m(E_n + V_0)} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \sqrt{\frac{V_0 + E_n}{V_0}} \cos^2 \theta d\theta = \sqrt{2m} \sqrt{\frac{V_0}{V_0}} (E_n + V_0) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \sqrt{2m} \sqrt{\frac{V_0}{V_0}} (E_n + V_0) \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = a \pi \sqrt{\frac{2m}{V_0}} (E_n + V_0) \end{aligned}$$

و یا:

$$E_n = -V_0 + \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)h}{a \pi} \sqrt{\frac{V_0}{2m}} = -V_0 + \left(n + \frac{1}{2}\right)h \sqrt{\frac{2V_0}{m a^2}}$$

تمرین ۹-۳۰

ذره‌ای به جرم m در حال حرکت در پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بعدی $V(x) = \frac{m\omega^2 x^2}{2}$ می‌باشد.
(آ) انرژی حالت پایه و

(ب) انرژی نخستین حالت برانگیخته

را تا اختلال مرتبه‌ی اول محاسبه کنید که در آن یک اختلال کوچک $\hat{H}_p = \lambda \delta(x)$ با $\lambda \ll 1$ به پتانسیل افزوده می‌شود.

حل:

با استفاده از نظریه‌ی اختلال غیرتبهگن تا تصحیح مرتبه‌ی اول داریم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

که در اینجا:

$$E_n^{(0)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

و

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle$$

که $|\phi_n\rangle$ ویژه حالت مربوط به سطح n ام نوسانگر هماهنگ ساده است. پس:
(آ)

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle = \int \lambda \phi_n^*(x) \delta(x) dx = \lambda \phi_n^*(0)$$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} x}} \exp\left(\frac{-x^2}{2x^2}\right)$$

که در آن $x = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ پس:

$$E^{(1)} = \lambda \left| \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} x}} c \right|^2 = \frac{\lambda}{\sqrt{\pi} x}$$

و در نتیجه:

$$E = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\lambda}{\sqrt{\pi} x}$$

(ب)

$$E_1 = E^{(0)} + E^{(1)}$$

$$E^{(1)} = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle = \lambda \phi_1^2(0)$$

طبق رابطه‌ی (۴-۱۶۰):

$$\phi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{\pi} x}} x \exp\left(\frac{-x^2}{2x^2}\right)$$

پس:

$$E^{(1)} = \lambda \times 0 = 0$$

و در نتیجه:

$$E_1 = \frac{3}{2} \hbar\omega + 0 = \frac{3}{2} \hbar\omega$$

تمرین ۹-۳۱

ذره‌ای به جرم m در پتانسیل نوسانگر هماهنگ سه‌بعدی $V(x) = \frac{m\omega^2 x^2}{2}$ حرکت می‌کند.

(آ) انرژی حالت پایه و

(ب) انرژی اولین حالت برانگیختگی را تا اختلال مرتبه‌ی اول در حالی که اختلال کوچک $\hat{H}_p = \lambda x^4$ با این پتانسیل جمع شود به دست آورید ($\lambda \ll 1$).

حل:

با استفاده از نظریه اختلال غیرتبهگن تا تصحیح مرتبه اول داریم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

که در اینجا:

$$E_n^{(0)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle$$

که $|\phi_n\rangle$ ویژه حالت مربوط به سطح n ام نوسانگر هماهنگ ساده یک بعدی است. طبق رابطه (۴-۱۸۴) داریم:

$$x^2 |\phi_n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2} + 2\hat{a}^{\dagger}\hat{a} + 1 \right) |\phi_n\rangle$$

و چون:

$$\hat{a} |\phi_n\rangle = \sqrt{n} |\phi_{n-1}\rangle$$

$$\hat{a}^{\dagger} |\phi_n\rangle = \sqrt{n+1} |\phi_{n+1}\rangle$$

لذا:

$$x^2 |\phi_n\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\sqrt{n}\sqrt{n-1} |\phi_{n-2}\rangle + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2} |\phi_{n+2}\rangle + (2n+1) |\phi_n\rangle \right)$$

حال با استفاده از رابطه $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^{\dagger})$ ، $x^2 |\phi_n\rangle$ را می‌یابیم.

$$\begin{aligned} x^2 |\phi_n\rangle &= x(x^2 |\phi_n\rangle) \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^{\dagger}) \left[\frac{\hbar}{2m\omega} \left(\sqrt{n}\sqrt{n-1} |\phi_{n-2}\rangle + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2} |\phi_{n+2}\rangle + (2n+1) |\phi_n\rangle \right) \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{n}\sqrt{n-1}\sqrt{n-2} |\phi_{n-3}\rangle + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2}\sqrt{n+3} |\phi_{n+3}\rangle + (2n+1)\sqrt{n+1} |\phi_{n+1}\rangle \right] \\ &= \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^{\frac{3}{2}} \left[\sqrt{n}\sqrt{n-1}\sqrt{n-2} |\phi_{n-3}\rangle + 3n^{\frac{3}{2}} |\phi_{n-1}\rangle + 2(n+1)^{\frac{3}{2}} |\phi_{n+1}\rangle \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2}\sqrt{n+3} |\phi_{n+3}\rangle \right] \end{aligned}$$

اگر تعریف $|\beta\rangle \equiv x^2 |\phi_n\rangle$ را در نظر بگیریم آنگاه:

$$\langle \phi_n | x^r | \phi_n \rangle = \langle \beta | \beta \rangle = \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^r \left[n(n-1)(n-2) + 9n^2 + 9(n+1)^2 + (n+1)(n+2)(n+3) \right]$$

پس:

(ا)

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} = \frac{\hbar \omega}{2} + 15 \lambda \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^r$$

(ب)

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)} = \frac{3}{2} \hbar \omega + 10 \lambda \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^r$$

تمرین ۹-۳۲

ذره‌ای به جرم m در پتانسیل نوسانگر هماهنگ سه بعدی $V(x) = \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$ در حال حرکت است. انرژی حالت برانگیخته n ام را تا اختلال مرتبه‌ی اول هنگامی که یک اختلال کوچک $\hat{H}_p = \lambda \hat{X}^r \hat{Y}^r \hat{Z}^r$ به پتانسیل ($\lambda \ll 1$) افزوده شود محاسبه کنید.

حل:

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle n_x, n_y, n_z | H_p | n_x, n_y, n_z \rangle \\ &= \lambda \langle n_x, n_y, n_z | x^r y^r z^r | n_x, n_y, n_z \rangle \\ &= \lambda \langle n_x | x^r | n_x \rangle \langle n_y | y^r | n_y \rangle \langle n_z | z^r | n_z \rangle \end{aligned}$$

با توجه به اینکه می‌دانیم:

$$\langle n_x | x^r | n_x \rangle = \frac{\hbar}{r m \omega} (r n + 1)$$

$$\langle n_y | y^r | n_y \rangle = \frac{\hbar}{r m \omega} \left(\frac{1}{r} + n + n^r \right)$$

$$\langle n_z | z^r | n_z \rangle = \frac{\hbar}{r m \omega} (r n + 1)$$

$$E_n^{(1)} = \frac{r}{2} \lambda \left(\frac{\hbar}{r m \omega} \right)^r \left(\frac{\hbar}{m \omega} \right)^r (r n + 1)^r \left(\frac{1}{r} + n + n^r \right)$$

تمرین ۹-۳۳

با استفاده از دو تابع آزمون زیر:

$$A e^{-\alpha|x|} \quad (\bar{A})$$

$$A(1 + \alpha|x|)e^{-\alpha|x|} \quad (\bar{B})$$

و به وسیله روش وردشی، انرژی حالت پایه ذره‌ای به جرم m را که در حال حرکت در پتانسیل یک بعدی $V(x) = \lambda|x|$ است تخمین بزنید. α پارامتر مقیاس، λ ثابت و A ثابت بهنجارش است. نتایج به دست آمده را مقایسه کنید.

حل:

(آ)

ابتدا به محاسبه $E(\alpha) = \frac{\langle \phi_\alpha | \hat{H} | \phi_\alpha \rangle}{\langle \phi_\alpha | \phi_\alpha \rangle}$ می‌پردازیم. در اینجا داریم:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \lambda|x|$$

پس:

$$\langle \phi_\alpha | \hat{H} | \phi_\alpha \rangle = -\langle \phi_\alpha | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \phi_\alpha \rangle + \lambda \langle \phi_\alpha | |x| | \phi_\alpha \rangle$$

اما:

$$\begin{aligned} \langle \phi_\alpha | |x| | \phi_\alpha \rangle &= \int |x| |\phi_\alpha(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| |A|^2 e^{-2\alpha|x|} dx = 2|A|^2 \int_0^{+\infty} x e^{-2\alpha x} dx \\ &= 2|A|^2 \left[\frac{e^{-2\alpha x}}{-2\alpha} \left(x + \frac{1}{2\alpha} \right) \right]_0^{+\infty} = 2|A|^2 \left(\frac{1}{2\alpha^2} \right) = \frac{|A|^2}{\alpha^2} \end{aligned}$$

و:

$$\begin{aligned} -\langle \phi_\alpha | \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \phi_\alpha \rangle &= \frac{\hbar^2}{2m} \int \left| \frac{d\phi_\alpha(x)}{dx} \right|^2 dx = \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{-\alpha x}{|x|} A e^{-\alpha|x|} \right|^2 dx \\ &= \frac{2\hbar^2 \alpha^2 |A|^2}{2m} \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha x} dx = \frac{\hbar^2 \alpha^2 |A|^2}{m} \left[-\frac{e^{-2\alpha x}}{2\alpha} \right]_0^{+\infty} = \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha}{2m} \end{aligned}$$

و در نتیجه:

$$\langle \phi_\alpha | \hat{H} | \phi_\alpha \rangle = \frac{\lambda |A|^2}{\alpha^2} + \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha}{2m}$$

از طرفی:

$$\langle \phi_\alpha | \phi_\alpha \rangle = \int |\phi_\alpha(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\alpha|x|} dx = 2|A|^2 \int_0^{+\infty} e^{-2\alpha x} dx = \frac{|A|^2}{\alpha}$$

و بنابراین:

$$E(\alpha) = \frac{\lambda}{2\alpha} + \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m}$$

مقدار کمینه‌ی $E(\alpha)$ به‌ازای $\alpha = \left(\frac{\lambda m}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}}$ حاصل می‌شود و لذا:

$$E^{\text{VM}} = E(\alpha) = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\hbar^2}{\lambda m} \right)^{\frac{1}{3}} + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\lambda m}{\hbar^2} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \left(\frac{\lambda^2 \hbar^2}{m} \right)^{\frac{1}{3}}$$

(ب)

با توجه به تمرین (۹-۲۷) داریم:

$$\langle \psi_\alpha | \psi_\alpha \rangle = \frac{5|A|^2}{2\alpha}$$

$$\langle \psi_\alpha | \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} | \psi_\alpha \rangle = \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha}{4m}$$

از طرفی:

$$\begin{aligned} \langle \psi_\alpha | V(x) | \psi_\alpha \rangle &= \lambda \int |x| |\psi_\alpha(x)|^2 dx = \lambda \int_{-\infty}^{+\infty} |x| |A|^2 \left(1 + 2\alpha|x| + \alpha^2|x|^2 \right) e^{-2\alpha|x|} dx \\ &= 2\lambda |A|^2 \int_0^{+\infty} \left(x + 2\alpha x^2 + \alpha^2 x^3 \right) e^{-2\alpha x} dx = 2\lambda |A|^2 \left(\frac{1}{4\alpha^2} + \frac{2\alpha}{4\alpha^2} + \frac{\alpha^2}{16\alpha^4} \right) \\ &= \frac{13}{8} \frac{\lambda |A|^2}{\alpha^2} \end{aligned}$$

پس:

$$\langle \psi_\alpha | \hat{H} | \psi_\alpha \rangle = \langle \psi_\alpha | \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) | \psi_\alpha \rangle = \frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha}{4m} + \frac{13}{8} \frac{\lambda |A|^2}{\alpha^2}$$

در نتیجه:

$$E(\alpha) = \frac{\frac{\hbar^2 |A|^2 \alpha}{4m} + \frac{13 \lambda |A|^2}{8 \alpha^2}}{\frac{5 |A|^2}{2\alpha}} = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{10m} + \frac{13 \lambda}{20 \alpha}$$

مقدار کمینه $E(\alpha)$ به ازای $\alpha = \left(\frac{13 m \lambda}{4 \hbar^2} \right)^{\frac{1}{3}}$ حاصل می‌شود و پس:

$$E_{VM} = E(\alpha) = \frac{\hbar^2}{10m} \left(\frac{13 m \lambda}{4 \hbar^2} \right)^{\frac{2}{3}} + \frac{13 \lambda}{20} \left(\frac{4 \hbar^2}{13 m \lambda} \right)^{\frac{1}{3}} = \frac{3}{10} \left(\frac{13}{4} \right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{\lambda^2 \hbar^2}{m} \right)^{\frac{1}{3}}$$

ملاحظه می‌شود که در حالت (ب) مقدار E_{VM} بیشتر است و از آنجا که در روش وردشی، حد بالایی برای انرژی حالت پایه است لذا استفاده از تابع آزمون حالت (آ) جواب دقیق‌تری را به دست می‌دهد.

تمرین ۹-۳۴

سه ذره متمایز با جرم یکسان m در یک جعبه پتانسیل یک بعدی با دیوارهایی صلب در $x=0$ و $x=L$ محبوس هستند. اگر سه ذره در برابر پتانسیل جاذبه‌ای کوتاه بُرد ضعیف:

$$\hat{H}_p = -V_0 [\delta(x_1 - x_2) + \delta(x_2 - x_3) + \delta(x_3 - x_1)]$$

قرار بگیرند، با استفاده از اختلال مرتبه‌ی اول، ترازهای انرژی

(آ) حالت پایه و

(ب) نخستین حالت برانگیخته‌ی سیستم را

محاسبه کنید.

حل:

ویژه توابع و ویژه مقادیر انرژی، قبل از اعمال اختلال عبارتند از:

$$E_{n_1 n_2 n_3}^{(0)} = \frac{\hbar^2}{2mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

$$\phi_{n_1 n_2 n_3}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{2}{L} \right)^{\frac{3}{2}} \sin \left(\frac{n_1 \pi x_1}{L} \right) \sin \left(\frac{n_2 \pi x_2}{L} \right) \sin \left(\frac{n_3 \pi x_3}{L} \right)$$

حالت پایه فاقد تبهگنی است و انرژی $(E^{(0)})$ و ویژه تابع آن $(\phi(x_1, x_2, x_3))$ عبارتند از:

$$E_{\cdot}^{(0)} = E_{111} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} (1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L^2}$$

$$\phi_1(x_1, x_2, x_3) = \phi_{111}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_3}{L}\right)$$

اولین حالت برانگیخته دارای تبه‌گنی سه‌گانه است و انرژی و ویژه توابع آن که آنها را با $E_1^{(0)}$ ، $\phi_1(x_1, x_2, x_3)$ ، $\phi_2(x_1, x_2, x_3)$ و $\phi_3(x_1, x_2, x_3)$ نشان می‌دهیم عبارتند از:

$$E_1^{(0)} = E_{111} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} (1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L^2}$$

$$\phi_1(x_1, x_2, x_3) = \phi_{111}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_3}{L}\right)$$

$$\phi_2(x_1, x_2, x_3) = \phi_{112}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_3}{L}\right)$$

$$\phi_3(x_1, x_2, x_3) = \phi_{121}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_3}{L}\right)$$

با توجه به این توضیحات به ادامه کار می‌پردازیم:

(۱)

طبق نظریه‌ی اختلال غیرتبه‌گن داریم:

$$E_{\cdot} = E_{\cdot}^{(0)} + E_{\cdot}^{(1)}$$

که در این رابطه:

$$E_{\cdot}^{(1)} = \langle \phi_{\cdot} | \hat{H}_p | \phi_{\cdot} \rangle$$

پس:

$$\begin{aligned} E_{\cdot}^{(1)} &= \int \phi_{\cdot}^*(x_1, x_2, x_3) H_p(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= -\left(\frac{2}{L}\right)^3 V \int \sin^2\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi x_3}{L}\right) [\delta(x_1 - x_2) + \delta(x_2 - x_3) + \delta(x_3 - x_1)] dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= -\left(\frac{2}{L}\right)^3 V \left[\int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) dx_1 \int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) dx_2 + \int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) dx_1 \int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi x_3}{L}\right) dx_3 \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_1}{L} \right) dx_1 \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r = -r \left(\frac{r}{L} \right)^r V \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_1}{L} \right) dx_1 \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r \\
& = -\frac{r^r V}{L^r} \frac{L}{r} \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx = -\frac{r^{r-1} V}{L^r} \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx
\end{aligned}$$

اما:

$$\begin{aligned}
\int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx &= \int_0^L \left[\frac{1}{r} \left(1 - \cos \frac{r\pi x}{L} \right) \right]^r dx = \frac{1}{r} \int_0^L \left(1 - r \cos \frac{r\pi x}{L} + \cos^r \frac{r\pi x}{L} \right) dx \\
&= \frac{1}{r} \left(x - \frac{rL}{r\pi} \sin \frac{r\pi x}{L} \right) \Big|_0^L + \frac{1}{r} \int_0^L \left(1 + \cos \frac{r\pi x}{L} \right) dx = \frac{L}{r} + \frac{L}{r} = \frac{2L}{r}
\end{aligned}$$

پس:

$$E_{\cdot}^{(1)} = -\frac{r^{r-1} V}{L^r} \frac{2L}{r} = -\frac{2}{r} \frac{V}{L}$$

و لذا:

$$E_{\cdot} = \frac{r^r \hbar^2 \pi^2}{2mL^r} - \frac{2}{r} \frac{V}{L}$$

(ب)

برای بررسی مورد تبه‌گن باید ماتریس زیر قطری شود (یا به عبارتی ویژه مقادیر آن یافته شود):

$$V = \begin{pmatrix} V_{11} & V_{1r} & V_{1r} \\ V_{r1} & V_{rr} & V_{rr} \\ V_{r1} & V_{rr} & V_{rr} \end{pmatrix}$$

که در آن:

$$\begin{aligned}
V_{11} &= \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle \\
&= \int -V \left(\frac{r}{L} \right)^r \sin^r \left(\frac{r\pi x_1}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) \left[\delta(x_1 - x_r) + \delta(x_r - x_r) + \delta(x_r - x_1) \right] dx_1 dx_r dx_r \\
&= -V \left(\frac{r}{L} \right)^r \left[\int_0^L \sin^r \left(\frac{r\pi x_r}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r + \int_0^L \sin^r \left(\frac{r\pi x_1}{L} \right) dx_1 \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r \right. \\
&\quad \left. + \int_0^L \sin^r \left(\frac{r\pi x_1}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\pi x_1}{L} \right) dx_1 \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r \right]
\end{aligned}$$

اما:

$$\begin{aligned}
\int_0^L \sin^r \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx &= \int_0^L \frac{1}{r} \left[1 - \cos \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) \right]^r \left[1 - \cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) \right] dx \\
&= \frac{1}{r} \int_0^L \left[1 - \cos \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) - \cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) + \cos \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) \cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) \right] dx \\
&= \frac{1}{r} \left[x - \frac{L}{\gamma \pi} \sin \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) - \frac{L}{\pi} \sin \left(\frac{\pi x}{L} \right) \right]_0^L + \frac{1}{r} \int_0^L \cos \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) \cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) dx \\
&= \frac{L}{r} + \frac{1}{r} \int_0^L \left[\cos \left(\frac{\gamma \pi x}{L} \right) + \cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) \right] dx \\
&= \frac{L}{r} + \frac{1}{r} \left[\frac{L}{\gamma \pi} \sin \frac{\gamma \pi x}{L} + \frac{L}{\pi} \sin \frac{\pi x}{L} \right]_0^L = \frac{L}{r}
\end{aligned}$$

نذا:

$$V_{11} = -\frac{\gamma V}{L^r} \left(\frac{L}{r} + \frac{\gamma L}{\lambda} + \frac{L}{r} \right) = -\frac{\gamma V}{rL}$$

به همین ترتیب:

$$V_{rr} = \langle \phi | \hat{H}_p | \phi \rangle = V_{rr} = \langle \phi | \hat{H}_p | \phi \rangle = -\frac{\gamma V}{rL}$$

اما:

$$\begin{aligned}
V_{1r} &= \langle \phi | \hat{H}_p | \phi \rangle \\
&= -V \cdot \left(\frac{\gamma}{L} \right)^r \int \sin \left(\frac{\pi x_1}{L} \right) \sin \left(\frac{\gamma \pi x_1}{L} \right) \sin \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) \sin \left(\frac{\gamma \pi x_r}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) \\
&\quad \times [\delta(x_1 - x_r) + \delta(x_r - x_1) + \delta(x_r - x_1)] dx_1 dx_r dx_r = -V \cdot \left(\frac{\gamma}{L} \right)^r \left[\int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) \sin^r \left(\frac{\gamma \pi x_r}{L} \right) dx_r \right. \\
&\quad \times \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r + \int_0^L \sin \left(\frac{\pi x_1}{L} \right) \sin \left(\frac{\gamma \pi x_1}{L} \right) dx_1 \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) dx_r \\
&\quad \left. + \int_0^L \sin^r \left(\frac{\pi x_1}{L} \right) \sin \left(\frac{\gamma \pi x_1}{L} \right) dx_1 \int_0^L \sin \left(\frac{\pi x_r}{L} \right) \sin \left(\frac{\gamma \pi x_r}{L} \right) dx_r \right] = -\frac{\gamma V}{L^r} \left(\frac{L}{r} + \dots \right) = -\frac{V}{L} \\
&= V_{r1} = V_{rr} = V_{r1} = V_{rr} = V_{rr}
\end{aligned}$$

یعنی:

$$V = \frac{-V}{rL} \begin{pmatrix} \gamma & \gamma & \gamma \\ \gamma & \gamma & \gamma \\ \gamma & \gamma & \gamma \end{pmatrix}$$

از قطری کردن V نتیجه می‌شود که ویژه مقادیر آن عبارتند از:

$$\frac{-5V}{2L}, \frac{-11V}{2L}$$

که در این بین ویژه مقدار $\frac{-5V}{2L}$ تبهگنی دوگانه دارد. لذا تا تصحیح مرتبه‌ی اول در اثر اختلال، سطح انرژی اولین حالت برانگیخته به دو سطح $\frac{3\hbar^2\pi^2}{m} - \frac{11V}{L}$ ، $\frac{3\hbar^2\pi^2}{m} - \frac{5V}{2L}$ شکافته می‌شود که سطح $\frac{3\hbar^2\pi^2}{m} - \frac{5V}{2L}$ تبهگنی دوگانه دارد.

تمرین ۹-۳۵

سه ذره متمایز با جرم یکسان m در پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بعدی $\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x_i^2 \right)$ قرار دارند. اگر سه ذره در پتانسیل جاذبه‌ای کوتاه بُرد ضعیف

$$\hat{H}_p = -V_0 [\delta(x_1 - x_2) + \delta(x_2 - x_3) + \delta(x_3 - x_1)]$$

قرار بگیرند، با استفاده از اختلال مرتبه‌ی اول، ترازهای انرژی (آ) حالت پایه و

(ب) نخستین حالت برانگیخته‌ی سیستم را محاسبه کنید.

حل:

ویژه توابع و ویژه مقادیر $\hat{H}_0$ عبارتند از:

$$E_{n_1 n_2 n_3}^{(0)} = \hbar \omega \left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2} \right)$$

$$\phi_{n_1 n_2 n_3}(x_1, x_2, x_3) = \phi_{n_1}(x_1) \phi_{n_2}(x_2) \phi_{n_3}(x_3)$$

به طوری که $\phi_{n_i}(x_i)$ ویژه تابع ذره i ام است وقتی که به تنهایی در پتانسیل $\frac{1}{2} m \omega^2 x_i^2$ واقع شده باشد.

حالت پایه فاقد تبهگنی است. انرژی $(E_0^{(0)})$ و ویژه تابع آن $(\phi_0(x_1, x_2, x_3))$ عبارتند از:

$$E_0^{(0)} = E_{000}^{(0)} = \frac{3}{2} \hbar \omega$$

$$\phi_0(x_1, x_2, x_3) = \phi_{000}(x_1, x_2, x_3) = \phi_0(x_1) \phi_0(x_2) \phi_0(x_3)$$

اما اولین حالت برانگیخته دارای تبهگنی سه‌گانه است. انرژی و ویژه توابع آن که آنها را با $E_1^{(0)}$ ، $\phi_1(x_1, x_2, x_3)$ ، $\phi_2(x_1, x_2, x_3)$ و $\phi_3(x_1, x_2, x_3)$ نشان می‌دهیم، عبارتند از:

$$E_1^{(0)} = \frac{5}{2} \hbar \omega$$

$$\phi_1(x_1, x_r, x_r) = \phi_{1..}(x_1, x_r, x_r) = \phi_1(x_1) \phi_1(x_r) \phi_1(x_r)$$

$$\phi_r(x_1, x_r, x_r) = \phi_{..1}(x_1, x_r, x_r) = \phi_1(x_1) \phi_1(x_r) \phi_1(x_r)$$

$$\phi_r(x_1, x_r, x_r) = \phi_{..1}(x_1, x_r, x_r) = \phi_1(x_1) \phi_1(x_r) \phi_1(x_r)$$

بنا به این توضیحات:

(i)

طبق نظریه اختلال غیر تبه‌گن داریم:

$$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)}$$

که:

$$E_1^{(1)} = \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle$$

پس:

$$\begin{aligned} E_1^{(1)} &= \int \phi_1^*(x_1, x_r, x_r) H_p(x_1, x_r, x_r) dx_1 dx_r dx_r \\ &= -V \int \phi_1^*(x_1) \phi_1^*(x_r) \phi_1^*(x_r) [\delta(x_1 - x_r) + \delta(x_r - x_r) + \delta(x_r - x_1)] dx_1 dx_r dx_r \\ &= -V \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x_r) dx_r \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x_r) dx_r + \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x_1) dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x_r) dx_r \right. \\ &\quad \left. + \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x_1) dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x_r) dx_r \right] = -3V \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x) dx \end{aligned}$$

اما:

$$\phi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} x}} \exp\left(\frac{-x^2}{2x^2}\right)$$

که در این رابطه داریم:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{mw}}$$

پس:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^*(x) dx = \frac{1}{\pi x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(\frac{-x^2}{x^2}\right) dx = \frac{1}{\pi x^2} \sqrt{\frac{\pi x^2}{2}} = \left(\frac{1}{2\pi x^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

پس:

$$E_{\cdot}^{(1)} = -\gamma V_{\cdot} \left(\frac{1}{\gamma \pi x_{\cdot}^{\gamma}} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{-\gamma}{\sqrt{\gamma \pi}} \frac{V_{\cdot}}{x_{\cdot}}$$

و لذا:

$$E_{\cdot} = \frac{\gamma}{\gamma} \hbar \omega - \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma \pi}} \frac{V_{\cdot}}{x_{\cdot}}$$

(ب)

برای بررسی مورد تبه‌گن، باید ماتریس زیر قطری شود (یا به عبارتی ویژه مقادیر آن یافته شود):

$$V = \begin{pmatrix} V_{11} & V_{1\gamma} & V_{1\gamma} \\ V_{\gamma 1} & V_{\gamma\gamma} & V_{\gamma\gamma} \\ V_{\gamma 1} & V_{\gamma\gamma} & V_{\gamma\gamma} \end{pmatrix}$$

که در آن:

$$\begin{aligned} V_{11} &= \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_1 \rangle \\ &= -V_{\cdot} \int \phi_1^{\gamma}(x_1) \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) [\delta(x_1 - x_{\gamma}) + \delta(x_{\gamma} - x_{\gamma}) + \delta(x_{\gamma} - x_1)] dx_1 dx_{\gamma} dx_{\gamma} \\ &= -V_{\cdot} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) dx_{\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) dx_{\gamma} + \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x_1) dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) dx_{\gamma} \right. \\ &\quad \left. + \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x_1) \phi_1^{\gamma}(x_1) dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x_{\gamma}) dx_{\gamma} \right] = -V_{\cdot} \left(\frac{1}{x_{\cdot} \sqrt{\gamma \pi}} + \gamma \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x) \phi_1^{\gamma}(x) dx \right) \end{aligned}$$

اما:

$$\phi_1(x) = \sqrt{\frac{\gamma}{\sqrt{\pi x_{\cdot}^{\gamma}}}} x \exp\left(\frac{-x^{\gamma}}{\gamma x_{\cdot}^{\gamma}}\right)$$

پس:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1^{\gamma}(x) \phi_1^{\gamma}(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi x_{\cdot}^{\gamma}}}} \sqrt{\frac{\gamma}{\sqrt{\pi x_{\cdot}^{\gamma}}}} x \exp\left(\frac{-x^{\gamma}}{\gamma x_{\cdot}^{\gamma}}\right) \right]^{\gamma} dx = \frac{\gamma}{\pi x_{\cdot}^{\gamma}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^{\gamma} \exp\left(\frac{-\gamma x^{\gamma}}{x_{\cdot}^{\gamma}}\right) dx \\ &= \frac{\gamma}{\pi x_{\cdot}^{\gamma}} \frac{1}{\gamma} \frac{x_{\cdot}^{\gamma}}{\gamma} \left(\frac{\pi x_{\cdot}^{\gamma}}{\gamma} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{1}{\gamma x_{\cdot} \sqrt{\gamma \pi}} \end{aligned}$$

پس:

$$V_{11} = -V \cdot \left(\frac{1}{x \cdot \sqrt{2\pi}} + \frac{2}{2x \cdot \sqrt{2\pi}} \right) = -\frac{V}{x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

به همین ترتیب:

$$V_{rr} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = V_{rr} = \langle \phi_r | \hat{H}_p | \phi_r \rangle = -\frac{V}{x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

اما:

$$\begin{aligned} V_{1r} &= \langle \phi_1 | \hat{H}_p | \phi_r \rangle \\ &= -V \cdot \int \phi_1(x_1) \phi_1(x_1) \phi_r(x_r) \phi_r(x_r) \phi_r^*(x_r) [\delta(x_1 - x_r) + \delta(x_r - x_r) + \delta(x_r - x_1)] dx_1 dx_r dx_r \\ &= -V \cdot \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_r^*(x_r) \phi_r^*(x_r) dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_r^*(x_r) dx_r + \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1(x_1) \phi_1(x_1) dx_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_r^*(x_r) \phi_r(x_r) dx_r \right. \\ &\quad \left. + \int \phi_r^*(x_1) \phi_1(x_1) dx_1 \int \phi_1(x_r) \phi_1(x_r) dx_r \right] = -V \cdot \left(\frac{1}{2x \cdot \sqrt{2\pi}} + 0 + 0 \right) = -\frac{V}{4x} \sqrt{\frac{2}{\pi}} = V_{r1} \end{aligned}$$

به همین ترتیب:

$$V_{1r} = V_{r1} = V_{rr} = V_{rr} = -\frac{V}{4x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

بنابراین برای یافتن تصحیح مرتبه اول انرژی باید ویژه مقادیر ماتریس زیر را بیابیم:

$$V = \frac{-V}{4x} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

ویژه مقادیر این ماتریس عبارتند از:

$$\frac{V}{x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \frac{5V}{2x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}, -\frac{3V}{2x} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

بنابراین سطح انرژی اولین حالت برانگیخته در اثر اختلال تا تصحیح مرتبه اول به سه سطح با

$$\text{انرژی های } \frac{5}{2} \hbar \omega + \frac{5V}{2x \sqrt{2\pi}}, \frac{5}{2} \hbar \omega + \frac{5V}{2x \sqrt{2\pi}} \text{ و } \frac{5}{2} \hbar \omega - \frac{3V}{2x \sqrt{2\pi}} \text{ تجزیه می شود.}$$

تمرین ۹-۳۶

یک پوزیترونیم را در نظر بگیرید که در یک میدان مغناطیسی ضعیف در صفحه xy مدار ترازهای انرژی حالت $n=2$ را تا اختلال مرتبه اول محاسبه کنید.

$\vec{B} = B(\vec{i} + \vec{k})$ قرار دارد و در آن B یک ثابت کوچک است. با نادیده گرفتن برهم کنش اسپین-مدار

حل:

با صرف نظر کردن از اندرکنش اسپین - مدار و با فرض ثابت بودن میدان مغناطیسی می توان هامیلتونی سیستم را به صورت زیر نوشت:

$$\hat{H} = \frac{\vec{p}^2}{2\mu} + V(r) + \frac{e}{2\mu c} \vec{B} \cdot \vec{L} + \frac{e^2}{4\mu c^2} \left[B^2 r^2 - (\vec{B} \cdot \vec{r})^2 \right]$$

چون $\vec{B}$ ناچیز است لذا می توان از عبارت شامل B^2 صرف نظر کرد. پس:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$$

که:

$$\hat{H}_0 = \frac{p^2}{2\mu} + V(r)$$

$$\hat{H}_p = \frac{e}{2\mu c} \vec{B} \cdot \vec{L} = \frac{eB}{2\mu c} (\hat{L}_x + \hat{L}_z)$$

در غیاب میدان اولین حالت برانگیخته ($n=2$) تبهگنی چهارگانه دارد. حالت های $|200\rangle$ ، $|210\rangle$ ،

$$|211\rangle \text{ و } |21-1\rangle \text{ دارای انرژی یکسان } E_2 = -\frac{E_1}{4} \text{ هستند که در این رابطه } E_1 = \frac{\mu e^2}{2\hbar^2} = 6.8 \text{ eV}$$

برای یافتن تصحیح مرتبه ی اول انرژی باید ویژه مقادیر ماتریس $\hat{H}_p$ را که در زیر فضای ویژه حالات اولین حالت برانگیخته نوشته شده است بیابیم، یعنی باید ماتریس زیر قطری شود:

$$H_p = \begin{pmatrix} \langle 1 | \hat{H}_p | 1 \rangle & \langle 1 | \hat{H}_p | 2 \rangle & \langle 1 | \hat{H}_p | 3 \rangle & \langle 1 | \hat{H}_p | 4 \rangle \\ \langle 2 | \hat{H}_p | 1 \rangle & \langle 2 | \hat{H}_p | 2 \rangle & \langle 2 | \hat{H}_p | 3 \rangle & \langle 2 | \hat{H}_p | 4 \rangle \\ \langle 3 | \hat{H}_p | 1 \rangle & \langle 3 | \hat{H}_p | 2 \rangle & \langle 3 | \hat{H}_p | 3 \rangle & \langle 3 | \hat{H}_p | 4 \rangle \\ \langle 4 | \hat{H}_p | 1 \rangle & \langle 4 | \hat{H}_p | 2 \rangle & \langle 4 | \hat{H}_p | 3 \rangle & \langle 4 | \hat{H}_p | 4 \rangle \end{pmatrix}$$

که در این رابطه:

$$|1\rangle = |200\rangle , |2\rangle = |211\rangle , |3\rangle = |210\rangle , |4\rangle = |21-1\rangle$$

پس:

$$\hat{H}_p = \frac{eB\hbar}{2\mu c} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

نظری کردن این ماتریس به ویژه مقادیر زیر منجر می‌شود:

$$E_{r_1}^{(1)} = -\frac{\sqrt{2}eB\hbar}{2\mu c}, \quad E_{r_2}^{(1)} = E_{r_3}^{(1)} = 0, \quad E_{r_4}^{(1)} = \frac{\sqrt{2}eB\hbar}{2\mu c}$$

بنابراین، سطوح انرژی حالات $n=2$ تا مرتبه‌ی اول توسط روابط زیر داده می‌شوند:

$$E_{r_1} = -\frac{E_1}{4} - \frac{\sqrt{2}eB\hbar}{2\mu c}$$

$$E_{r_2} = E_{r_3} = -\frac{E_1}{4}$$

$$E_{r_4} = -\frac{E_1}{4} + \frac{\sqrt{2}eB\hbar}{2\mu c}$$

تمرین ۹-۳۷

یک فرفره‌ی متقارن کروی با گشتاورهای لختی اصلی I را در نظر بگیرید.

(آ) ترازهای انرژی فرفره را پیدا کنید.

(ب) با فرض این که فرفره در حالت تکانه‌ی زاویه‌ای $l=1$ باشد. انرژی آن را تا اختلال مرتبه‌ی اول

هنگامی که یک اختلال ضعیف $\hat{H}_p = \frac{\varepsilon}{I}(\hat{L}_x^2 - \hat{L}_y^2)$ به آن افزوده شود بیابید.

حل:
(آ)

در اینجا هامیلتونی سیستم عبارتست از:

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

پس $|l, m_l\rangle$ ها ویژه حالت‌های انرژی هستند که انرژی متناظر آنها عبارتند از:

$$E_l^{(0)} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$$

(ب)

$l=1$ متناظر با سه حالت تبهگنی $|1, 1\rangle$ ، $|1, 0\rangle$ و $|1, -1\rangle$ است. بنابراین، تصحیح مرتبه‌ی اول انرژی در واقع همان ویژه مقادیر عملگر $\hat{H}_p$ است که در پایه ویژه حالات $l=1$ نوشته شده است یعنی:

$$H_p = \begin{pmatrix} \langle 1, 1 | \hat{H}_p | 1, 1 \rangle & \langle 1, 1 | \hat{H}_p | 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 | \hat{H}_p | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | \hat{H}_p | 1, 1 \rangle & \langle 1, 0 | \hat{H}_p | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | \hat{H}_p | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | \hat{H}_p | 1, 1 \rangle & \langle 1, -1 | \hat{H}_p | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | \hat{H}_p | 1, -1 \rangle \end{pmatrix}$$

اما برای $l=1$ داریم:

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

بنابراین با یافتن L_x^2 و L_y^2 نتیجه می‌شود که:

$$\hat{H}_p = \frac{\varepsilon \hbar^2}{I} \begin{pmatrix} 1-1 & 0 & 1-(-1) \\ 0 & 2-2 & 0 \\ 1-(-1) & 0 & 1-1 \end{pmatrix} = \frac{\varepsilon \hbar^2}{2I} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

از قطری کردن این ماتریس ویژه مقادیر زیر حاصل می‌شود:

$$E_{11}^{(1)} = -\frac{\varepsilon \hbar^2}{I}, \quad E_{12}^{(1)} = 0, \quad E_{13}^{(1)} = \frac{\varepsilon \hbar^2}{I}$$

بنابراین، سطوح انرژی حالات $n=2$ تا مرتبه‌ی اول توسط روابط زیر داده می‌شوند:

$$E_{11} = E_{11}^{(0)} + E_{11}^{(1)} = \frac{\hbar^2}{I} - \frac{\varepsilon \hbar^2}{I} = \frac{\hbar^2}{I} (1 - \varepsilon)$$

$$E_{12} = E_{12}^{(0)} + E_{12}^{(1)} = \frac{\hbar^2}{I} + 0 = \frac{\hbar^2}{I}$$

$$E_{13} = E_{13}^{(0)} + E_{13}^{(1)} = \frac{\hbar^2}{I} + \frac{\varepsilon \hbar^2}{I} = \frac{\hbar^2}{I} (1 + \varepsilon)$$

تمرین ۹-۳۸

مقدارهای تقریبی انرژی حالت پایه‌ی ذره‌ای به جرم m را که در حال حرکت در پتانسیل $V(x) = V_0 |x|$ ($V_0 > 0$) است، با استفاده از: (آ) روش وردشی و (ب) تقریب WKB تخمین بزنید و دو نتیجه را مقایسه کنید.

حل:

(آ)

طبق تمرین ۹-۲۳، استفاده از روش وردشی و استفاده از تابع آزمون $\phi_a(x) = A e^{-a|x|}$ نتیجه می‌شود:

$$E_{\cdot}^{VM} = \frac{3}{2\sqrt{4}} \left(\frac{V_0 \hbar}{m} \right)^{\frac{1}{3}}$$

(ب)

در تقریب WKB باید از روابط زیر استفاده شود:

$$\oint p(x, E_n) dx = 2 \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2m(E_n - V(x))} dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) h$$

که x_1 و x_2 نقاط بازگشت هستند که از رابطه‌ی $E = V(x)$ به دست می‌آیند. پس:

$$-x_1 = x_2 = \frac{E}{V}$$

لذا:

$$\begin{aligned} \left(n + \frac{1}{2}\right) h &= 2 \int_{-x_2}^{x_2} \sqrt{2m(E_n - V(x))} dx = 4 \int_0^{x_2} \sqrt{2m(E_n - V(x))} dx \\ &= -\frac{4}{2mV} \left[\left(2m(E_n - V(x)) \right)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{x_2} \\ &= +\frac{4}{2mV} (2mE_n)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

و در نتیجه:

$$E_n = \frac{1}{2m} \left[\frac{2mV}{4} \left(n + \frac{1}{2}\right) h \right]^{\frac{2}{3}}$$

$$E_n = \frac{1}{2} \left(\frac{h^2}{m} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{V}{4} \right)^{\frac{2}{3}}$$

خواننده می‌تواند به مقایسه‌ی دو روش پردازد.

تمرین ۹-۳۹

تصحیح نسبیتی حالت پایه‌ی یک ذره‌ی بدون اسپین به جرم m را که در حال حرکت در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک بُعدی می‌باشد تا مرتبه‌ی اول اختلال محاسبه کنید. (راهنمایی: ابتدا لازم است نشان دهید که هامیلتونی را می‌توان به صورت $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$ نوشت که در آن

$$\hat{H}_p = -\frac{\hat{p}^2}{8m^2 c^2} \quad \text{و} \quad \hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2}$$

اختلال در نظر گرفته شود.)

حل:

طبق نظریه‌ی اختلال غیرتبهگن، تا مرتبه‌ی اول اختلال داریم:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

که:

$$E_n^{(0)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

$$E_n^{(1)} = \langle \phi_n | \hat{H}_p | \phi_n \rangle$$

$|\phi_n\rangle$ ویژه حالت مربوط به سطح n ام نوسانگر هماهنگ یک بعدی است. طبق رابطه‌ی (۴-۱۸۵)

داریم:

$$\begin{aligned} \hat{p}^\dagger |\phi_n\rangle &= -\frac{m\hbar\omega}{2} \left(\hat{a}^\dagger + \hat{a}^{\dagger\dagger} - 2\hat{a}^\dagger \hat{a} - 1 \right) |\phi_n\rangle \\ &= -\frac{m\hbar\omega}{2} \left(\sqrt{n}\sqrt{n-1} |\phi_{n-2}\rangle + \sqrt{n+1}\sqrt{n+2} |\phi_{n+2}\rangle - (2n+1) |\phi_n\rangle \right) \end{aligned}$$

با تعریف $|\beta\rangle \equiv \hat{p}^\dagger |\phi_n\rangle$ ، نتیجه می‌شود که:

$$\begin{aligned} \langle \phi_n | \hat{p}^\dagger | \phi_n \rangle &= \langle \beta | \beta \rangle = \left(\frac{m\hbar\omega}{2} \right)^2 \left(n(n-1) + (n+1)(n+2) + (2n+1)^2 \right) \\ &= \left(\frac{m\hbar\omega}{2} \right)^2 (6n^2 + 6n + 2) \end{aligned}$$

پس:

$$E_n^{(1)} = -\frac{1}{\lambda m^{\frac{1}{2}} c^{\frac{1}{2}}} \langle \phi_n | \hat{p}^\dagger | \phi_n \rangle = \frac{2m^{\frac{1}{2}} \hbar^{\frac{1}{2}} \omega^{\frac{1}{2}}}{\lambda m^{\frac{1}{2}} c^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{-1}{\lambda m^{\frac{1}{2}} c^{\frac{1}{2}}} \right) (2n^2 + 2n + 1) = -\frac{2}{\lambda^2} \frac{\hbar^{\frac{1}{2}} \omega^{\frac{1}{2}}}{m c^{\frac{1}{2}}} (2n^2 + 2n + 1)$$

تمرین ۹-۴۰

یک اتم هیدروژن را در نظر بگیرید که در اختلال کوچک $\hat{H}_p = \lambda r^2$ قرار دارد. با استفاده از نظریه‌ی اختلال مرتبه‌ی اول تصحیح‌های انرژی را برای

(آ) حالت پایه و

(ب) حالت $2P$

محاسبه کنید.

حل:

طبق رابطه‌ی (۹-۹۰) با صرف نظر کردن از اندرکنش اسپین - مدار، انرژی اتم هیدروژن از رابطه‌ی

زیر به دست می‌آید:

$$E_{nl}^{(0)} = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{n} \left(\frac{2}{2l+1} - \frac{3}{4n} \right) \right]$$

و ویژه حالت‌ها نیز همان ϕ_{nlm} ها هستند. بنا به این توضیحات:

(آ)

حالت پایه به ازای $l=0$ و $n=1$ حاصل می‌شود. بنابراین حالت پایه، فاقد تبهگنی است و لذا تا تصحیح مرتبه‌ی اول داریم:

$$E_{1,0} = E_{1,0}^{(0)} + E_{1,0}^{(1)}$$

به طوری که:

$$E_{1,0}^{(0)} = \frac{-13.6 \text{ eV}}{1^2} \left[1 + \frac{\alpha^2}{1} \left(\frac{2}{2 \times 0 + 1} - \frac{3}{4 \times 1} \right) \right] = -13.6 \text{ eV} \left(1 + \frac{5}{4} \alpha^2 \right)$$

و:

$$E_{1,0}^{(1)} = \langle \phi_{1,0} | \hat{H}_p | \phi_{1,0} \rangle$$

حال به محاسبه‌ی $E_{1,0}^{(1)}$ می‌پردازیم:

$$E_{1,0}^{(1)} = \langle \phi_{1,0} | \lambda r^2 | \phi_{1,0} \rangle = \lambda \langle R_{1,0} | r^2 | R_{1,0} \rangle \langle Y_{0,0} | Y_{0,0} \rangle = \lambda \langle R_{1,0} | r^2 | R_{1,0} \rangle$$

طبق رابطه‌ی (۶-۱۸۱) داریم:

$$\langle R_{1,0} | r^2 | R_{1,0} \rangle = \frac{1}{4} (1)^2 \left[5 \times 1^2 + 1 - 3 \times - (0 + 1) \right] a_0^2 = 3a_0^2$$

پس:

$$E_{1,0}^{(1)} = 3\lambda a_0^2$$

و بنابراین:

$$E_{1,0} = -13.6 \text{ eV} \left(1 + \frac{5}{4} \alpha^2 \right) + 3\lambda a_0^2$$

(ب)

حالت $2p$ که معادل با $n=2$ و $l=1$ است، دارای تبهگنی سه‌گانه و انرژی مربوط به آن $E_{2,1}^{(0)} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{4} \left(1 + \frac{7}{48} \alpha^2 \right)$ است و ویژه حالت‌های آن $\phi_{2,1,0}$ ، $\phi_{2,1,1}$ و $\phi_{2,1,-1}$ می‌باشند. بنابراین تصحیح مرتبه‌ی اول در واقع ویژه مقادیر ماتریس $\hat{H}_p$ است که به صورت زیر می‌باشد:

$$\hat{H}_p = \begin{pmatrix} \langle \phi_{r11} | \hat{H}_p | \phi_{r11} \rangle & \langle \phi_{r11} | \hat{H}_p | \phi_{r10} \rangle & \langle \phi_{r11} | \hat{H}_p | \phi_{r1-1} \rangle \\ \langle \phi_{r10} | \hat{H}_p | \phi_{r11} \rangle & \langle \phi_{r10} | \hat{H}_p | \phi_{r10} \rangle & \langle \phi_{r10} | \hat{H}_p | \phi_{r1-1} \rangle \\ \langle \phi_{r1-1} | \hat{H}_p | \phi_{r11} \rangle & \langle \phi_{r1-1} | \hat{H}_p | \phi_{r10} \rangle & \langle \phi_{r1-1} | \hat{H}_p | \phi_{r1-1} \rangle \end{pmatrix}$$

اما:

$$\langle \phi_{r1m} | \hat{H}_p | \phi_{r1m'} \rangle = \langle \phi_{r1m} | \lambda r^2 | \phi_{r1m'} \rangle = \lambda \langle R_{r1} | r^2 | R_{r1} \rangle \langle Y_{1m} | Y_{1m'} \rangle = \lambda \langle R_{r1} | r^2 | R_{r1} \rangle \delta_{mm'}$$

از طرفی طبق رابطه‌ی (۶-۱۸۱) داریم:

$$\langle R_{r1} | r^2 | R_{r1} \rangle = \frac{1}{\gamma} \left(\gamma^2 \left[5 \times \gamma^2 + 1 - 2 \times 1(1+1) \right] a^2 \right) = 3 \cdot a^2$$

پس:

$$\hat{H}_p = 3 \cdot \lambda a^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

قطری کردن $\hat{H}_p$ ، تصحیح مرتبه‌ی اول را نتیجه می‌دهد:

$$E_{r1_1}^{(1)} = E_{r1_2}^{(1)} = E_{r1_3}^{(1)} = 3 \cdot \lambda a^2$$

و لذا:

$$E_{r1_1} = E_{r1_2} = E_{r1_3} = E_{r1}$$

که:

$$E_{r1} = -\frac{13/6 eV}{4} \left(1 + \frac{\gamma}{4\lambda} \alpha^2 \right) + 3 \cdot \lambda a^2$$

تمرین ۹-۴۱

(آ) سهم ناشی از برهم‌کنش اسپین - مدار را برای حالت برانگیخته‌ی n ام یک اتم پوزیترونیم تا اختلال مرتبه‌ی اول محاسبه کنید.

(ب) با استفاده از نتیجه‌ی قسمت (آ) مقدارهای عددی را برای جمله‌های تصحیح اسپین - مدار و برای تراز $2P$ بدست آورید و آنها را با انرژی تراز $n=2$ مقایسه کنید.

حل:

(۱)

در اینجا هامیلتونی سیستم را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} + \frac{e^2}{2m_e c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L}$$

چون $\mu = \frac{m_e}{2}$ لذا:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r} + \frac{e^2}{2(2\mu) c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} = \hat{H}_0 + \hat{H}_p$$

بدطوری که:

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}$$


$$\hat{H}_p = \frac{e^2}{2\mu c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L}$$

لذا در تشابه با بحثی که در مورد اتم هیدروژن صورت گرفت، نتیجه می‌شود که:

$$E_{SO}^{(1)} = \frac{e^2 \hbar^2}{2\mu c^2 (2c)^2} \left[\frac{j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}}{n^2 l(l+1)(2l+1)(2a_0)^2} \right] = \frac{\alpha^2 m_e c^2}{16 n^2} \left[\frac{j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}}{l(l+1)(2l+1)} \right]$$

(ب)

برای سطح $2p$ ، $n=2$ و $l=1$ می‌باشد و چون $S = \frac{1}{2}$ است لذا j مقادیر $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{2}$ را خواهد داشت و بنابراین بدصورت شماتیک خواهیم داشت:



بدطوری که:

$$\Delta\epsilon = \frac{\alpha^2 m_e c^2}{16 (2)^2} \left[\frac{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - 1(1+1) - \frac{3}{4}}{1(1+1)(2 \times 1+1)} \right] = \frac{\alpha^2 m_e c^2}{768} \approx 1/9 \times 10^{-6} \text{ eV}$$

از طرفی:

$$E_r^{(1)} = -\frac{e^2/4\pi\epsilon_0}{r^2} = -1.7 \text{ eV}$$

در نتیجه، این تصحیح انرژی بسیار ناچیز و تقریباً از مرتبه 10^{-6} می باشد.

تمرین ۹-۴۲

با نادیده گرفتن اسپین الکترون، انرژی تراز $n=2$ یک اتم هیدروژن را هنگامی که در یک میدان چهارقطبی ضعیف $\hat{H}_p = iQ(y^2 - x^2)$ قرار دارد تا اختلال مرتبه اول محاسبه کنید، (Q یک عدد حقیقی کوچک است، $Q \ll 1$).

حل:

در غیاب میدان خارجی و با صرف نظر کردن از اسپین الکترون، انرژی حالت $n=2$ تبهگنی چهارگانه دارد و چهار حالت $|nlm\rangle = |200\rangle, |211\rangle, |210\rangle, |21-1\rangle$ همگی دارای انرژی $E_r = -\frac{R}{4}$ می باشند که R ثابت ریدبرگ است که مقداری برابر با 13.6 eV دارد. تصحیح مرتبه اول انرژی برای این حالت در واقع همان ویژه مقادیر ماتریس $\hat{H}_p$ است. به طوری که:

$$H_p = \begin{pmatrix} \langle 200 | \hat{H}_p | 200 \rangle & \langle 200 | \hat{H}_p | 211 \rangle & \langle 200 | \hat{H}_p | 210 \rangle & \langle 200 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle \\ \langle 211 | \hat{H}_p | 200 \rangle & \langle 211 | \hat{H}_p | 211 \rangle & \langle 211 | \hat{H}_p | 210 \rangle & \langle 211 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle \\ \langle 210 | \hat{H}_p | 200 \rangle & \langle 210 | \hat{H}_p | 211 \rangle & \langle 210 | \hat{H}_p | 210 \rangle & \langle 210 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle \\ \langle 21-1 | \hat{H}_p | 200 \rangle & \langle 21-1 | \hat{H}_p | 211 \rangle & \langle 21-1 | \hat{H}_p | 210 \rangle & \langle 21-1 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle \end{pmatrix}$$

با توجه به اینکه $|2lm\rangle$ ها به ازای l زوج (فرد) دارای پاریته زوج (فرد) هستند و از آنجا که $\hat{H}_p$ تحت پاریته، زوج است لذا $\langle 2lm | \hat{H}_p | 2l'm' \rangle$ فقط وقتی غیر صفر است که l و l' برابر باشند. با توجه به این توضیحات و چون:

$$\begin{aligned} \hat{H}_p &= iQ(y^2 - x^2) = iQ(r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi - r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi) \\ &= -Qr^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi = -\frac{iQr^2}{2} (\sin^2 \theta e^{2i\varphi} + \sin^2 \theta e^{-2i\varphi}) \\ &= -\frac{iQr^2}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (Y_{22}(\Omega) + Y_{2-2}(\Omega)) \end{aligned}$$

خواهیم داشت:

$$\langle 200 | \hat{H}_p | 200 \rangle = -\frac{iQ}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} \langle 20 | r^2 | 20 \rangle \langle 00 | Y_{22}(\Omega) + Y_{2-2}(\Omega) | 00 \rangle$$

$$\langle 21m' | \hat{H}_p | 21m \rangle = -\frac{iQ}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} \langle 21 | r^2 | 21 \rangle \langle 1m' | Y_{22}(\Omega) + Y_{2-2}(\Omega) | 1m \rangle$$

طبق قضیه ویگنر - اکارت:

$$\langle \cdot | Y_{\pm 2} | \cdot \rangle = \langle \cdot, 2; \cdot, \pm 2 | \cdot \rangle \langle \cdot | Y_2 | \cdot \rangle = 0$$

$$\langle 1m' | Y_{\pm 2} | 1m \rangle = \langle 1, 2; m, \pm 2 | 1m' \rangle \langle 1 || Y_2 || 1 \rangle$$

بنابراین با توجه به خواص مربوط به ضرایب کلش - گوردون، $\langle 21m' | \hat{H}_p | 21m \rangle$ فقط وقتی غیر صفر است که:

$$m' = m \pm 2$$

یعنی:

$$\begin{aligned} \langle 211 | \hat{H}_p | 211 \rangle &= \langle 211 | \hat{H}_p | 210 \rangle = \langle 210 | \hat{H}_p | 210 \rangle = \langle 210 | \hat{H}_p | 211 \rangle = \langle 210 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle \\ &= \langle 21-1 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle = \langle 21-1 | \hat{H}_p | 210 \rangle = 0 \end{aligned}$$

از طرفی طبق رابطه‌ی (۳۸۱-۹) داریم:

$$\langle 1-1 | Y_{2-2} | 11 \rangle = \langle 11 | Y_{22} | 1-1 \rangle = -\sqrt{\frac{3}{10\pi}}$$

پس با توجه به اینکه $\langle 21 | r^2 | 21 \rangle = 30a^2$ ، لذا:

$$\langle 21-1 | \hat{H}_p | 211 \rangle = -\frac{iQ}{2} \sqrt{\frac{32\pi}{15}} (30a^2) \left(-\sqrt{\frac{3}{10\pi}} \right) = 15iQa^2 \sqrt{\frac{16}{25}} = 12iQa^2 = \langle 211 | \hat{H}_p | 21-1 \rangle$$

پس:

$$H_p = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12iQa^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12iQa^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که i مقداری حقیقی است زیرا در غیر این صورت $\hat{H}_p$ هرمیتی نخواهد بود. تصحیح مرتبه‌ی اول انرژی (یا به عبارتی ویژه مقادیر $\hat{H}_p$) عبارتند از:

$$E_{r_1}^{(1)} = E_r^{(0)} + E_{r_1}^{(1)} = -\frac{R}{4} + 0 = -\frac{R}{4}$$

$$E_{r_2}^{(1)} = E_r^{(0)} + E_{r_2}^{(1)} = -\frac{R}{4} + 0 = -\frac{R}{4}$$

$$E_{r_3}^{(1)} = E_r^{(0)} + E_{r_3}^{(1)} = -\frac{R}{4} + 12iQa^2$$

$$E_{r_f} = E_r^{(0)} + E_{r_f}^{(1)} = -\frac{\lambda}{4} - 12iQa^2$$

تمرین ۹-۴۳

ترازهای انرژی حالت‌های $n=2$ یک پوزیترونیم را در یک میدان الکتریکی خارجی ضعیف $\vec{E} = E\vec{k}$ محاسبه کنید. پوزیترونیم یک الکترون و یک پوزیترون مقید شده به وسیله برهم‌کنشی الکتریکی است.

حل:

مشابه با مورد اتم هیدروژن خواهیم داشت:

$$E_{r_1} = -\frac{E_1}{4} - 6e\epsilon a, \quad E_{r_2} = E_{r_3} = -\frac{E_1}{4}, \quad E_{r_4} = -\frac{E_1}{4} + 6e\epsilon a.$$

که در اینجا E_1 مقداری برابر $6\mu\text{eV}$ دارد.

تمرین ۹-۴۴

(آ) سهم ناشی از برهم‌کنش اسپین - مدار را برای یک یون هیدروژن گونه‌ی دارای Z پروتون تا اختلال مرتبه‌ی اول محاسبه کنید.

(ب) نتیجه‌ی قسمت (آ) را برای یافتن تصحیح اسپین - مدار برای حالت $2p$ در یک یون کربن C^{5+} به کار ببرید و آن را با انرژی تراز $n=2$ مقایسه کنید.

حل:

(آ)

در اینجا هامیلتونی به صورت زیر است:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r} + \frac{Ze^2}{2m_e c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{SO}$$

و تا تصحیح مرتبه‌ی اول خواهیم داشت:

$$E_n = E_n^{(0)} + E_{SO}^{(1)} \quad (*)$$

به طوری که:

$$E_n^{(1)} = -\frac{Z^2 E_0}{n^3} = -\frac{13/6 Z^2 \text{eV}}{n^3}$$


و:

$$E_{SO}^{(1)} = \frac{Z^2 \alpha^2 m_e c^2}{2n^2} \left| \frac{j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}}{l(l+1)(2l+1)} \right|$$

(ب)
برای حالت $2p$ یون C^{5+} داریم:

$$n=2, l=1, Z=6$$

و چون $S = \frac{1}{2}$ لذا j می‌تواند مقادیر $\frac{3}{2}$ و $\frac{1}{2}$ را داشته باشد. پس به‌طور شماتیک خواهیم داشت:



به‌طوری‌که:

$$\Delta \varepsilon = \frac{6^2 \times 0.511 \text{ MeV}}{137^2 \times 2 \times 2^2} \left| \frac{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right) - 1(1+1) - \frac{3}{4}}{1(1+1)(2 \times 1 + 1)} \right| = 0.000544 \text{ eV}$$

و چون:

$$E_2^{(0)} = -\frac{13/6 \times 6^2 \text{ eV}}{2^2} = -122/4 \text{ eV}$$

لذا:

$$\left| \frac{\Delta \varepsilon}{E_2^{(0)}} \right| = \frac{0.000544}{122/4} = 4/4 \times 10^{-6}$$

بنابراین، تصحیح ناشی از اندرکنش اسپین - مدار از مرتبه 10^{-6} است.

تمرین ۹-۴۵

دور ذره‌ی یکسان با اسپین $\frac{1}{2}$ در یک جعبه‌ی مکعبی به ضلع L مجبوس هستند.

(آ) انرژی حالت پایه را هنگامی که دو ذره تحت تأثیر برهمکنش جاذبه‌ای کوتاه‌برد و ضعیف

$$\hat{V}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -\frac{\epsilon}{r} \pi a^2 V_0 \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

قرار دارند تا اختلال مرتبه‌ی اول محاسبه کنید.

(ب) یک مقدار عددی برای انرژی به‌دست آمده در (آ) به ازای $L = 10^{-10} \text{ m}$ ، $a = 10^{-12} \text{ m}$ و

$V_0 = 10^{-2} \text{ eV}$ به دست آورید و جرم هر کدام را برابر با جرم الکترون در نظر بگیرید.

حل:

(آ)

در اینجا $E^{(0)}$ و ϕ انرژی پایه و ویژه تابع متناظر با آن عبارتند از:

$$E^{(0)} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (1^2 + 1^2 + 1^2) + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{mL^2}$$

$$\phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{S}_1, \vec{S}_2) = \left(\frac{r}{L}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi z_1}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y_2}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi z_2}{L}\right) \chi$$

چون حالت پایه فاقد تبهگنی است لذا تا تصحیح مرتبه‌ی اول داریم:

$$E_{\cdot} = E_{\cdot}^{(0)} + E_{\cdot}^{(1)}$$

به‌طوری‌که:

$$E_{\cdot}^{(1)} = \langle \phi | \hat{H}_p | \phi \rangle$$

پس:

$$\begin{aligned} E_{\cdot}^{(1)} &= \int dx_1 dy_1 dz_1 dx_2 dy_2 dz_2 \left[-\frac{\epsilon}{r} \pi a^2 V_0 \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \left(\frac{r}{L}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi y_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi z_1}{L}\right) \right. \\ &\quad \left. \times \sin^2\left(\frac{\pi x_2}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi y_2}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi z_2}{L}\right) \right] \\ &= -\frac{\epsilon}{r} \pi a^2 V_0 \left(\frac{r}{L}\right)^2 \int dx_1 dy_1 dz_1 \sin^2\left(\frac{\pi x_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi y_1}{L}\right) \sin^2\left(\frac{\pi z_1}{L}\right) \\ &= -\frac{\epsilon}{r} \pi a^2 V_0 \left(\frac{r}{L}\right)^2 \left[\int_0^L dx \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) \right]^3 \end{aligned}$$

اما:

$$\int_0^L dx \sin^r\left(\frac{\pi x}{L}\right) = \int_0^L \left[\frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)}{2} \right]^r dx = \frac{1}{2} \int_0^L \left(1 - 2 \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left[x - \frac{2L}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right]_0^L + \frac{1}{4} \int_0^L \left(1 + \cos\left(\frac{4\pi x}{L}\right) \right) dx = \frac{L}{2} + \frac{L}{4} = \frac{3L}{4}$$

پس:

$$E_{\text{ش}}^{(1)} = -\frac{4}{3} \pi a^3 V \left(\frac{2}{L} \right)^3 \left(\frac{3L}{4} \right) = -\frac{9\pi V}{2} \left(\frac{a}{L} \right)^3$$

و در نتیجه:

$$E_{\text{ش}} = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{mL^2} - \frac{9\pi V}{2} \left(\frac{a}{L} \right)^3$$

(ب)

$$E_{\text{ش}} = \frac{3 \times 10 \cdot (197/30 \text{ eV})^2 \cdot 10^{-18}}{10^{-20} \times 0.511 \text{ MeV}} - \frac{9 \times 3/14 \times 10^{-27} \text{ eV}}{2} \left(\frac{10^{-10}}{10^{-10}} \right)^3 = 228/6 \text{ eV} - 4/71 \times 10^{-9} \text{ eV}$$

$$\simeq 228/6 \text{ eV}$$

فصل دهم

نظریه‌ی اختلال وابسته به زمان

تمرین ۱۰-۱

یک ذره‌ی بدون اسپین به جرم m در یک چاه پتانسیل نامتناهی یک‌بعدی با دیوارهایی در $x=0$ و $x=a$ را در نظر بگیرید که ابتدا ($t=0$) در حالت $\Psi(x,0) = \frac{\phi_1(x) + \phi_2(x)}{\sqrt{2}}$ قرار دارد و در آن

$\phi_1(x)$ و $\phi_2(x)$ به ترتیب حالت‌های پایه و برانگیخته‌ی دوم با $\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ هستند.

(آ) بردار حالت $\Psi(x,t)$ برای $t > 0$ در تصویر شرودینگر چیست؟

(ب) $\langle \hat{X} \rangle$ ، $\langle \hat{P} \rangle$ ، $\langle \hat{X}^2 \rangle$ و $\langle \hat{P}^2 \rangle$ را به عنوان توابعی از زمان در تصویر شرودینگر حساب کنید.

(پ) قسمت (ب) را در تصویر هایزنبرگ تکرار کنید یعنی $\langle \hat{X} \rangle_H$ ، $\langle \hat{P} \rangle_H$ ، $\langle \hat{X}^2 \rangle_H$ و $\langle \hat{P}^2 \rangle_H$ را

به عنوان توابعی از زمان برای $t > 0$ تعیین کنید.

حل:

(آ)

چون انرژی سطح n ام توسط $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$ داده می‌شود، بنابراین:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\phi_1(x) e^{-i \frac{E_1 t}{\hbar}} + \phi_2(x) e^{-i \frac{E_2 t}{\hbar}} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{r}} \left[\sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \exp\left(-\frac{i\hbar^r \pi^r t}{r m a^r \hbar}\right) + \sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \exp\left(-\frac{i\hbar^r \pi^r t}{r m a^r \hbar}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \exp\left(-i \frac{\hbar \pi^r t}{r m a^r}\right) + \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \exp\left(-\frac{i\hbar \pi^r t}{r m a^r}\right)$$

(ب)

با توجه به اینکه:

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \left[|\phi_1\rangle e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} + |\phi_r\rangle e^{-i\frac{E_r t}{\hbar}} \right]$$

به کار خود ادامه می دهیم. ابتدا به محاسبه $\langle \psi(t) | X | \psi(t) \rangle$ می پردازیم.

$$\langle \psi(t) | \hat{X} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \left[\langle \phi_1 | e^{i\frac{E_1 t}{\hbar}} + \langle \phi_r | e^{i\frac{E_r t}{\hbar}} \right] \hat{X} \frac{1}{\sqrt{r}} \left[|\phi_1\rangle e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} + |\phi_r\rangle e^{-i\frac{E_r t}{\hbar}} \right]$$

$$= \frac{1}{r} \left[\langle \phi_1 | \hat{X} | \phi_1 \rangle + e^{\frac{it}{\hbar}(E_1 - E_r)} \langle \phi_1 | \hat{X} | \phi_r \rangle + e^{\frac{it}{\hbar}(E_r - E_1)} \langle \phi_r | \hat{X} | \phi_1 \rangle + \langle \phi_r | \hat{X} | \phi_r \rangle \right]$$

چون:

$$\langle \phi_n | \hat{X} | \phi_n \rangle = \frac{a}{r}$$

و:

$$\langle \phi_1 | \hat{X} | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | \hat{X} | \phi_1 \rangle = \frac{r}{a} \int_0^a x \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^a x \left[\cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] dx$$

$$= \frac{1}{a} \left[\left[\frac{ax}{r\pi} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) + \left(\frac{a}{r\pi}\right)^r \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \right]_0^a - \left[\frac{ax}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \left(\frac{a}{\pi}\right)^r \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right]_0^a \right]$$

$$= \frac{1}{a} (\cdot - \cdot) = 0$$

لذا:

$$\langle \psi(t) | \hat{X} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{r} \left(\frac{a}{r} + \cdot + \cdot + \frac{a}{r} \right) = \frac{a}{r}$$

و در مورد $\langle \psi(t) | P | \psi(t) \rangle$ داریم:

$$\langle \psi(t) | \hat{P} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{r} \left[\langle \phi_1 | P | \phi_1 \rangle + e^{\frac{it}{\hbar}(E_1 - E_r)} \langle \phi_1 | P | \phi_r \rangle + e^{\frac{it}{\hbar}(E_r - E_1)} \langle \phi_r | P | \phi_1 \rangle + \langle \phi_r | P | \phi_r \rangle \right]$$

اما چون:

$$\langle \phi_n | \hat{P} | \phi_n \rangle = 0.$$

و:

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 | \hat{P} | \phi_r \rangle &= \int_a^a \sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \left(\sqrt{\frac{r}{a}} \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \right) dx = -i\hbar \frac{r\pi}{a^r} \int_a^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) dx \\ &= -i\hbar \frac{r\pi}{a^r} \int_a^a \left(\sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) - \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right) dx = -i\hbar \frac{r\pi}{a^r} \left[\frac{-a}{r\pi} \cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) + \frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right]_a^a \\ &= 0. \end{aligned}$$

لذا:

$$\langle \psi(t) | \hat{P} | \psi(t) \rangle = 0.$$

و در مورد $\langle \psi(t) | X^r | \psi(t) \rangle$ داریم:

$$\langle \psi(t) | X^r | \psi(t) \rangle = \frac{1}{r} \left[\langle \phi_1 | X^r | \phi_1 \rangle + e^{\frac{i\hbar(E_1 - E_r)t}{\hbar}} \langle \phi_1 | X^r | \phi_r \rangle + e^{\frac{i\hbar(E_r - E_1)t}{\hbar}} \langle \phi_r | X^r | \phi_1 \rangle + \langle \phi_r | X^r | \phi_r \rangle \right]$$

چون:

$$\langle \phi_n | X^r | \phi_n \rangle = \frac{a^r}{r} + \frac{a^r}{r\pi^r \pi^r}$$

و:

$$\langle \phi_1 | X^r | \phi_r \rangle = \langle \phi_r | X^r | \phi_1 \rangle = \int_a^a \frac{r}{a} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) dx = -\frac{ra^r}{r\pi^r}$$

پس:

$$\langle \psi(t) | X^r | \psi(t) \rangle = \frac{a^r}{r} + \frac{\Delta a^r}{r\pi^r} - \frac{r}{r\pi^r} \frac{a^r}{\pi^r} \cos\left[\frac{(E_1 - E_r)t}{\hbar}\right]$$

و در مورد $\langle \psi(t) | P^r | \psi(t) \rangle$ با توجه به اینکه:

$$\langle \phi_n | P^r | \phi_m \rangle = r m E_n \delta_{nm} = \frac{\hbar^r \pi^r n^r}{a^r} \delta_{nm}$$

لذا:

$$\langle \psi(t) | P^r | \psi(t) \rangle = \frac{1}{r} \left(\frac{\hbar^r \pi^r}{a^r} + \frac{r \hbar^r \pi^r}{a^r} \right) = \frac{r \hbar^r \pi^r}{a^r}$$

(ب)

در تصویر هاینبرگ، حالت سیستم در طی زمان تغییر نمی‌کند اما تابعی از زمان می‌باشد. در متن کتاب ثابت شد که:

$$\hat{X}_H(t) = \hat{X} + \frac{t}{m} \hat{P}$$

و:

$$\hat{P}_H(t) = \hat{P}$$

لذا:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{X} | \psi(\cdot) \rangle + \frac{t}{m} \langle \psi(\cdot) | \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle$$

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{P}_H | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle$$

اما:

$$\begin{aligned} \langle \psi(\cdot) | X | \psi(\cdot) \rangle &= \frac{1}{\sqrt{r}} (\langle \phi | + \langle \phi_r |) \times \frac{1}{\sqrt{r}} (\langle \phi | + \langle \phi_r |) \\ &= \frac{1}{r} [\langle \phi | X | \phi \rangle + \langle \phi | X | \phi_r \rangle + \langle \phi_r | X | \phi \rangle + \langle \phi_r | X | \phi_r \rangle] = \frac{1}{r} \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r} + 0 + 0 \right) = \frac{a}{r} \end{aligned}$$

$$\langle \psi(\cdot) | P | \psi(\cdot) \rangle = \frac{1}{r} [\langle \phi | P | \phi \rangle + \langle \phi | P | \phi_r \rangle + \langle \phi_r | P | \phi \rangle + \langle \phi_r | P | \phi_r \rangle] = 0$$

در نتیجه:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle = \frac{a}{r} + \frac{t}{m} (0) = \frac{a}{r}$$

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{P}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle = 0$$

در مورد $\langle P^r \rangle_H$ داریم:

$$\langle \psi(\cdot) | P_H^r(t) | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | P^r | \psi(\cdot) \rangle = \frac{\Delta \hbar^r \pi^r}{a^r}$$

و در مورد $\langle X^r \rangle_H$ ، $X_H^r(t)$ را به طریق زیر می‌نویسیم:

$$X_H^r(t) = \left(\hat{X} + \frac{t}{m} \hat{P} \right)^r = X^r + \frac{t^r}{m^r} \hat{P}^r + \frac{t}{m} (\hat{X} \hat{P} + \hat{P} \hat{X})$$

لذا:

$$\begin{aligned}\langle \psi(\cdot) | X_H^r(t) | \psi(\cdot) \rangle &= \langle \psi(\cdot) | X^r | \psi(\cdot) \rangle + \frac{t^r}{m^r} \langle \psi(\cdot) | P^r | \psi(\cdot) \rangle \\ &+ \frac{t}{m} [\langle \psi(\cdot) | XP | \psi(\cdot) \rangle + \langle \psi(\cdot) | PX | \psi(\cdot) \rangle]\end{aligned}$$

اما:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{P} \hat{X} | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle^*$$

لذا:

$$\begin{aligned}\langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle + \langle \psi(\cdot) | \hat{P} \hat{X} | \psi(\cdot) \rangle &= \langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle + \langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle^* \\ &= 2 \operatorname{Re} [\langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle] \\ &= 2 \operatorname{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, \cdot) x \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, \cdot) dx \right] = 0.\end{aligned}$$

پس:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H^r(t) | \psi(\cdot) \rangle = \frac{a^r}{r} + \frac{\Delta a^r}{9\pi^r} + \frac{\Delta \hbar^r \pi^r}{a^r} \frac{t^r}{m^r}$$

تمرین ۱۰-۲

مقدار چشمداشتی $\langle \hat{X}_H(t) \hat{P}(\cdot) \rangle$ را برای سومین حالت برانگیخته‌ی یک نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی حساب کنید.

حل:

در تصویر هاینبرگ داریم:

$$x_H(t) = \hat{x}(\cdot) \cos \omega t + \frac{\hat{P}(\cdot)}{m\omega} \sin \omega t$$

$$x_H(t) P(\cdot) = \hat{x}(\cdot) \hat{P}(\cdot) \cos \omega t + \frac{\hat{P}^r(\cdot)}{m\omega} \sin \omega t$$

$$\begin{aligned}\langle r | x_H(t) \hat{P}(\cdot) | r \rangle &= \cos \omega t \langle \hat{x}(\cdot) \hat{P}(\cdot) \rangle + \frac{\sin \omega t}{m\omega} \langle P^r(\cdot) \rangle \\ &= \frac{i\hbar}{r} \cos \omega t + \frac{\sin \omega t}{m\omega} \frac{m\omega\hbar}{r} (r) \\ &= \frac{i\hbar}{r} \cos \omega t + \frac{r}{r} \hbar \omega \sin \omega t\end{aligned}$$

تمرین ۱۰-۳

مقدار چشمداشتی $\langle \hat{X} \hat{P}_H(t) \rangle_n$ را برای حالت برانگیخته‌ی n ام یک نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی تعیین کنید.

حل:

$$\begin{aligned}
 \langle n | \hat{x} \hat{P}_H(t) | n \rangle &= \langle n | \hat{x}(\cdot) [\hat{P}(\cdot) \cos \omega t - m\omega \hat{x}(\cdot) \sin \omega t] | n \rangle \\
 &= \cos \omega t \langle n | \hat{x}(\cdot) \hat{P}(\cdot) | n \rangle - m\omega \sin \omega t \langle n | \hat{x}^2(\cdot) | n \rangle \\
 &= \cos \omega t \cdot \frac{i\hbar}{2} - m\omega \sin \omega t \cdot \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1) \\
 &= \frac{i\hbar}{2} \cos \omega t - \frac{\hbar}{2} (2n+1) \sin \omega t
 \end{aligned}$$

تمرین ۱۰-۴

یک نوسانگر هماهنگ یک بعدی را در نظر بگیرید که ابتدا (یعنی $t=0$) در حالت $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ قرار دارد و در آن $|0\rangle$ و $|1\rangle$ به ترتیب حالت های پایه و برانگیخته ی اول هستند.

(آ) بردار حالت $|\Psi(t)\rangle$ برای $t > 0$ در تصویر شرودینگر چیست؟

(ب) $\langle \hat{X} \rangle$ ، $\langle \hat{P} \rangle$ ، $\langle \hat{X}^2 \rangle$ و $\langle \hat{P}^2 \rangle$ را به عنوان توابعی از زمان برای $t > 0$ در تصویر شرودینگر حساب کنید.

(پ) قسمت (ب) را در تصویر هایزنبرگ تکرار کنید.

حل:

(آ)

چون سطح انرژی n ام توسط $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$ داده می شود بنابراین:

$$\begin{aligned}
 |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle e^{-i\frac{E_0 t}{\hbar}} + |1\rangle e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle e^{-i\frac{t\hbar\omega}{2}} + |1\rangle e^{-i\frac{t\hbar\omega}{2}} \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[|0\rangle e^{-i\frac{\omega t}{2}} + |1\rangle e^{-i\frac{3\omega t}{2}} \right]
 \end{aligned}$$

(ب)

محاسبه ی $\langle \psi(t) | \hat{X} | \psi(t) \rangle$:

$$\begin{aligned}
 \langle \psi(t) | \hat{X} | \psi(t) \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \left(\langle 0 | e^{\frac{i\omega t}{2}} + \langle 1 | e^{\frac{3i\omega t}{2}} \right) \hat{X} \left(|0\rangle e^{-i\frac{\omega t}{2}} + |1\rangle e^{-i\frac{3\omega t}{2}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle + \langle 1 | \hat{X} | 1 \rangle + \langle 0 | \hat{X} | 1 \rangle e^{-i\omega t} + \langle 1 | \hat{X} | 0 \rangle e^{i\omega t} \right)
 \end{aligned}$$

چون:

$$\langle \cdot | \hat{X} | \cdot \rangle = \langle 1 | \hat{X} | 1 \rangle = 0$$

$$\langle \cdot | \hat{X} | 1 \rangle = \langle 1 | \hat{X} | \cdot \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}}$$

پس:

$$\langle \psi(t) | \hat{X} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(0 + 0 + \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}) \right) = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} \cos \omega t$$

محاسبه‌ی $\langle \psi(t) | \hat{P} | \psi(t) \rangle$:

$$\langle \psi(t) | \hat{P} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle \cdot | \hat{P} | \cdot \rangle + \langle 1 | \hat{P} | 1 \rangle + \langle \cdot | \hat{P} | 1 \rangle e^{-i\omega t} + \langle 1 | \hat{P} | \cdot \rangle e^{i\omega t} \right)$$

چون:

$$\langle \cdot | \hat{P} | \cdot \rangle = \langle 1 | \hat{P} | 1 \rangle = 0$$

$$\langle \cdot | \hat{P} | 1 \rangle = \langle 1 | \hat{P} | \cdot \rangle^* = -i \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}$$

پس:

$$\langle \psi(t) | \hat{P} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(0 + 0 - i \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (e^{-i\omega t} - e^{i\omega t}) \right) = -\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} \sin \omega t$$

محاسبه‌ی $\langle \psi(t) | \hat{X}^2 | \psi(t) \rangle$:

$$\langle \psi(t) | \hat{X}^2 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle \cdot | \hat{X}^2 | \cdot \rangle + \langle 1 | \hat{X}^2 | 1 \rangle + \langle \cdot | \hat{X}^2 | 1 \rangle e^{-i\omega t} + \langle 1 | \hat{X}^2 | \cdot \rangle e^{i\omega t} \right)$$

چون:

$$\langle n | \hat{X}^2 | n \rangle = \frac{\hbar}{2mw} (2n+1)$$

$$\langle \cdot | \hat{X}^2 | 1 \rangle = \langle 1 | \hat{X}^2 | \cdot \rangle = 0$$

پس:

$$\langle \psi(t) | \hat{X}^2 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(\frac{\hbar}{2mw} + \frac{2\hbar}{2mw} \right) = \frac{\hbar}{mw}$$

محاسبه‌ی $\langle \psi(t) | \hat{P}^2 | \psi(t) \rangle$:

$$\langle \psi(t) | \hat{P}^2 | \psi(t) \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle \cdot | \hat{P}^2 | \cdot \rangle + \langle 1 | \hat{P}^2 | 1 \rangle + \langle \cdot | \hat{P}^2 | 1 \rangle e^{-i\omega t} + \langle 1 | \hat{P}^2 | \cdot \rangle e^{i\omega t} \right)$$

چون:

$$\langle \cdot | \hat{P}^2 | 1 \rangle = \langle 1 | \hat{P}^2 | \cdot \rangle = 0$$

$$\langle n | \hat{P}^\tau | n \rangle = \frac{m\hbar\omega}{\tau} (\tau n + 1)$$

پس:

$$\langle \psi(t) | \hat{P}^\tau | \psi(t) \rangle = \frac{1}{\tau} \left(\frac{m\hbar\omega}{\tau} + \frac{\tau m\hbar\omega}{\tau} \right) = m\hbar\omega$$

(پ)

در تصویر هایزنبرگ داریم:

$$\hat{X}_H(t) = \hat{X} \cos \omega t + \frac{1}{m\omega} \hat{P} \sin \omega t$$

$$\hat{P}_H(t) = \hat{P} \cos \omega t - m\omega \hat{X} \sin \omega t$$

لذا:

محاسبه ی $\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle$:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{X} | \psi(\cdot) \rangle \cos \omega t + \frac{1}{m\omega} \langle \psi(\cdot) | \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle \sin \omega t$$

$$= \sqrt{\frac{\hbar}{\tau m \omega}} \cos \omega t + \frac{1}{m\omega} (\cdot) \sin \omega t = \sqrt{\frac{\hbar}{\tau m \omega}} \cos \omega t$$

محاسبه ی $\langle \psi(\cdot) | \hat{P}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle$:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{P}_H(t) | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle \cos \omega t - m\omega \langle \psi(\cdot) | \hat{X} | \psi(\cdot) \rangle \sin \omega t$$

$$= \cdot \cos \omega t - m\omega \sqrt{\frac{\hbar}{\tau m \omega}} \sin \omega t = -\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{\tau}} \sin \omega t$$

محاسبه ی $\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H^\tau(t) | \psi(\cdot) \rangle$:

$$X_H^\tau(t) = \hat{X}^\tau \cos^\tau \omega t + \frac{1}{(m\omega)^\tau} \hat{P}^\tau \sin^\tau \omega t + \frac{\sin(\tau \omega t)}{\tau m \omega} (\hat{X} \hat{P} + \hat{P} \hat{X})$$

چون:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} + \hat{P} \hat{X} | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle + \langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle^* = \tau \operatorname{Re} [\langle \psi(\cdot) | \hat{X} \hat{P} | \psi(\cdot) \rangle] = \cdot$$

پس:

$$\langle \psi(\cdot) | \hat{X}_H^\tau(t) | \psi(\cdot) \rangle = \langle \psi(\cdot) | \hat{X}^\tau | \psi(\cdot) \rangle \cos^\tau \omega t + \frac{\sin^\tau \omega t}{(m\omega)^\tau} \langle \psi(\cdot) | \hat{P}^\tau | \psi(\cdot) \rangle$$

$$= \frac{\hbar}{m\omega} \cos^\tau \omega t + \frac{\sin^\tau \omega t}{(m\omega)^\tau} (m\hbar\omega) = \frac{\hbar}{m\omega}$$

محاسبه ی $\langle \psi(\cdot) | \hat{P}_H^\tau(t) | \psi(\cdot) \rangle$:

با توجه به اینکه:

$$\hat{P}_H^\tau = \hat{P}^\tau \cos^\tau \omega t + m^\tau \omega^\tau \hat{X}^\tau \sin^\tau \omega t - \frac{m\omega \sin(\tau \omega t)}{\tau} (\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X})$$

پس:

$$\langle \psi(\cdot) | P_H^\tau(t) | \psi(\cdot) \rangle = m\hbar\omega \cos^\tau \omega t + m^\tau \omega^\tau \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right) \sin^\tau \omega t = m\hbar\omega$$

تمرین ۱۰-۵

(آ) عملگر مختصه‌ی $\hat{X}_H(t)$ را برای یک ذره‌ی آزاد در یک بعد در تصویر هایزنبرگ محاسبه کنید.

(ب) جابه‌جاگر $[\hat{X}_H(t), \hat{X}_H(\cdot)]$ را حساب کنید.

حل:

(آ)

چون:

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^\tau}{2m}$$

لذا:

$$[\hat{H}, \hat{X}] = -i\hbar \frac{\hat{P}}{m}$$

بنابراین:

$$\hat{X}_H(t) = e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{X} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \hat{X} + \frac{it}{\hbar} [\hat{H}, \hat{X}] + \frac{1}{2!} \left(\frac{it}{\hbar} \right)^2 [\hat{H}, [\hat{H}, \hat{X}]] + \dots$$

چون $[\hat{H}, [\hat{H}, \hat{X}]] = 0$ لذا نتیجه می‌شود که:

$$\hat{X}_H(t) = \hat{X} + \frac{t}{m} \hat{P}$$

(ب)

$$[\hat{H}_H(t), \hat{X}_H(\cdot)] = \left[\hat{X} + \frac{t}{m} \hat{P}, \hat{X} \right] = [\hat{X}, \hat{X}] + \frac{t}{m} [\hat{P}, \hat{X}] = \frac{t}{m} (-i\hbar) = \frac{-i\hbar t}{m}$$

تمرین ۱۰-۶

هامیلتونی $H = -\left(\frac{eB}{mc} \right) \hat{S}_x = \omega \hat{S}_x$ را در نظر بگیرید:

(آ) معادلات حرکت هایزنبرگ را برای عملگرهای وابسته به زمان $\hat{S}_x(t)$ ، $\hat{S}_y(t)$ و $\hat{S}_z(t)$ بنویسید.

(ب) این معادلات را برای به دست آوردن S_x ، S_y و S_z به صورت توابعی از زمان حل کنید.

حل:

با توجه به اینکه:

$$[\hat{S}_x, \hat{H}] = [\hat{S}_x, w\hat{S}_x] = 0$$

$$[\hat{S}_y, \hat{H}] = [\hat{S}_y, w\hat{S}_x] = w[\hat{S}_y, \hat{S}_x] = -i\hbar w\hat{S}_z$$

$$[\hat{S}_z, \hat{H}] = [\hat{S}_z, w\hat{S}_x] = w[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = +i\hbar w\hat{S}_y$$

از رابطه:

$$\frac{d\hat{A}_H(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H, \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{A}(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$$

نتیجه می شود که:

$$\frac{d\hat{S}_x(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_x(t), \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{S}_x(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = 0$$

پس:

$$\hat{S}_x(t) = \hat{S}_x(\cdot)$$

$$\frac{d\hat{S}_y(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_y(t), \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{S}_y(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \frac{-i\hbar w}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{S}_z(\cdot) e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = -w\hat{S}_z(t)$$

$$\frac{d\hat{S}_z(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_z(t), \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{S}_z(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \frac{i\hbar w}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{S}_y(\cdot) e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = w\hat{S}_y(t)$$

از دو رابطه ی اخیر نسبت به زمان مشتق می گیریم:

$$\frac{d^r \hat{S}_z(t)}{dt^r} = -w \frac{d\hat{S}_z(t)}{dt} = -w(-w\hat{S}_y(t)) = -w^r \hat{S}_y(t)$$

$$\frac{d^r \hat{S}_z(t)}{dt^r} = w \frac{d\hat{S}_y(t)}{dt} = w(-w\hat{S}_z(t)) = -w^r \hat{S}_z(t)$$

از این روابط نتیجه می شود که:

$$\hat{S}_y(t) = \hat{A} \sin wt + \hat{B} \cos wt$$

$$\hat{S}_z(t) = \hat{C} \sin wt + \hat{D} \cos wt$$

در اینجا $\hat{A}$ ، $\hat{B}$ ، $\hat{C}$ و $\hat{D}$ عملگرهایی مستقل از زمان هستند. از این روابط نتیجه می‌شود که:

$$-w\hat{S}_z(t) = \frac{d\hat{S}_y(t)}{dt} = w(\hat{A}\cos wt - \hat{B}\sin wt)$$

$$w\hat{S}_y(t) = \frac{d\hat{S}_z(t)}{dt} = w(\hat{C}\cos wt - \hat{D}\sin wt)$$

بنابراین در $t=0$ نتیجه می‌شود که:

$$\hat{S}_y(0) = \hat{B}$$

$$\hat{S}_z(0) = \hat{D}$$

$$-w\hat{S}_z(0) = w\hat{A}$$

$$w\hat{S}_y(0) = w\hat{C}$$

و در اینجا به روابط زیر می‌رسیم:

$$\hat{S}_y(t) = -\hat{S}_z(0)\sin wt + \hat{S}_y(0)\cos wt$$

$$\hat{S}_z(t) = \hat{S}_y(0)\sin wt + \hat{S}_z(0)\cos wt$$

تمرین ۱۰-۷

کمیت $\langle n | \hat{P}_H(t) \hat{P} | n \rangle$ را برای حالت برانگیخته‌ی n ام یک نوسانگر هماهنگ یک بعدی حساب کنید که در آن $\hat{P}_H(t)$ و $\hat{P}$ به ترتیب عملگرهای اندازه حرکت در تصویرهای هایزنبرگ و شرودینگر را نشان می‌دهند.

حل:

با توجه به اینکه:

$$\hat{P}_H(t) = \hat{P} \cos(wt) - mw\hat{X} \sin(wt)$$

نتیجه می‌شود که:

$$\langle n | \hat{P}_H(t) \hat{P} | n \rangle = \langle n | \hat{P}^\dagger | n \rangle \cos wt - mw \langle n | \hat{X} \hat{P} | n \rangle \sin wt$$

و با توجه به اینکه:

$$\langle n | \hat{X} \hat{P} | n \rangle = \frac{i\hbar}{2}, \quad \langle n | \hat{P}^\dagger | n \rangle = \frac{m\hbar w}{2}(2n+1)$$

به رابطه‌ی زیر می‌رسیم:

$$\langle n | \hat{P}_H(t) \hat{P} | n \rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} (\gamma n + 1) \cos \omega t - \frac{im\omega\hbar}{2} \sin \omega t$$

تمرین ۱۰-۸

هامیلتونی ناشی از برهم‌کنش یک ذره به جرم m ، بار q (بار منفی است) و اسپین $\vec{S}$ با میدان مغناطیسی در راستای محور y ، $\hat{H} = \frac{-qB}{mc} \hat{S}_y$ می‌باشد.

(آ) با استفاده از معادله‌ی هایزنبرگ، $\frac{d\hat{S}_x}{dt}$ ، $\frac{d\hat{S}_y}{dt}$ و $\frac{d\hat{S}_z}{dt}$ را حساب کنید.

(ب) این معادلات را برای به‌دست آوردن مؤلفه‌های عملگر اسپین به‌عنوان توابعی از زمان حل کنید.

حل:

با تعریف:

$$w = -\frac{qB}{mc}$$

خواهیم داشت:

$$[\hat{S}_y, \hat{H}] = [\hat{S}_y, w\hat{S}_y] = 0$$

$$[\hat{S}_x, \hat{H}] = [\hat{S}_x, w\hat{S}_y] = w[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar w\hat{S}_z$$

$$[\hat{S}_z, \hat{H}] = [\hat{S}_z, w\hat{S}_y] = w[\hat{S}_z, \hat{S}_y] = -i\hbar w\hat{S}_x$$

از رابطه:

$$\frac{d\hat{A}_H(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}_H, \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{A}(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$$

نتیجه می‌شود که:

$$\frac{d\hat{S}_x(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_x(t), \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{S}_x(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \frac{i\hbar w}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{S}_z(\cdot) e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = w\hat{S}_z(t)$$

$$\frac{d\hat{S}_y(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_y(t), \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{S}_y(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = 0$$

$$\frac{d\hat{S}_z(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_z(t), \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} [\hat{S}_z(\cdot), \hat{H}] e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \frac{-i\hbar w}{i\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{S}_x(\cdot) e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = -w\hat{S}_x(t)$$

و از اینجا نتیجه می‌شود که:

$$\hat{S}_y(t) = \hat{S}_y(\cdot)$$

$$\frac{d^r \hat{S}_x(t)}{dt^r} = w \frac{d\hat{S}_z(t)}{dt} = w(-w\hat{S}_x(t)) = -w^r \hat{S}_x(t)$$

$$\frac{d^r \hat{S}_z(t)}{dt^r} = w \frac{d\hat{S}_x(t)}{dt} = -w(+w\hat{S}_z(t)) = -w^r \hat{S}_z(t)$$

حل دو معادله‌ی اخیر منجر به روابط زیر می‌شود:

$$\hat{S}_x(t) = \hat{A} \sin wt + \hat{B} \cos wt$$

$$\hat{S}_z(t) = \hat{C} \sin wt + \hat{D} \cos wt$$

در این روابط $\hat{A}$ ، $\hat{B}$ ، $\hat{C}$ و $\hat{D}$ عملگرهایی مستقل از زمان هستند. با اعمال شرایط اولیه در لحظه‌ی $t=0$ می‌توان این ثوابت را یافت.

$$\hat{S}_x(0) = \hat{B}$$

$$\hat{S}_z(0) = \hat{D}$$

$$w\hat{S}_z(0) = \left. \frac{d\hat{S}_x(t)}{dt} \right|_{t=0} = w\hat{A}$$

$$-w\hat{S}_x(0) = \left. \frac{d\hat{S}_z(t)}{dt} \right|_{t=0} = w\hat{C}$$

پس:

$$\hat{S}_x(t) = \hat{S}_z(0) \sin wt + \hat{S}_x(0) \cos wt$$

$$\hat{S}_z(t) = -\hat{S}_x(0) \sin wt + \hat{S}_z(0) \cos wt$$

تمرین ۱۰-۹

ذره‌ای ابتدا (یعنی در $t < 0$) در حالت پایه‌ی خودش در یک پتانسیل نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی قرار دارد. در $t=0$ یک اختلال $\hat{V}(x,t) = V_0 \hat{x} e^{-\frac{t}{\tau}}$ روشن می‌شود. احتمال آن که پس از یک زمان به‌قدر کافی طولانی (یعنی $t \rightarrow \infty$) سیستم، گذاری به یک حالت برانگیخته‌ی معلوم انجام دهد را تا مرتبه‌ی اول حساب کنید. همه‌ی حالت‌های نهایی را در نظر بگیرید.

حل:

احتمال گذار از حالت پایه‌ی $n=0$ به حالت برانگیخته‌ی n توسط رابطه‌ی (۱۰-۴۱) داده می‌شود:

$$P_{\rightarrow n} = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \langle n | \hat{V}(t) | 0 \rangle e^{i\omega_n t} dt \right|^2 = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left| \langle n | \hat{x}^r | 0 \rangle \right|^2 \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{1}{\tau} - i\omega\right)t} dt \right|^2$$

با توجه به اینکه:

$$\hat{x}^r = \frac{\hbar}{\sqrt{m\omega}} (\hat{a}^r + \hat{a}^{\dagger r} + \sqrt{2} \hat{a}^{\dagger} \hat{a} + 1)$$

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

$$\hat{a}^{\dagger} |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

لذا:

$$\langle n | \hat{x}^r | 0 \rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{m\omega}} (\sqrt{2} \delta_{n,r} + \delta_{n,0})$$

و چون طبق رابطه‌ی (۱۰-۲۰) داریم:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{1}{\tau} - i\omega\right)t} dt \right|^2 = \frac{1}{n^r \omega^r + \frac{1}{\tau^r}}$$

نتیجه می‌شود که:

$$P_{\rightarrow n} = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar}{\sqrt{m\omega}} \right)^r \tau^r$$

$$P_{\rightarrow r} = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left(\frac{\sqrt{2}\hbar}{\sqrt{m\omega}} \right)^r \frac{1}{\sqrt{2}\omega^r + \frac{1}{\tau^r}} = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^r \frac{\tau^r}{\sqrt{2}\omega^r \tau^r + 1}$$

به‌ازای سایر مقادیر n نیز نتیجه حاصل برای $P_{\rightarrow n}$ ، صفر است.

تمرین ۱۰-۱۰

ذره‌ای در ابتدا (یعنی در $t < 0$) در حالت پایه‌ی خودش در یک چاه پتانسیل نامتناهی که دیواره‌های آن در $x=0$ و $x=a$ واقع هستند قرار دارد و در زمان $t=0$ ، در برابر یک اختلال وابسته به زمان $\hat{V}(t) = V_0 \hat{x}^r e^{-t/\tau}$ قرار می‌گیرد که در آن V_0 یک پارامتر کوچک است. احتمال آن را بیابید که در $t \rightarrow +\infty$ ذره در دومین حالت برانگیخته‌ی خود یافت شود.

حل:

احتمال گذار از حالت پایه $n=1$ به دومین حالت برانگیخته $n=3$ توسط رابطه (۱۰-۴۱) داده می‌شود.

$$P_{1 \rightarrow r} = \frac{1}{\hbar} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \langle r | \hat{V}(t) | 1 \rangle e^{i w_{r1} t} dt \right|^2 = \frac{V_r}{\hbar} \left| \langle r | \hat{x}^r | 1 \rangle \right|^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(t^r - i w_{r1} t\right)} dt \right|^2$$

با توجه به اینکه:

$$\begin{aligned} \langle r | \hat{x}^r | 1 \rangle &= \frac{r}{a} \int_{-a}^a x^r \sin\left(\frac{r\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{a} \int_{-a}^a x^r \left(\cos\left(\frac{r\pi x}{a}\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right) dx \\ &= -r \left(\frac{a}{r\pi} \right)^r + r \left(\frac{a}{\pi} \right)^r = -\frac{r a^r}{\pi^r} \end{aligned}$$

و:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(t^r - i w_{r1} t\right)} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(t^r - i w_{r1} t - \frac{w_{r1}^r}{r} + \frac{w_{r1}^r}{r}\right)} dt = e^{-\frac{w_{r1}^r}{r}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(t - i \frac{w_{r1}}{r}\right)^r} dt$$

با استفاده از رابطه:

$$w_{r1} = \frac{E_r - E_1}{\hbar} = \frac{\hbar^r \pi^r}{r m a^r} \frac{r^r - 1^r}{\hbar} = \frac{r \pi^r \hbar}{m a^r}$$

و تغییر متغیر:

$$u = t - i \frac{w_{r1}}{r}$$

نتیجه می‌شود که:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(t^r - i w_{r1} t\right)} dt = \exp\left(-\frac{r \pi^r \hbar^r}{m^r a^r}\right) \frac{\sqrt{\pi}}{r} \operatorname{erf}\left(-i \frac{w_{r1}}{r}\right)$$

که به طور کلی:

$$\operatorname{erfc}(p) = \frac{r}{\sqrt{\pi}} \int_p^{+\infty} e^{-u^r} du$$

پس در بی‌نهایت:

$$P_{1 \rightarrow r} = \frac{V_r}{\hbar} \left(\frac{-r a^r}{\pi^r} \right)^2 \exp\left(-\frac{\lambda \pi^r \hbar^r}{m^r a^r}\right) \frac{\pi}{r} \operatorname{erfc}\left(-i \frac{w_{r1}}{r}\right) = \frac{9 V_r a^r}{r \Delta \epsilon \hbar^r \pi^r} \exp\left(-\frac{\lambda \pi^r \hbar^r}{m a^r}\right) \left| \operatorname{erf}\left(\frac{-r \pi^r i \hbar}{m a^r}\right) \right|^2$$

تمرین ۱۰-۱۱

چگالی مربوط به گذار $3s \rightarrow 2p$ را در اتم هیدروژن بیابید.

حل:

شدت گذار از $3s$ به $2p$ از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$I_{rs \rightarrow rp} = \frac{r e^r w_{rs \rightarrow rp}^r}{r c^r} \frac{1}{r} \sum_{m=-1}^{+1} |\langle r s | \vec{r} | r p \rangle|^r$$

$$= \frac{r e^r w_{rs \rightarrow rp}^r}{9 c^r} \sum_{m=-1}^{+1} \left[|\langle r \cdot \cdot | \hat{x} | r m \rangle|^r + |\langle r \cdot \cdot | \hat{y} | r m \rangle|^r + |\langle r \cdot \cdot | \hat{z} | r m \rangle|^r \right]$$

که:

$$\langle r m | \hat{x} | r \cdot \cdot \rangle = \int_0^{+\infty} R_{r\cdot}(r) R_{r1}^*(r) r^r dr \int Y_{lm}^*(\Omega) \left[-\sqrt{\frac{r\pi}{r}} (Y_{11}(\Omega) + Y_{1-1}(\Omega)) \right] Y_{r\cdot}(\Omega) d\Omega$$

$$\langle r m | \hat{y} | r \cdot \cdot \rangle = \int_0^{+\infty} R_{r\cdot}(r) R_{r1}^*(r) r^r dr \int Y_{lm}^*(\Omega) \left[i \sqrt{\frac{r\pi}{r}} (Y_{11}(\Omega) - Y_{1-1}(\Omega)) \right] Y_{r\cdot}(\Omega) d\Omega$$

$$\langle r m | \hat{z} | r \cdot \cdot \rangle = \int_0^{+\infty} R_{r\cdot}(r) R_{r1}^*(r) r^r dr \int Y_{lm}^*(\Omega) \sqrt{\frac{r\pi}{r}} Y_{10}(\Omega) Y_{r\cdot}(\Omega) d\Omega$$

چون:

$$\int_0^{+\infty} R_{r\cdot}(r) R_{r1}^*(r) r^r dr = \int_0^{+\infty} \frac{r}{r \sqrt{r a_{\cdot}^r}} \left(1 - \frac{r^2}{r a_{\cdot}^r} + \frac{r^r}{r \gamma a_{\cdot}^r} \right) e^{-\frac{r}{r a_{\cdot}}} \frac{1}{\sqrt{r a_{\cdot}^r}} \frac{r}{r a_{\cdot}} e^{-\frac{r}{r a_{\cdot}}} r^r dr$$

$$= \frac{1}{9 \sqrt{r a_{\cdot}^r}} \int_0^{+\infty} \left(r^r - \frac{r^2}{r a_{\cdot}^r} + \frac{r^r}{r \gamma a_{\cdot}^r} \right) e^{-\frac{\Delta r}{r a_{\cdot}}} dr$$

$$= \frac{1}{9 \sqrt{r a_{\cdot}^r}} \left[\frac{r!}{\left(\frac{\Delta}{r a_{\cdot}} \right)^{\Delta}} - \frac{r}{r a_{\cdot}^r} \frac{\Delta!}{\left(\frac{\Delta}{r a_{\cdot}} \right)^{\Delta}} + \frac{r}{r \gamma a_{\cdot}^r} \frac{\Delta!}{\left(\frac{\Delta}{r a_{\cdot}} \right)^{\Delta}} \right] = \frac{\Delta}{15 \sqrt{r}} \left(\frac{r}{\Delta} \right)^{\Delta} a_{\cdot}$$

$$\langle r m | \hat{x} | r \cdot \cdot \rangle = \frac{\Delta}{15 \sqrt{r}} \left(\frac{r}{\Delta} \right)^{\Delta} a_{\cdot} \left(-\frac{1}{\sqrt{r}} \right) (\delta_{m,1} - \delta_{m,-1})$$

$$\langle r m | \hat{y} | r \cdot \cdot \rangle = \frac{\Delta}{15 \sqrt{r}} \left(\frac{r}{\Delta} \right)^{\Delta} a_{\cdot} \left(\frac{i}{\sqrt{r}} \right) (\delta_{m,1} + \delta_{m,-1})$$

$$\langle r m | \hat{z} | r \cdot \cdot \rangle = \frac{\Delta}{15 \sqrt{r}} \left(\frac{r}{\Delta} \right)^{\Delta} a_{\cdot} \left(\frac{1}{\sqrt{r}} \right) \delta_{m,0}$$

$$w_{rs \rightarrow rp} = \frac{E_r - E_r}{\hbar} = \frac{-R}{9} + \frac{R}{r} = \frac{\Delta R}{r \Delta \hbar}$$

در نتیجه:

$$I_{rs \rightarrow rp} = \frac{e^r}{\hbar^r} \left(\frac{\Delta R}{2\pi\hbar} \right)^r \left[\frac{\lambda}{15\sqrt{2}} \left(\frac{e}{\Delta} \right)^5 a. \right]^r \left[\left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^r + \left| \frac{i}{\sqrt{6}} \right|^r + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^r + \left(-\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^r + \left| \frac{i}{\sqrt{6}} \right|^r \right]$$

$$= \frac{2^r \left(\frac{2}{\Delta} \right)^r e^r R^r a.}{c^r \hbar^r}$$

تمرین ۱۰-۱۲

یک اتم هیدروژن در ناحیه‌ای قرار دارد که در آن در لحظه‌ی $t=0$ میدان الکتریکی وابسته به زمان زیر روشن می‌شود:

$$\vec{E}(t) = E.(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

و در آن τ یک عدد حقیقی و مثبت است. با استفاده از نظریه‌ی اختلال وابسته به زمان مرتبه‌ی اول، احتمال آن را محاسبه کنید که پس از یک زمان به قدر کافی طولانی (یعنی $t \gg \tau$) اتم در یکی از حالت‌های $n=2$ یافت شود (یعنی گذار به همه‌ی حالت‌ها را در تراز $n=2$ در نظر بگیرید).

$$\text{(راهنمایی: می‌توانید از } \int_0^\infty r^r R_{r1}^*(r) R_{10}(r) dr = \frac{24a.}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{3} \right)^5 \text{ استفاده کنید)}$$

حل:

پتانسیل ناشی از اندرکنش الکترون اتم هیدروژن با میدان خارجی $\vec{E}(t) = E.(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})e^{-\frac{t}{\tau}}$ عبارتست از:

$$V(t) = -e\vec{r} \cdot \vec{E}(t) = -e(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) \cdot E.(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})e^{-\frac{t}{\tau}} = -eE.e^{-\frac{t}{\tau}}(x + y + z)$$

بنابراین از رابطه‌ی (۱۰-۴۱) نتیجه می‌شود که:

$$P_{1 \dots \rightarrow 2 \dots} = \frac{e^r E.}{\hbar^r} \left| \langle 200 | x + y + z | 100 \rangle \right|^r \left| \int_0^\infty e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i\omega_{r1}t} dt \right|^r$$

با توجه به اینکه $x + y + z$ ، $\phi_{..}(\vec{r})$ و $\phi_{..}(\vec{r})$ به ترتیب توابعی فرد، زوج و زوج هستند، لذا $\langle 200 | x + y + z | 100 \rangle$ مقداری برابر صفر خواهد داشت و لذا:

$$P_{1 \dots \rightarrow 2 \dots} = 0$$

و نیز:

$$P_{1 \dots \rightarrow 21m} = \frac{e^r E.}{\hbar^r} \left| \langle 21m | x + y + z | 100 \rangle \right|^r \left| \int_0^\infty e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i\omega_{r1}t} dt \right|^r$$

اما:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i w_{r1} t} dt \right|^2 = \left| \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i w_{r1}} \right|^2 = \frac{\tau^2}{1 + w_{r1}^2 \tau^2}$$

چون:

$$w_{r1} = \frac{E_r - E_1}{\hbar} = \frac{-\frac{13/6}{eV} + 13/6 eV}{\hbar} = \frac{10/6 eV}{\hbar}$$

پس:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} e^{i w_{r1} t} dt \right|^2 = \frac{\hbar^2 \tau^2}{\hbar^2 + (10/6 eV \tau)^2}$$

با استفاده از روابط (۲۲۶-۱۰) الی (۲۲۸-۱۰) داریم:

$$P_{1, \dots, r_{11}} = \frac{e^r E_r^r}{\hbar^r} \frac{\hbar^r \tau^r}{\hbar^r + (10/6 eV \tau)^r} \left| -\frac{1}{\sqrt{6}} \frac{24}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{3}\right)^5 a_r + \frac{i}{\sqrt{6}} \frac{24}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{5}\right)^5 a_r \right|^2$$

$$= \frac{e^r E_r^r \tau^r a_r^r}{\hbar^r + (10/6 eV \tau)^r} \frac{2^{15}}{3^{10}}$$

$$P_{1, \dots, r_{10}} = \frac{e^r E_r^r \tau^r a_r^r}{\hbar^r + (10/6 eV \tau)^r} \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{24}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{3}\right)^5 \right|^2 = \frac{e^r E_r^r \tau^r a_r^r}{\hbar^r + (10/6 eV \tau)^r} \frac{2^{15}}{3^{10}}$$

$$P_{1, \dots, r_{1-1}} = \frac{e^r E_r^r \tau^r a_r^r}{\hbar^r + (10/6 eV \tau)^r} \left| \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{24}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{3}\right)^5 + \frac{i}{\sqrt{6}} \frac{24}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{5}\right)^5 \right|^2 = \frac{e^r E_r^r \tau^r a_r^r}{\hbar^r + (10/6 eV \tau)^r} \frac{2^{15}}{3^{10}}$$

تمرین ۱۰-۱۳

(آ) درایه‌های ماتریس کاهش یافته $\langle 1 \| Y_1 \| 2 \rangle$ را حساب کنید. (راهنمایی: برای این منظور ممکن است به محاسبه‌ی مستقیم $\langle 1, 0 | Y_1 | 2, 0 \rangle$ نیاز داشته باشید و سپس از قضیه‌ی ویگنر-اکارت استفاده کنید).

(ب) با استفاده از قضیه‌ی ویگنر-اکارت و ضرایب کلبش - گوردون مربوطه از جدول‌ها، $\langle 1, m | Y_m | 2, m'' \rangle$ را برای همه‌ی مقدارهای ممکن m ، m' و m'' محاسبه کنید.

(پ) با استفاده از نتایج بخش (ب)، آهنگ گذار $2p \rightarrow 2d$ را برای اتم هیدروژن در تقریب دوقطبی محاسبه کنید و یک مقدار عددی به دست دهید.

راهنمایی: می‌توانید از انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} r^2 R_{r1}^*(r) R_{r2}(r) dr = \frac{64 a_0}{15 \sqrt{5}} \left(\frac{6}{5}\right)^5$ و ضرایب کلبش - گوردون زیر استفاده کنید:

$$\begin{aligned}\langle j, 1; m, 0 | (j-1), m \rangle &= -\sqrt{(j-m)(j+m) / [j(2j+1)]} \\ \langle j, 1; (m-1), 1 | (j-1), m \rangle &= \sqrt{(j-m)(j-m+1) / [2j(2j+1)]} \\ \langle j, 1; (m+1), -1 | (j-1), m \rangle &= \sqrt{(j+m)(j+m+1) / [2j(2j+1)]}\end{aligned}$$

حل:
(۱)

ابتدا به محاسبه‌ی $\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle$ می‌پردازیم:

$$\begin{aligned}\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle &= \int d\Omega Y_{1,0}^*(\Omega) Y_{1,0}(\Omega) Y_{2,0}(\Omega) = \int_0^{2\pi} df \int_0^\pi \left(\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \right)^2 \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (2 \cos^2 \theta - 1) d\theta \\ &= 2\pi \left(\frac{3}{4\pi} \right) \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \int_0^\pi (2 \cos^4 \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{5}{16\pi}} \frac{5\pi}{8} = \frac{15\sqrt{5}\pi}{64}\end{aligned}$$

برای محاسبه‌ی $\langle 1 || Y_1 || 2 \rangle$ از قضیه‌ی ویگنر - اکارت استفاده می‌کنیم:

$$\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle = \langle 2, 1; 0, 0 | 1, 0 \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle$$

پس:

$$\langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = \frac{\langle 1, 0 | Y_{1,0} | 2, 0 \rangle}{\langle 2, 1; 0, 0 | 1, 0 \rangle} = \frac{\frac{15\sqrt{5}\pi}{64}}{-\sqrt{\frac{(2-0)(2+0)}{2(2 \times 2 + 1)}}} = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

(ب)

برای محاسبه‌ی $\langle 1, m | Y_{1,m'} | 2, m'' \rangle$ از قضیه‌ی ویگنر - اکارت استفاده می‌شود:

$$\langle 1, m | Y_{1,m'} | 2, m'' \rangle = \langle 2, 1; m'', m' | 1, m \rangle \langle 1 || Y_1 || 2 \rangle = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; m'', m' | 1, m \rangle$$

چون ضریب کلبش - گوردن $\langle 2, 1; m'', m' | 1, m \rangle$ وقتی غیر صفر است که $m = m' + m''$ ، لذا $\langle 1, m | Y_{1,m'} | 2, m'' \rangle$ نیز غیر صفر است فقط وقتی که:

$$m = m' + m''$$

حال به محاسبه‌ی $\langle 1, m | Y_{1,m'} | 2, m'' \rangle$ های غیر صفر می‌پردازیم:

$$\langle 1, -1 | Y_{1,-1} | 2, 0 \rangle = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; 0, -1 | 1, -1 \rangle = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{(2-1)(2-1+1)}{2 \cdot 0}} = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\langle 1, -1 | Y_{1,0} | 2, -1 \rangle = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; -1, 0 | 1, -1 \rangle = -\frac{75}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(-\sqrt{\frac{(2+1)(2-1)}{1 \cdot 0}} \right) = +\frac{75}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{2}}$$

$$\langle 1, -1 | Y_{11} | 2, -2 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; -2, 1 | 1, -1 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{(2+1)(2+1+1)}{2 \cdot 0}} = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{10}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{11} | 2, -2 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; 1, -1 | 1, 0 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{(2+0)(2+0+1)}{2 \times 2 \times 0}} = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{11} | 2, 0 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; 0, 0 | 1, 0 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(-\sqrt{\frac{(2-0)(2+0)}{2 \times (2 \times 2 + 1)}} \right) = +\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{5}}$$

$$\langle 1, 0 | Y_{11} | 2, -1 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; -1, 1 | 1, 0 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{(2-0)(2-0+1)}{2 \times 2 \times 0}} = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}}$$

$$\langle 1, 1 | Y_{11} | 2, 2 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; 2, -1 | 1, 1 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{(2+1)(2+1+1)}{2 \cdot 0}} = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{10}}$$

$$\langle 1, 1 | Y_{11} | 2, 1 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; 1, 0 | 1, 1 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(-\sqrt{\frac{(2-1)(2+1)}{2 \times 0}} \right) = \frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}}$$

$$\langle 1, 1 | Y_{11} | 2, 0 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \langle 2, 1; 0, 1 | 1, 1 \rangle = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{(2-1)(2-1+1)}{2 \cdot 0}} = -\frac{\gamma_5}{64} \sqrt{\frac{\pi}{20}}$$

(پ)

طبق رابطہ (۱۴۱-۱۰) داریم:

$$W_{rd \rightarrow rp}^{enu} = \frac{f}{3} \frac{w_{rd \rightarrow rp}^r}{\hbar c^r} |\vec{d}_{rd \rightarrow rp}|^r$$

که:

$$|\vec{d}_{rd \rightarrow rp}|^r = e^r |\langle rp | \vec{\epsilon} \cdot \vec{r} | rd \rangle|^r = e^r |\langle rp | \vec{\epsilon} \cdot \vec{r} | rd \rangle|^r = e^r \left| \int_0^{+\infty} dr r^r R_{rp}^* R_{rd}(r) \right|^r |\langle 1, m | \vec{\epsilon} \cdot \vec{r} | 2, m'' \rangle|^r$$

اما:

$$\int_0^{+\infty} r^r R_{rp}^* R_{rd}(r) dr = \frac{64 a_0}{15 \sqrt{5}} \left(\frac{6}{5} \right)^0$$

و:

$$\langle 1, m | \vec{\epsilon} \cdot \vec{r} | 2, m'' \rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \langle 1, m | \left(\frac{-\epsilon_x + i\epsilon_y}{\sqrt{2}} Y_{11} + \frac{\epsilon_x + i\epsilon_y}{\sqrt{2}} Y_{1-1} + \epsilon_z Y_{10} \right) | 2, m'' \rangle$$

با تعریف:

$$a = \sum_{m=-1}^{+1} \sum_{m''=-2}^{+2} |\langle 1, m | \vec{\epsilon} \cdot \vec{r} | 2, m'' \rangle|^r$$

خواهیم داشت:

$$\begin{aligned}
\alpha &= \frac{\pi}{r} \left\{ \left| \langle 1, -1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, -2 \rangle \right|^r \right. \\
&+ \left| \langle 1, -1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, -1 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, -1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, 0 \rangle \right|^r \\
&+ \left| \langle 1, 0 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, 0 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 0 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, 1 \rangle \right|^r \\
&+ \left| \langle 1, 0 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, 2 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, 1 \rangle \right|^r \\
&+ \left| \langle 1, 1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, 0 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} + \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} + \varepsilon_z Y_{10} | r, -1 \rangle \right|^r \Big\} \\
&= \frac{\pi}{r} \left\{ \left| \langle 1, -1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} | r, -2 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, -1 | \varepsilon_z Y_{10} | r, -1 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, -1 | \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} | r, 0 \rangle \right|^r \right. \\
&+ \left| \langle 1, 0 | \varepsilon_z Y_{10} | r, 0 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 0 | \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} | r, 1 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 0 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} | r, -1 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 1 | \varepsilon_z Y_{10} | r, 1 \rangle \right|^r \\
&+ \left| \langle 1, 1 | \frac{-\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{11} | r, 0 \rangle \right|^r + \left| \langle 1, 1 | \frac{\varepsilon_x + i\varepsilon_y}{\sqrt{r}} Y_{1,-1} | r, -1 \rangle \right|^r \Big\} \\
&= \frac{\pi}{r} \left\{ \frac{\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r}{2} \left(\frac{-\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{10}} \right)^r + \varepsilon_z^r \left(\frac{\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}} \right)^r + \frac{\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r}{2} \left(\frac{-\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{\pi}{20}} \right)^r + \varepsilon_z^r \left(\frac{\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{\pi}{5}} \right)^r \right. \\
&+ \frac{\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r}{2} \left(\frac{-\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}} \right)^r + \frac{\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r}{2} \left(\frac{-\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}} \right)^r + \varepsilon_z^r \left(\frac{\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}} \right)^r + \frac{\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r}{2} \left(\frac{-\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{\pi}{20}} \right)^r \\
&+ \left. \frac{\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r}{2} \left(\frac{-\gamma\delta}{64} \sqrt{\frac{3\pi}{20}} \right)^r \right\} = \left(\frac{\gamma\delta}{64} \right)^r \frac{\pi}{r} (\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r + \varepsilon_z^r) = \frac{\pi}{r} \left(\frac{\gamma\delta}{64} \right)^r
\end{aligned}$$

چون:

$$w_{rd \rightarrow rp} = \frac{E_{rd} - E_{rp}}{\hbar} = \frac{\Delta Ry}{r\hbar} = \frac{\Delta e^r}{r\hbar a.}$$

پس:

$$W_{rd \rightarrow rp}^{emi} = \frac{r}{r} \frac{\left(\frac{\Delta e^r}{r\hbar a.} \right)^r}{r\hbar c^r} \left[\frac{64 a.}{15\sqrt{5}} \left(\frac{r}{\delta} \right)^r \right]^r \frac{c^r \pi (\gamma\delta)^r}{r} \left(\frac{r}{64} \right)^r = \frac{r^\delta \times \Delta^r}{r^r} \left(\frac{e^r}{\hbar c} \right) \frac{c}{a.} = \frac{100}{r187} \frac{c \alpha^r}{a.}$$

تمرین ۱۰-۱۴

ذره‌ای ابتدا در حالت پایه خود در یک جعبه پتانسیل یک‌بعدی با دیوارهایی در $x=0$ و $x=a$ قرار دارد. اگر دیوارهای که در $x=a$ قرار دارد ناگهان به $x=10a$ حرکت داده شود، احتمال یافتن ذره را در حالت‌های زیر حساب کنید:

(آ) حالت برانگیخته‌ی چهارم ($n=5$) جعبه‌ی جدید

(ب) حالت برانگیخته‌ی نهم ($n=10$) جعبه‌ی جدید.

حل:

برای $t < 0$ ذره در جعبه پتانسیل با دیوارهای $x=0$ و $x=a$ واقع است و بنابراین:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

هنگامی که دیوارهای $x=a$ به‌طور ناگهانی به $x=10a$ برده می‌شود، ذره به‌طور همزمان خود را در جعبه پتانسیل جدید خواهد یافت؛ سطوح انرژی و تابع موج اکنون توسط روابط:

$$E'_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(10a)^2}, \quad \psi'_n(x) = \sqrt{\frac{2}{10a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{10a}\right) \quad (0 \leq x \leq 10a)$$

داده می‌شوند.

(آ)

احتمال پیدا کردن ذره در حالت برانگیخته‌ی چهارم ($n=5$) جعبه جدید را می‌توان از رابطه‌ی (۷۳) یافت:

$$P_{15} = |\langle \psi'_5 | \psi_1 \rangle|^2$$

چون:

$$\begin{aligned} |\langle \psi'_5 | \psi_1 \rangle|^2 &= \int_0^a \psi_1^*(x) \psi'_5(x) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{10a}} \int_0^a \sin\left(\frac{5\pi x}{10a}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{1}{a\sqrt{10}} \int_0^a \left(\cos\frac{\pi x}{2a} - \cos\frac{9\pi x}{2a} \right) dx = \frac{1}{a\sqrt{10}} \left(\frac{2a}{\pi} \sin\frac{\pi x}{2a} - \frac{2a}{9\pi} \sin\frac{9\pi x}{2a} \right) \Big|_0^a \\ &= \frac{1}{a\sqrt{10}} \left(\frac{2a}{\pi} + \frac{2a}{9\pi} \right) = \frac{2}{\pi\sqrt{10}} \frac{10}{9} = \frac{8}{3\pi\sqrt{10}} \end{aligned}$$

پس:

$$P_{15} = \left(\frac{8}{3\pi\sqrt{10}} \right)^2 = \frac{32}{45\pi^2} \simeq 7.11\%$$

(ب)

احتمال پیدا کردن ذره در حالت برانگیخته‌ی نهم ($n=10$) جعبه‌ی جدید عبارتست از:

$$P_{10} = |\langle \psi'_{10} | \psi_1 \rangle|^2$$

چون:

$$\begin{aligned} \langle \psi'_{10} | \psi_1 \rangle &= \int_a^a \psi'_{10}{}^*(x) \psi_1(x) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{2}{10a}} \int_a^a \sin\left(\frac{10\pi x}{10a}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{\sqrt{10}} \int_a^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{10}} \times 1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \end{aligned}$$

پس:

$$P_{10} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2 = \frac{1}{10} = 10\%$$

تمرین ۱۰-۱۵

ذره‌ای به جرم m در حالت پایه‌ی خود در یک نوسانگر هماهنگ یک بعدی و در اختلال $\hat{V}(t) = -V_0 \hat{x} e^{-\frac{t}{\tau}}$ قرار دارد. احتمال یافتن ذره در اولین حالت برانگیخته پس از زمان طولانی تا اختلال مرتبه‌ی اول را حساب کنید.

حل:

احتمال گذار از حالت پایه $n=0$ به اولین حالت برانگیخته $n=1$ با استفاده از رابطه‌ی (۱۰-۴۱) داده می‌شود:

$$P_{0 \rightarrow 1} = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left| \langle 1 | \hat{x} | 0 \rangle \right|^2 \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i w_{10} t - \frac{t}{\tau}} dt \right|^2$$

که:

$$w_{10} = \frac{E_1 - E_0}{\hbar} = \frac{\frac{3}{2} \hbar \omega - \frac{1}{2} \hbar \omega}{\hbar} = \omega$$

چون:

$$\langle 1 | \hat{x} | 0 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle 1 | \hat{a}^\dagger + \hat{a} | 0 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle 1 | 1 \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$$

و:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i w_{10} t - \frac{t}{\tau}} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\left(i\omega - \frac{1}{\tau}\right)t} dt = \frac{1}{i\omega - \frac{1}{\tau}} \left[e^{\left(i\omega - \frac{1}{\tau}\right)t} \right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{i\omega - \frac{1}{\tau}}$$

پس:

$$p_{\rightarrow 1} = \frac{V_1 \tau}{\hbar^2} \left(\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \right)^2 \left| \frac{1}{i\omega - \frac{1}{\tau}} \right|^2 = \frac{V_1^2 \hbar}{2m\omega \hbar^2} \frac{1}{\omega^2 + \frac{1}{\tau^2}} = \frac{V_1^2 \tau^2}{2m\omega \hbar (1 + \omega^2 \tau^2)}$$

تمرین ۱۰-۱۶

ذره‌ای ابتدا (یعنی وقتی $t < 0$) در اولین حالت برانگیخته‌ی خود و در یک چاه پتانسیل نامتناهی با دیواره‌هایی در $x=0$ و $x=a$ واقع است و با شروع در زمان $t=0$ در برابر یک اختلال وابسته به زمان $\hat{V}(x) = V_1 \tau \hat{x} / (t^2 + \tau^2)$ قرار می‌گیرد که در آن V_1 یک عدد حقیقی کوچک است. احتمال آن را حساب کنید که ذره در دومین حالت برانگیخته در $t = +\infty$ یافت شود.

حل:

احتمال گذار از اولین حالت برانگیخته ($n=2$) به دومین حالت برانگیخته ($n=3$) با رابطه‌ی (۱۰-۴۱) داده می‌شود:

$$P_{2 \rightarrow 3} = \frac{V_1^2 \tau^2}{\hbar^2} \left| \langle 3 | \hat{x} | 2 \rangle \right|^2 \left| \int_0^{+\infty} \frac{e^{i\omega_{32}t}}{t^2 + \tau^2} dt \right|^2$$

با توجه به اینکه $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ و $\psi_n(x) = \langle x | n \rangle = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ به کار خود ادامه می‌دهیم:

$$\omega_{32} = \frac{E_3 - E_2}{\hbar} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \frac{3^2 - 2^2}{\hbar} = \frac{\Delta \pi^2 \hbar}{2ma^2}$$

$$\begin{aligned} \langle 3 | \hat{x} | 2 \rangle &= \int_0^a x \psi_3^*(x) \psi_2(x) dx = \left(\sqrt{\frac{2}{a}} \right)^2 \int_0^a x \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a x \left(\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) - \cos\left(\frac{5\pi x}{a}\right) \right) dx \\ &= \frac{1}{a} \left[\left[\frac{x \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)}{\frac{\pi}{a}} - \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)}{\frac{\pi}{a}} \right]_0^a - \left[\frac{x \sin\left(\frac{5\pi x}{a}\right)}{\frac{5\pi}{a}} - \frac{\cos\left(\frac{5\pi x}{a}\right)}{\frac{5\pi}{a}} \right]_0^a \right] = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{5\pi} = \frac{8}{5\pi} \end{aligned}$$

با یافتن $\int_0^{+\infty} \frac{e^{i\omega_{32}t}}{t^2 + \tau^2} dt$ از حساب داده‌ها حل موردنظر کامل می‌شود.

تمرین ۱۰-۱۷

ثابت فنر یک نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی ناگهان به نصف کاهش می‌یابد.

(آ) اگر نوسانگر در ابتدا در حالت پایه‌ی خود باشد احتمال آن را بیابید که نوسانگر در حالت پایه باقی بماند.

(ب) کار مربوط به این فرآیند را بیابید.

حل:

(آ)

هنگامی که ثابت فتر به‌طور ناگهانی به نصف کاهش می‌یابد ذره در همان لحظه، خود را در پتانسیل جدید خواهد یافت. تابع انرژی و سطح انرژی آن اکنون توسط پتانسیل جدید تعیین می‌شود. احتمال پیدا کردن سیستم در حالت پایه پتانسیل جدید را می‌توان از رابطه (۱۰-۷۳) یافت:

$$P_{..} = |\langle \psi' | \psi \rangle|^2$$

با نصف شدن ثابت فتر مقدار w ، $\frac{1}{\sqrt{2}}$ برابر می‌شود و لذا:

$$\psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} x_+}} \exp\left(-\frac{x^2}{2x_+^2}\right) \quad ; \quad x_+ = \sqrt{\frac{\hbar}{mw}}$$

$$\psi_+(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi} x'_+}} \exp\left(-\frac{x^2}{2x'^2_+}\right) \quad ; \quad x'_+ = \sqrt{\frac{\hbar}{m \frac{w}{\sqrt{2}}}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}\hbar}{mw}}$$

چون:

$$\begin{aligned} \langle \psi' | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi'^*(x) \psi_+(x) dx = \frac{1}{\sqrt{\pi x_+ x'_+}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2x'^2_+}\right) \exp\left(-\frac{x^2}{2x_+^2}\right) dx \\ &= \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi \hbar}{mw}}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{mw(1+\sqrt{2})x^2}{2\sqrt{2}\hbar}\right) dx = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi \hbar}{mw}}} \sqrt{\frac{2\sqrt{2}\hbar\pi}{mw(1+\sqrt{2})}} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{\frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}} \end{aligned}$$

بنابراین:

$$P_{..} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} \simeq 1$$

(ب)

چون ذره با احتمالی نزدیک به یک در حالت پایه‌ی پتانسیل جدید باقی می‌ماند لذا انرژی آن را می‌توان برابر با E'_+ در نظر گرفت و لذا کار انجام شده عبارت خواهد بود از:

$$W = E'_+ - E_+ = \frac{1}{2} \hbar w' - \frac{1}{2} \hbar w = \frac{1}{2} \hbar \left(\frac{w}{\sqrt{2}} - w \right) = \frac{1}{2} \hbar w \frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-2}{4} \hbar w$$

که مقداری است منفی.

تمرین ۱۰-۱۸

(آ) آهنگ گذار کل مربوط به میرایی یک نوسانگر هماهنگ با بار q و جرم m را از حالت برانگیخته n ام به حالتی درست در زیر آن بیابید.

(ب) توان تابش شده به وسیله این نوسانگر را در نتیجه میرایی پیدا کنید.

(پ) طول عمر حالت برانگیخته n ام را پیدا کنید.

(ت) مرتبه بزرگی آهنگ گذار، توان و طول عمر حالت برانگیخته پنجم ($n=5$) را در حالت

الکترون هماهنگ نوسان کننده (یعنی $q=e$) برای یک تابش اپتیکی $\omega = 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$ تخمین

بزنید.

حل:

(آ)

طبق رابطه (۱۰-۱۴۱) داریم:

$$W_{n \rightarrow n-1} = \frac{q^2 w_{n \rightarrow n-1}^2}{3 \hbar c^3} |\langle n-1 | \hat{X} | n \rangle|^2$$

با توجه به اینکه:

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\hat{a}^\dagger + \hat{a})$$

و:

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

لذا:

$$\hat{X} |n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} (\sqrt{n+1} |n+1\rangle + \sqrt{n} |n-1\rangle)$$

و چون $|n\rangle$ ها راست هنجار هستند داریم:

$$\langle n-1 | \hat{X} | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2mw}} \sqrt{n}$$

و چون:

$$w_{n \rightarrow n-1} = \frac{E_n - E_{n-1}}{\hbar} = \frac{\hbar w}{\hbar} = w$$

لذا:

$$W_{n \rightarrow n-1} = \frac{q^2 w^2}{3 \hbar c^2} \frac{\hbar n}{2m\omega} = \frac{2}{3} \frac{n q^2 w^2}{m c^2}$$

(ب)

توان تابشی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$I_{n \rightarrow n-1} = \hbar \omega_{n \rightarrow n-1} W_{n \rightarrow n-1}$$

پس:

$$I_{n \rightarrow n-1} = \hbar \omega \left(\frac{2}{3} \frac{n q^2 w^2}{m c^2} \right) = \frac{2}{3} \frac{n \hbar q^2 w^2}{m c^2}$$

(پ)

طول عمر حالت برانگیخته‌ی n ام عبارتست از:

$$\tau = \frac{1}{\omega_{n \rightarrow n-1}}$$

پس:

$$\tau = \frac{3 m c^2}{2 n q^2 w^2}$$

(ت)

در مورد الکترون برای حالت برانگیخته‌ی پنجم داریم:

$$\tau = \frac{3 m_e c^2}{10 e^2 \omega^2} = 0.3 \times 10^{-16} \text{ s} = 3/12 \times 10^{-16} \text{ s}$$

سایر محاسبات را به خواننده واگذار می‌کنیم.

تمرین ۱۰-۱۹

فرض کنید که $\langle \Psi_f | \vec{r} | \Psi_i \rangle$ تقریباً برابر با اندازه‌ی سیستم مورد مطالعه باشد. با استفاده از یک محاسبه‌ی سرانگشتی نیمه‌عمر

(آ) یک گذار دوقطبی الکتریکی در یک اتم که در آن $\hbar \omega \sim 10 \text{ eV}$ و(ب) یک گذار دوقطبی الکتریکی در یک هسته که در آن $\hbar \omega \sim 1 \text{ MeV}$ را محاسبه کنید.

حل

(آ)

طبق روابط (۱۴۱-۱۰) و (۱۴۳-۱۰) داریم:

$$\tau = \frac{3 \hbar c^2}{4 w^2 e^2} \frac{1}{\left| \langle \psi_f | \vec{r} | \psi_i \rangle \right|^2}$$

پس با فرض:

$$\left| \langle \psi_f | \vec{r} | \psi_i \rangle \right| = a.$$

آنگاه:

$$\tau = \frac{3 \hbar c^2}{4 w^2 e^2} \frac{1}{a^2} = \frac{3 \hbar \left(\frac{\hbar c}{\hbar w} \right)^2}{4} \frac{1}{e^2 a^2} = \frac{3 \times 1.055 \times 10^{-34} \text{ Js}}{4 \left(1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \right)^2} \left(\frac{197.32 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{1 \text{ eV}} \right)^2$$

$$= 7.961 \text{ s}$$

(ب)

برای $\hbar w = 1 \text{ MeV}$ داریم:

$$\tau = 7.961 \times 10^{-15} \text{ s}$$

تمرین ۱۰-۲۰

ذره‌ای ابتدا (یعنی $t < 0$) در حالت پایدهی خود و در پتانسیل $V(x) = -V_0 \delta(x)$ با $V_0 > 0$ قرار دارد. (آ) اگر قدرت پتانسیل تا $3V_0$ به کندی تغییر کند، انرژی و تابع موج ذره را در پتانسیل جدید بیابید. (ب) کار انجام شده را در این فرایند محاسبه کنید. یک مقدار عددی برای این کار بر حسب MeV بیابید در صورتی که ذره یک الکترون باشد و $V_0 = 200 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$. (پ) اگر قدرت پتانسیل تا $3V_0$ ناگهان تغییر کند، احتمال یافتن ذره را در حالت پایدهی پتانسیل جدید حساب کنید.

حل:

برای $t < 0$ ، انرژی و تابع موج ذره طبق رابطه‌ی (۴-۲۳۱) عبارتند از:

$$E = -\frac{m V_0^2}{2 \hbar^2}, \quad \psi(x) = \sqrt{\frac{m V_0}{\hbar^2}} \exp\left(-\frac{m V_0 |x|}{\hbar^2}\right) \quad (\text{آ})$$

هنگامی که شدت پتانسیل به آهستگی از V_0 به $3V_0$ تغییر کند طبق قضیه‌ی بی‌دررو هیچ گذاری وجود نخواهد داشت و در لحظه t ، ذره در حالت پایه پتانسیل جدید یافت خواهد شد و انرژی و تابع موج آن عبارت خواهند بود از:

$$E' = -\frac{m (3V_0)^2}{2 \hbar^2} = -\frac{9m V_0^2}{2 \hbar^2}$$

$$\psi'(x) = \sqrt{\frac{m(rV_0)}{\hbar^2}} \exp\left(-\frac{m(rV_0)|x|}{\hbar^2}\right) = \sqrt{\frac{r m V_0}{\hbar^2}} \exp\left(-\frac{r m V_0 |x|}{\hbar^2}\right)$$

(ب)

کار انجام شده عبارتست از:

$$W = E' - E = -\frac{q m V_0^2}{2\hbar^2} + \frac{m V_0^2}{2\hbar^2} = -\frac{\lambda m V_0^2}{2\hbar^2} = -\frac{r m V_0^2}{\hbar^2}$$

برای یک الکترون و به ازای $V_0 = 20.0 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ خواهیم داشت:

$$W = -\frac{r m_e c^2 V_0^2}{\hbar^2 c^2} = -\frac{4 \times 0.511 \text{ MeV} (20.0 \text{ MeV} \cdot \text{fm})^2}{(197/327 \text{ MeV} \cdot \text{fm})^2} \simeq -2.1 \text{ MeV}$$

(پ)

اگر شدت پتانسیل به طور ناگهانی از V_0 به $3V_0$ تغییر کند ذره آنرا خود را در پتانسیل جدید خواهد یافت و احتمال پیدا کردن ذره در حالت پایه پتانسیل جدید از رابطه $(10-73)$ به دست می‌آید:

$$P = |\langle \psi' | \psi \rangle|^2$$

$$\begin{aligned} \langle \psi' | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi'^*(x) \psi(x) = \frac{\sqrt{r m V_0}}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{r m V_0 |x|}{\hbar^2}\right) dx \\ &= \frac{r \sqrt{r m V_0}}{\hbar^2} \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{r m V_0 x}{\hbar^2}\right) dx = \frac{r \sqrt{r m V_0}}{\hbar^2} \left[-\frac{\hbar^2}{r m V_0} \exp\left(-\frac{r m V_0 x}{\hbar^2}\right) \right]_0^{+\infty} = \frac{r \sqrt{r}}{4} \end{aligned}$$

پس:

$$P = \left(\frac{r \sqrt{r}}{4} \right)^2 = 75\%$$

تمرین ۱۰-۲۱

اتم هیدروژنی در زمان $t=0$ در حالت پایهی خود و در یک میدان الکتریکی یکنواخت در راستای

y ، که به صورت $E(t) = E_0 \hat{j} e^{-\frac{t^2}{\tau^2}}$ می‌باشد قرار دارد. احتمال آن که اتم در یکی از حالت‌های $n=2$ پس از یک زمان به قدر کافی طولانی ($t=+\infty$) یافت شود را تا اختلال مرتبه‌ی اول حساب کنید.

حل:

پتانسیل ناشی از اندرکنش الکترون اتم هیدروژن با میدان خارجی $\vec{E}(t) = E_0 \hat{j} e^{-\frac{t^2}{\tau^2}} (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k})$ عبارتست از:

$$V(t) = -e\vec{r} \cdot \vec{E}(t) = -eE_y e^{-\frac{t^2}{\tau^2}} (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = -eE_y e^{-\frac{t^2}{\tau^2}}$$

بنابراین از رابطه‌ی (۱۰-۴۱) نتیجه می‌شود که:

$$P_{1 \dots 2 \dots} = \frac{e^2 E_y^2}{\hbar^2} \left| \langle 2 \dots | y | 1 \dots \rangle \right|^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{\tau^2}} e^{i w_{21} t} dt \right|^2$$

با توجه به اینکه y ، $\phi_{2..}(\vec{r})$ و $\phi_{1..}(\vec{r})$ به ترتیب توابعی فرد، زوج و زوج هستند لذا $\langle 2 \dots | y | 1 \dots \rangle$ مقداری برابر با صفر خواهد داشت و در نتیجه داریم:

$$P_{1 \dots 2 \dots} = 0$$

و نیز:

$$P_{1 \dots 2 \dots m} = \frac{e^2 E_y^2}{\hbar^2} \left| \langle 2 \dots m | y | 1 \dots \rangle \right|^2 \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{\tau^2}} e^{i w_{21} t} dt \right|^2$$

که:

$$w_{21} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = \frac{-\frac{R}{4} + R}{\hbar} = \frac{3R}{4\hbar}$$

پس:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{\tau^2} + i w_{21} t} dt &= \exp\left(-\frac{w_{21}^2 \tau^2}{4}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\left(t - i \frac{w_{21} \tau^2}{2}\right)^2}{\tau^2}} dt = \exp\left(-\frac{9R^2 \tau^2}{64\hbar^2}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{\lambda\hbar}} \tau du \\ &= \exp\left(-\frac{9R^2 \tau^2}{64\hbar^2}\right) \tau \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{-3iR\tau}{\lambda\hbar}\right) \end{aligned}$$

که به‌طور کلی:

$$\operatorname{erf}(p) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_p^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{\tau^2}} du$$

با توجه به رابطه‌ی (۱۰-۲۲۷) نتیجه می‌شود که:

$$P_{1 \dots 2 \dots 1} = 0$$

$$P_{1 \dots 2 \dots 11} = P_{1 \dots 2 \dots 1-1} = \frac{e^2 E_y^2}{\hbar^2} \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \frac{24}{\sqrt{6}} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{5}{2}} a_1 \right]^2 \left(\frac{\tau \sqrt{\pi}}{2} \exp\left(-\frac{9R^2 \tau^2}{64\hbar^2}\right) \right)^2 \left| \operatorname{erfc}\left(\frac{-3iR\tau}{\lambda\hbar}\right) \right|^2$$

$$= \frac{\tau^2 \pi e^{\tau} E_1 \tau^2 a^2}{\tau^2 \hbar^2} \exp\left(-\frac{9 R^2 \tau^2}{32 \hbar^2}\right) \left| \operatorname{erf}\left(\frac{-3 i R \tau}{\hbar}\right) \right|^2$$

تمرین ۱۰-۲۲

ذره‌ای ابتدا (یعنی وقتی $t < 0$) در حالت پایه خود در یک چاه پتانسیل نامتناهی با دیواره‌هایی در $x=0$ و $x=a$ قرار دارد و با شروع در زمان $t=0$ در اختلال وابسته به زمان $\hat{V}(t) = V_0 \hat{x} \delta\left(x - \frac{\tau a}{4}\right) e^{-\frac{t}{\tau}}$ قرار می‌گیرد که در آن V_0 یک پارامتر کوچک است. احتمال آن را بیابید که ذره در $t \rightarrow +\infty$ در نخستین حالت برانگیخته‌ی خود ($n=2$) باشد.

حل:

احتمال گذار از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته عبارتست از:

$$P_{12} = \left| -\frac{i}{\hbar} \int_0^{+\infty} \langle \psi_2 | V(t) | \psi_1 \rangle e^{i w_{21} t} dt \right|^2 = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left| \langle \psi_2 | x \delta\left(x - \frac{\tau a}{4}\right) | \psi_1 \rangle \right|^2 \left| \int_0^{+\infty} e^{\left(i w_{21} - \frac{1}{\tau}\right)t} dt \right|^2$$

که:

$$w_{21} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2 m a^2} \frac{2^2 - 1^2}{\hbar} = \frac{\tau \hbar \pi^2}{2 m a^2}$$

$$\langle \psi_2 | \hat{x} \delta\left(x - \frac{\tau a}{4}\right) | \psi_1 \rangle = \int_0^a \psi_2^*(x) x \delta\left(x - \frac{\tau a}{4}\right) \psi_1(x) dx$$

$$= \int_0^a \left(\sqrt{\frac{2}{a}}\right)^2 x \delta\left(x - \frac{\tau a}{4}\right) \sin\left(\frac{\tau \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$$

$$= \frac{2}{a} \frac{\tau a}{4} \sin\left(\frac{\tau \pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi \tau a}{4}\right) = \frac{-\tau \sqrt{2}}{2} = -\frac{\tau \sqrt{2}}{4}$$

چون:

$$\int_0^{+\infty} e^{\left(i w_{21} - \frac{1}{\tau}\right)t} dt = \frac{1}{i w_{21} - \frac{1}{\tau}} \left[e^{\left(i w_{21} - \frac{1}{\tau}\right)t} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\frac{1}{\tau} - i w_{21}}$$

بنابراین:

$$P_{12} = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left(-\frac{\tau \sqrt{2}}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{\frac{1}{\tau} - i w_{21}}\right)^2 = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \frac{9}{16} \frac{\tau^2}{1 + \tau^2 w_{21}^2} = \frac{9 V_0^2}{\hbar^2} \frac{\tau^2}{1 + \tau^2 \frac{9 \hbar^2 \pi^2}{4 m^2 a^4}} = \frac{9 V_0^2 \tau^2 m^2 a^4}{\hbar^2 (4 m^2 a^4 + 9 \pi^2 \hbar^2 \tau^2)}$$

تمرین ۱۰-۲۳

یک نوسانگر هماهنگ (سه بعدی) همسانگرد را در نظر بگیرید که گذاری از حالت برانگیخته دوم به اول انجام می‌دهد یعنی $(2s \rightarrow 1p)$.

(آ) آهنگ گذار مربوط به $2s \rightarrow 1p$ را حساب کنید.

(ب) چگالی مربوط به گذار $2s \rightarrow 1p$ را بیابید.

حل:

اولین حالت برانگیخته یا حالت $1p$ متناظر با $(11m)$ است و انرژی آن $E_1 = \frac{\Delta \hbar \omega}{2}$ و تابع موج آن عبارتست از:

$$\psi_{11m}(r, \theta, \phi) = R(r) Y_{11m}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{\lambda}{3\sqrt{\pi}}} \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{m\omega r^2}{2\hbar}} Y_{11m}(\theta, \phi)$$

و حالت $2s$ نیز متناظر با (200) است و انرژی آن $E_2 = \frac{5\hbar\omega}{2}$ و تابع موج آن عبارتست از:

$$\psi_{200}(r, \theta, \phi) = R_2 Y_{00}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{\lambda}{3\sqrt{\pi}}} \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^{\frac{5}{2}} \left(\frac{r}{2} - \frac{m\omega r^2}{\hbar} \right) e^{-\frac{m\omega r^2}{2\hbar}} Y_{00}(\theta, \phi)$$

با توجه به این توضیحات:

(آ)

از رابطه‌ی (۱۰-۱۴۱) داریم:

$$W_{2s \rightarrow 1p} = \frac{4}{3} \frac{w_{2s \rightarrow 1p}^2}{\hbar c^2} |\vec{d}_{2s \rightarrow 1p}|^2$$

که:

$$|\vec{d}_{2s \rightarrow 1p}|^2 = e^2 |\langle 2s | \vec{r} | 1p \rangle|^2 = e^2 \left| \int_0^{+\infty} r^2 R_2^*(r) R_1(r) dr \right|^2 |\langle 00 | \vec{r} | 11 \rangle|^2$$

اما با توجه به رابطه‌ی (۱۰-۲۱۸) داریم:

$$|\langle 00 | \vec{r} | 11 \rangle|^2 = |\langle 11 | \vec{r} | 00 \rangle|^2 = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} (\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2) (\delta_{m,-1} + \delta_{m,1}) + \varepsilon_z^2 \delta_{m,0} \right]$$

و از طرفی:

$$\int_0^{+\infty} r^2 R_2^*(r) R_1(r) dr = \frac{\lambda}{3\sqrt{\pi}} \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^{\frac{5}{2}} \int_0^{+\infty} r^4 \left(\frac{r}{2} - \frac{m\omega r^2}{\hbar} \right) e^{-\frac{m\omega r^2}{2\hbar}} dr$$

چون:

$$\int_0^{+\infty} x^4 e^{-ax^2} dx = \frac{15}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_0^{+\infty} x^6 e^{-ax^2} dx = \frac{15}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

پس:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r^r R_{r,*}^*(r) R_{1,1}(r) dr = \frac{1}{r\sqrt{\pi}} \left(\frac{mw}{\hbar} \right)^r \left[\frac{r}{2} \frac{r}{4} \left(\frac{\hbar}{mw} \right)^r \sqrt{\frac{\pi\hbar}{mw}} - \frac{mw}{\hbar} \frac{1}{4} \left(\frac{\hbar}{mw} \right)^r \sqrt{\frac{\pi\hbar}{mw}} \right] = -\frac{r}{2} \sqrt{\frac{\hbar}{mw}}$$

$$W_{rs \rightarrow 1p} = \frac{4w^r e^r}{r\hbar c^r} \frac{4\hbar}{mw} \frac{1}{r} \sum_{m=-1}^{+1} \left[\frac{1}{r} (\varepsilon_x^r + \varepsilon_y^r) (\delta_{m,-1} + \delta_{m,1}) + \varepsilon_z^r \delta_{m,0} \right] = \frac{16}{9} \frac{e^r w^r}{mc^r}$$

(ب)

برای شدت داریم:

$$I_{rs \rightarrow 1p} = \hbar \omega W_{rs \rightarrow 1p} = \frac{16}{9} \frac{\hbar e^r w^r}{mc^r}$$

تمرین ۱۰-۲۴

ذره‌ای را در نظر بگیرید که ابتدا (یعنی $t < 0$) در حالت پایه‌ی خود در جعبه‌ی پتانسیل سه‌بعدی:

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a, 0 < y < 2a, 0 < z < 4a \\ +\infty & \text{در جاهای دیگر} \end{cases}$$

قرار دارد.

(آ) انرژی‌ها و توابع موج حالت پایه و نخستین حالت برانگیخته را بیابید.

(ب) این ذره با شروع در زمان $t=0$ ، تحت اختلال وابسته به زمان $\hat{V}(t) = V_0 \hat{x} \hat{z} e^{-t^r}$ قرار می‌گیرد که در آن V_0 یک پارامتر کوچک است. احتمال آن را محاسبه کنید که ذره پس از یک زمان طولانی $t = +\infty$ در نخستین حالت برانگیخته یافت شود.

حل:

(آ)

ویژه توابع و انرژی‌های این ذره عبارتند از:

$$\begin{aligned} \psi_{n_x n_y n_z}(x, y, z) &= \psi_{n_x}(x) \psi_{n_y}(y) \psi_{n_z}(z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{a}\right) \sqrt{\frac{2}{2a}} \sin\left(\frac{n_y \pi}{2a}\right) \sqrt{\frac{2}{4a}} \sin\left(\frac{n_z \pi}{4a}\right) \\ &= \frac{1}{a\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{2a}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{4a}\right) \end{aligned}$$

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n_x^r}{2ma^r} + \frac{\hbar^2 \pi^2 n_y^r}{2m(2a)^r} + \frac{\hbar^2 \pi^2 n_z^r}{2m(4a)^r} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^r} \left(n_x^r + \frac{n_y^r}{4} + \frac{n_z^r}{16} \right)$$

حالت پایه‌ی معادل با $n_x = n_y = n_z = 1$ می‌باشد؛ یعنی:

$$\psi_{111}(x, y, z) = \frac{1}{a\sqrt{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{2a}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{4a}\right) = \psi_1(x) \psi_1(y) \psi_1(z) = \psi_*(x, y, z)$$

$$E_{111} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} \right) = \frac{21\hbar^2 \pi^2}{32ma^2} = E_1$$

اولین حالت برانگیخته نیز معادل با $n_x = n_y = 1$ و $n_z = 2$ می باشد؛ یعنی:

$$\psi_{112}(x, y, z) = \frac{1}{a\sqrt{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{2a}\right) = \psi_1(x) \psi_1(y) \psi_2(z) = \psi_1(x, y, z)$$

$$E_{112} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{4}{16} \right) = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{4ma^2} = E_1$$

(ب)

احتمال گذار از حالت پایه به اولین حالت برانگیخته عبارتست از:

$$P_{11} = \left| -\frac{i}{\hbar} \int_0^{+\infty} \langle \psi_1 | V(t) | \psi_0 \rangle e^{i w_{10} t} dt \right|^2 = \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left| \langle \psi_1 | \hat{x} \hat{z} | \psi_0 \rangle \right|^2 \left| \int_0^{+\infty} e^{i w_{10} t} dt \right|^2$$

که:

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | \hat{x} \hat{z} | \psi_0 \rangle &= \int dx dy dz \psi_1^*(x, y, z) \psi_0(x, y, z) = \int_0^a dx \psi_1^*(x) x \psi_0(x) \int_0^{2a} dy \psi_1^*(y) \psi_0(y) \\ &\quad \times \int_0^{2a} \psi_2^*(z) z \psi_0(z) = \frac{a}{2} (1) \int_0^{2a} \frac{2z}{4a} \sin\left(\frac{2\pi z}{4a}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{4a}\right) dz = \frac{a}{2} \frac{128a}{9\pi^2} = \frac{64a^2}{9\pi^2} \end{aligned}$$

با توجه به اینکه:

$$\int_0^{+\infty} e^{i w_{10} t} dt = e^{-\frac{w_{10}}{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}\left(-i \frac{w_{10}}{2}\right)$$

و چون:

$$w_{10} = \frac{E_1 - E_0}{\hbar} = \frac{3\hbar\pi^2}{32ma^2}$$

لذا:

$$\int_0^{+\infty} e^{i w_{10} t} dt = \exp\left(-\frac{9\hbar^2 \pi^2}{40 \cdot 96 m^2 a^4}\right) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}\left(-\frac{3\hbar \pi^2 i}{64 m a^2}\right)$$

پس:

$$\begin{aligned} P_{11} &= \frac{V_0^2}{\hbar^2} \left(\frac{64a^2}{9\pi^2} \right)^2 \left| \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp\left(-\frac{9\hbar^2 \pi^2}{40 \cdot 96 m^2 a^4}\right) \operatorname{erf}\left(-\frac{3\hbar \pi^2 i}{64 m a^2}\right) \right|^2 \\ &= \frac{1024 V_0^2 a^4}{81 \hbar^2 \pi^2} \exp\left(-\frac{9\hbar^2 \pi^2}{20 \cdot 48 m^2 a^4}\right) \left| \operatorname{erf}\left(-\frac{3\hbar \pi^2 i}{64 m a^2}\right) \right|^2 \end{aligned}$$

فصل یازدهم

نظریه ی پراکندگی

تمرین ۱۱-۱

پراکندگی یک ذره ی آلفا با انرژی 5MeV (یعنی، یک هسته ی هلیوم با $z_1=2$ و $A_1=4$) از یک هسته ی آلومینیوم ($z_2=13$ و $A_2=27$) را در نظر بگیرید. اگر زاویه ی پراکندگی ذره ی آلفا در چارچوب آزمایشگاه $\theta_1=30^\circ$ باشد (آ) زاویه ی پراکندگی θ در چارچوب مرکز جرم را بیابید. (ب) یک تخمین عددی از سطح مقطع رادرفورد ارائه دهید.

حل:

(آ)

از رابطه:

$$\tan \theta_1 = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \frac{m_1}{m_2}}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{4}{27}$$

با توجه به اینکه:

داریم:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sin \theta}{\cos \theta + \frac{4}{27}}$$

که نتیجه می‌شود:

$$\theta = 36^\circ$$

(ب)

از رابطه‌ی (۷۹-۱۱) داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 \alpha}{4} \right)^2 \left(\frac{\hbar c}{E} \right)^2 \sin^{-2} \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

چون $Z_1 = 2$, $Z_2 = 13$, $\theta = 36^\circ$, $\alpha = \frac{1}{137}$, $\hbar c = 197/33 \text{ MeV.fm}$ و $E = 5 \text{ MeV}$ لذا داریم:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \left(\frac{2 \times 13}{137 \times 4} \right)^2 \left(\frac{197/33 \text{ MeV.fm}}{5 \text{ MeV}} \right)^2 \sin^{-2} (18^\circ) \simeq 384/6 \text{ fm}^2 = 3/85 \times 10^{-28} \text{ m}^2 \\ &= 3/85 \text{ bam} \end{aligned}$$

تمرین ۱۱-۲

الف) سطح مقطع‌های دیفرانسیلی و کل را برای برخورد کلاسیکی دو کره‌ی سخت به شعاع‌های r و R پیدا کنید که شعاع کره‌ی بزرگتر است و کره‌ی بزرگتر ساکن می‌باشد.

ب) به کمک نتیجه قسمت (الف) سطح مقطع‌های دیفرانسیلی و کل را برای پراکندگی ذرات نقطه‌گون از کره‌ی سخت و ساکن با شعاع R پیدا کنید.

راهنمایی: می‌توان از رابطه‌ی کلاسیکی $\frac{d\sigma}{d\Omega} = - \left[\frac{b(\theta)}{\sin \theta} \right] \frac{db}{d\theta}$ که در آن b پارامتر برخورد

است، استفاده کرد

حل:

تمرین ۱۱-۳

پراکندگی از پتانسیل $V(r) = V_0 e^{-\frac{r^2}{a^2}}$ را در نظر بگیرید، موارد زیر را پیدا کنید.

(آ) سطح مقطع دیفرانسیلی را در تقریب اول بورن و

(ب) سطح مقطع کل

حل:

(ا)

طبق رابطه‌ی (۷۰-۱۱) داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\hbar^2 \mu^2}{h^2 q^2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' \right|^2$$

که:

$$q = \hbar k \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

اما:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' = \int_{-\infty}^{+\infty} r' V(r') e^{-\frac{r'^2}{a^2}} \sin(qr') dr' = V \cdot \text{Im} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} r' e^{-\frac{r'^2}{a^2}} e^{iqr'} dr' \right]$$

خواننده می‌تواند تحقیق کند که:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r' e^{-\frac{r'^2}{a^2}} e^{iqr'} dr' = \frac{a^2}{2} + \frac{iq a^2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{a^2 q^2}{4}} \text{erf}\left(\frac{iq a}{2}\right)$$

که:

$$\text{erf}(p) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^p e^{-x^2} dx$$

لذا:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\hbar^2 \mu^2}{h^2 q^2} \left\{ \frac{q a^2 \sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{a^2 q^2}{4}} \text{Re} \left[\text{erf} \left(\frac{-i q a}{2} \right) \right] \right\}^2 = \frac{\hbar^2 \mu^2}{h^2 q^2} \left(\frac{q^2 a^4 \pi}{4} \right) e^{-\frac{a^2 q^2}{2}} \left\{ \text{Re} \left[\text{erf} \left(\frac{-i q a}{2} \right) \right] \right\}^2$$

$$= \frac{\pi \mu^2 a^4}{h^2} \exp \left[-\frac{\hbar^2 \mu^2 E}{h^2} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right] \left\{ \text{Re} \left[\text{erf} \left(-\frac{ia}{h} \sqrt{\hbar \mu E} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) \right] \right\}^2$$

در رسیدن به این نتیجه از رابطه‌ی $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}$ بهره برده‌ایم.

(ب)

سطح مقطع کل از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\sigma = \int_0^\pi d\phi \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin \theta d\theta$$

پس:

$$\sigma = \frac{\pi \mu^* a^*}{\hbar^*} \int_0^\pi \exp\left(-\frac{\mu^* a^* E}{\hbar} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \left\{ \operatorname{Re} \left[\operatorname{erfc} \left(-\frac{ia}{\hbar} \sqrt{\mu^* E} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \right] \right\}^2 \sin \theta d\theta$$

تمرین ۴-۱۱

سطح مقطع دیفرانسیلی را در تقریب اول بورن برای پراکندگی یک ذره به وسیله‌ی چاه پتانسیل مربعی جاذبه‌ای زیر محاسبه کنید:

$V(r) = -V_0$ برای $r < a$ و $V(r) = 0$ برای $r > a$ ، با $V_0 > 0$.

حل:

طبق رابطه‌ی (۷۰-۱۱) داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^*}{\hbar^* q^*} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' \right|^2$$

که:

$$q = 2k \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (*)$$

پس:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^*}{\hbar^* q^*} \left| \int_0^a r' (-V_0) \sin(qr') dr' \right|^2$$

اما:

$$\int_0^a r' \sin(qr') dr' = \frac{-aq \cos(qa) + \sin(qa)}{q^2}$$

پس:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{\mu^* V_0^2}{\hbar^* q^*} \left| \frac{-aq \cos(qa) + \sin(qa)}{q^2} \right|^2 = \frac{\mu^* V_0^2}{\hbar^* q^*} \left[a^2 q^2 \cos^2(qa) + \sin^2(qa) - 2aq \sin(qa) \cos(qa) \right] \\ &= \frac{\mu^* V_0^2}{\hbar^* q^*} \left[\frac{(a^2 q^2 - 1) \cos(2qa) - 2aq \sin(2qa) + a^2 q^2}{2} \right] \end{aligned}$$

با استفاده از رابطه‌ی (*) نتیجه می‌شود که:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\frac{2\mu^2 V_0^2}{\hbar^4} \left[\left(k^2 a^2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) - 1 \right) \cos\left(ka \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) - 2ka \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(ka \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) + 2a^2 k^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]}{4k^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

با استفاده از رابطه ی $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}$ می توان رابطه اخیر را به جای k بر حسب E نوشت.

تمرین ۱۱-۵

پراکندگی کُشان از پتانسیل دلتای $V(r) = V_0 \delta(r-a)$ را در نظر بگیرید.

(آ) سطح مقطع دیفرانسیلی در تقریب اول بورن را محاسبه کنید.

(ب) رابطه ای میان V_0 ، a ، μ و k بیابید به طوری که تقریب بورن معتبر باشد.

حل:
(آ)

طبق رابطه ی (۱۱-۷۰) داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\mu^2}{\hbar^4 q^2} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' \right|^2$$

یا توجه به اینکه:

$$V(r') = V_0 \delta(r' - a)$$

داریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' = \int_{-\infty}^{+\infty} r' V_0 \delta(r' - a) \sin(qr') dr' = a V_0 \sin(qa)$$

پس:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\mu^2}{\hbar^4 q^2} (a V_0 \sin(qa))^2 = \frac{4\mu^2 a^2 V_0^2}{\hbar^4 q^2} \sin^2(qa)$$

با توجه به اینکه:

$$q = 2k \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

لذا داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\mu^2 a^2 V_0^2 \sin^2\left[ka \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]}{\hbar^4 \left(2k \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right)^2}$$

(ب)

شرط تقریب مرتبه‌ی اول بودن توسط رابطه‌ی (۷۴-۱۱) بیان می‌شود:

$$\frac{\mu}{\hbar^2 k} \left| \int_0^{+\infty} V(r') (e^{i k r'} - 1) dr' \right| \ll 1$$

پس در مورد $V(r') = V_0 \delta(r' - a)$ نتیجه می‌شود:

$$\frac{\mu}{\hbar^2 k} \left| \int_0^{+\infty} V_0 \delta(r' - a) (e^{i k r'} - 1) dr' \right| \ll 1$$

یعنی:

$$\frac{\mu}{\hbar^2 k} |V_0 (e^{i k a} - 1)| = \frac{\mu |V_0|}{\hbar^2 k} \sqrt{(e^{i k a} - 1)(e^{-i k a} - 1)} = \frac{2\mu |V_0| \sin ka}{\hbar^2 k} \ll 1$$

تمرین ۱۱-۶

پراکندگی کشسان از پتانسیل $V(r) = V_0 e^{-\frac{r}{a}}$ را در نظر بگیرید که در آن V_0 و a ثابت هستند.

(آ) سطح مقطع دیفرانسیلی در تقریب اول بورن را محاسبه کنید.

(ب) رابطه‌ای میان V_0 ، a ، μ و k طوری بیابید که تقریب بورن معتبر باشد.

(پ) سطح مقطع کل را با استفاده از تقریب بورن بیابید.

حل:

(آ)

طبق رابطه‌ی (۷۰-۱۱) داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4\mu^2}{\hbar^4 q^2} \left| \int_0^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' \right|^2$$

با توجه به اینکه:

$$V(r') = V_0 e^{-\frac{r'}{a}}$$

داریم:

$$\int_0^{+\infty} r' V(r') \sin(qr') dr' = \int_0^{+\infty} r' V_0 e^{-\frac{r'}{a}} \sin(qr') dr' = V_0 \operatorname{Im} \left[\int_0^{+\infty} r' e^{-\frac{r'}{a}} e^{iqr'} dr' \right]$$

چون:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r' e^{-\frac{r'}{a}} e^{iqr'} dr' = -\frac{1}{\left(iq - \frac{1}{a}\right)^2} = -\frac{\left(-iq - \frac{1}{a}\right)^2}{\left(iq - \frac{1}{a}\right)^2 \left(-iq - \frac{1}{a}\right)^2} = -\frac{-q^2 + \frac{2iq}{a} + \frac{1}{a^2}}{\left(q^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2}$$

پس:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r\mu^2 V^2}{\hbar^2 q^2} \left| -\frac{\frac{2q}{a}}{\left(q^2 + \frac{1}{a^2}\right)^2} \right|^2 = \frac{r\mu^2 V^2}{\hbar^2 q^2} \frac{4q^2 a^4}{\left(a^2 q^2 + 1\right)^4} = \frac{16\mu^2 V^2 a^4}{\hbar^2 \left(a^2 q^2 + 1\right)^4}$$

با توجه به اینکه:

$$q = rk \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

لذا داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{16\mu^2 V^2 a^4}{\hbar^2 \left(4k^2 a^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1\right)^4}$$

(ب)

شرط تقریب مرتبه ی اول بودن از رابطه ی زیر حاصل می شود:

$$\frac{\mu}{\hbar^2 k} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} V(r') \left(e^{ikr'} - 1\right) dr' \right| \ll 1$$

چون:

$$V(r') = V_0 e^{-\frac{r'}{a}}$$

پس لازم است که:

$$\frac{\mu}{\hbar^2 k} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} V_0 e^{-\frac{r'}{a}} \left(e^{ikr'} - 1\right) dr' \right| \ll 1$$

اما:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{r'}{a}} \left(e^{ikr'} - 1\right) dr' = \left[\frac{e^{\left(ik - \frac{1}{a}\right)r'}}{ik - \frac{1}{a}} + a e^{-\frac{r'}{a}} \right]_{-\infty}^{+\infty} = -\left(\frac{1}{ik - \frac{1}{a}} + a \right) = -\left(\frac{-2ik - \frac{1}{a}}{ik^2 + \frac{1}{a^2}} + a \right)$$

$$= -\frac{-2ik + 4k^2 a}{4k^2 + \frac{1}{a^2}} = \frac{2k(i - 2ka)}{4k^2 + \frac{1}{a^2}}$$

بنابراین:

$$\frac{\mu |V_0|}{\hbar^2 k} \frac{2k}{4k^2 + \frac{1}{a^2}} \sqrt{1 + 4k^2 a^2} \ll 1$$

و یا به عبارتی:

$$\frac{2\mu |V_0| a^2}{\hbar^2 \sqrt{1 + 4k^2 a^2}} \ll 1$$

(پ)

سطح مقطع کل از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\sigma = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin \theta d\theta = \frac{4\pi\mu^2 |V_0|^2 a^4}{\hbar^4} \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{\left[4k^2 a^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1\right]^2}$$

اما:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{\left[4k^2 a^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1\right]^2} &= \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{\left[4k^2 a^2 (1 - \cos \theta) + 1\right]^2} = \left[\frac{1}{4k^2 a^2} \frac{-1}{3[4k^2 a^2 (1 - \cos \theta) + 1]^2} \right]_0^\pi \\ &= \frac{-1}{4k^2 a^2} \left[\frac{1}{(4k^2 a^2 + 1)^2} - 1 \right] \end{aligned}$$

پس:

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{4\pi\mu^2 |V_0|^2 a^4}{\hbar^4 (4k^2 a^2)} \left[1 - \frac{1}{(1 + 4k^2 a^2)^2} \right] = \frac{4\pi\mu^2 |V_0|^2 a^4 \left[(1 + 4k^2 a^2)^2 - 1 \right]}{4k^2 \hbar^4 (1 + 4k^2 a^2)^2} \\ &= \frac{4\pi\mu^2 |V_0|^2 a^4 (16k^4 a^4 + 8k^2 a^2 + 3)}{4k^2 \hbar^4 (1 + 4k^2 a^2)^2} \end{aligned}$$

تمرین ۱۱-۷

سطح مقطع دیفرانسیلی در اولین تقریب بورن برای پراکندگی کشسان ذره‌ای به جرم m را به دست آورید. فرض کنید ذره در ابتدا در راستای محور z ها در حرکت باشد و از پتانسیل دو دلتایی غیر کروی زیر عبور کند:

$$V(\vec{r}) = V_0 \delta(\vec{r} - a\vec{k}) - V_0 \delta(\vec{r} + a\vec{k})$$

که در آن $\vec{k}$ بردار یکه در راستای محور z است.

حل:

چون پتانسیل فاقد تقارن کروی است، لذا سطح مقطع دیفرانسیلی از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^2}{4\pi^2 \hbar^2} \left| \int e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}') d^3r' \right|^2$$

در اینجا داریم:

$$V(\vec{r}') = V_0 \delta(\vec{r}' - a\vec{k}) - V_0 \delta(\vec{r}' + a\vec{k})$$

چون:

$$\delta(\vec{r} \pm a\vec{k}) = \delta(x) \delta(y) \delta(z \pm a)$$

لذا:

$$\begin{aligned} \int e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}'} V(\vec{r}') d^3r' &= V_0 \int \delta(x) e^{ixq_x} dx \int \delta(y) e^{iyq_y} dy \int [\delta(z-a) - \delta(z+a)] e^{izq_z} dz \\ &= V_0 \left(e^{iaq_z} - e^{-iaq_z} \right) = 2i V_0 \sin(aq_z) \end{aligned}$$

با توجه به مسئله‌ی (۱۱-۵) که در متن کتاب حل شده است داریم:

$$q_z = q \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \left(\hbar k \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \hbar k \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

لذا:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^2}{4\pi^2 \hbar^2} \left(2 V_0 \sin^2\left(\hbar k a \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \right)^2 = \frac{m^2 V_0^2}{\pi^2 \hbar^4} \sin^2\left(\hbar k a \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right)$$

تمرین ۱۱-۸

سطح مقطع دیفرانسیلی در تقریب اول بورن برای پراکندگی نوترون-نوترون را بیابید که در آن پتانسیل با $V(r) = V_0 e^{-\frac{r}{a}}$ تقریب زده می‌شود.

حل:

مشابه با تمرین (۱۱-۶) داریم:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{16 \mu^2 V_0^2 a^4}{\hbar^4 \left(4k^2 a^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + 1 \right)^2}$$

در این تمرین داریم:

$$\mu = \frac{m_n}{2}$$

پس:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4 m_n^2 V_0^2 a^4}{\hbar^4 \left(4k^2 a^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) + 1 \right)^2}$$

تمرین ۱۱-۹

پراکندگی کشسان یک ذره به جرم m و تکانه‌ی اولیه‌ی $\hbar k$ از پتانسیل $V(\vec{r}) = V_0 \delta(x) \delta(y) \delta(z-a)$ را در نظر بگیرید که در آن V_0 ثابت است. (آ) بُعد فیزیکی ثابت V_0 چیست؟ (ب) سطح مقطع‌های دیفرانسیلی در تقریب اول بورن را محاسبه کنید. (پ) قسمت (ب) را برای حالتی محاسبه کنید که در آن پتانسیل با رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$V(\vec{r}) = V_0 \delta(x) [\delta(y-b) \delta(z) + \delta(y) \delta(z-a)]$$

حل:

(آ)

با توجه به اینکه $\delta(x)$ ، $\delta(y)$ و $\delta(z-a)$ همگی دارای بُعد عکس طول می‌باشند لذا V_0 دارای بُعد انرژی $\times$ حجم می‌باشد. (ب)

چون پتانسیل فاقد تقارن کروی است، لذا سطح مقطع دیفرانسیلی از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^2}{4\pi^2 \hbar^4} \left| \int e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} V(\vec{r}) d^3r \right|^2$$

چون:

$$V(\vec{r}) = V_0 \delta(x) \delta(y) \delta(z-a)$$

لذا:

$$\int e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} V(\vec{r}) d^3r = V_0 \int \delta(x) e^{ixq_x} dx \int \delta(y) e^{iyq_y} dy \int \delta(z-a) e^{izq_z} dz = V_0 e^{iaq_z}$$

بنابراین:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^2 V_0^2 |e^{iaq_z}|^2}{4\pi^2 \hbar^4} = \frac{\mu^2 V_0^2}{4\pi^2 \hbar^4}$$

(ب)

در این مورد خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} V(\vec{r}) d^3r &= V_0 \int \delta(x) e^{ixq_x} dx \left[\int \delta(y-b) e^{iyq_y} dy \int \delta(z) e^{izq_z} dz \right. \\ &\quad \left. + \int \delta(y) e^{iyq_y} dy \int \delta(z-a) e^{izq_z} dz \right] = V_0 \left(e^{ibq_y} + e^{iaq_z} \right) \end{aligned}$$

پس:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\mu^2 V_0^2}{4\pi^2 \hbar^4} \left(e^{ibq_y} + e^{iaq_z} \right) \left(e^{-ibq_y} + e^{-iaq_z} \right) = \frac{\mu^2 V_0^2}{\pi^2 \hbar^4} \cos\left(\frac{aq_z - bq_y}{2}\right)$$

تمرین ۱۱-۱۰

پراکندگی موج S ($L=0$) از یک ذره به جرم m و از یک پتانسیل کروی دافعه ای $V(r)=V_0$ را برای $r < a$ و $V(r)=0$ را برای $r > a$ با $V_0 > 0$ در نظر بگیرید.

(آ) جابه جایی فاز موج S ($L=0$) و سطح مقطع کل را حساب کنید.

(ب) نشان دهید که در حد $V_0 \rightarrow \infty$ جابه جایی فاز با $\delta = -ka$ داده می شود. سطح مقطع کل را

بیابید.

حل:

برای موج S ، معادله شرودینگر برای تابع شعاعی عبارتست از:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + V_0 u(r) = E u(r) \quad ; \quad r < a$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} = E u(r) \quad ; \quad r > a$$

که در آن $u(r) = rR(r)$ با فرض اینکه انرژی E مثبت باشد و نیز $V_0 > E$ با تعریف

$$k_1^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2} \quad \text{و} \quad k_2^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2} (V_0 - E)$$

$$u(r) = \begin{cases} u_1(r) = A \sinh(k_1 r) & ; r < a \\ u_2(r) = B \sin(k_2 r + \delta_2) & ; r > a \end{cases}$$

در رسیدن به رابطه اخیر فرض $u(0) = 0$ را اعمال نموده‌ایم. با اعمال شرط پیوستگی $u(r)$ و مشتق آن در $r = a$ داریم:

$$A \sinh(k_1 a) = B \sin(k_2 a + \delta_2)$$

$$k_1 A \cosh(k_1 a) = k_2 B \cos(k_2 a + \delta_2)$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\tan(k_2 a + \delta_2) = \frac{k_2}{k_1} \tanh(k_1 a)$$

و یا:

$$\delta_2 = -k_2 a + \tan^{-1} \left[\frac{k_2}{k_1} \tanh(k_1 a) \right] \quad (\text{ب})$$

در حد $V_2 \rightarrow \infty$ ، k_2 به سمت بی‌نهایت میل خواهد کرد بنابراین:

$$\lim_{V_2 \rightarrow \infty} \delta_2 = \lim_{k_2 \rightarrow +\infty} \left[-k_2 a + \tan^{-1} \left[\frac{k_2}{k_1} \tanh(k_1 a) \right] \right] = -k_2 a + \tan^{-1} 0 = -k_2 a$$

برای سطح مقطع کل طبق رابطه‌ی (۱۱-۱۰۴) خواهیم داشت:

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_2 = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \left[-k_2 a + \tan^{-1} \left[\frac{k_2}{k_1} \tanh(k_1 a) \right] \right]$$

که برای حالت حدی $V_2 \rightarrow \infty$ نتیجه می‌دهد:

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2(-ka) \simeq \frac{4\pi}{k^2} (k^2 a^2) = 4\pi a^2$$

که در اینجا فرض ناچیز بودن انرژی را اعمال نموده‌ایم.

تمرین ۱۱-۱۱

پراکندگی نوترون - نوترون موج S را در نظر بگیرید که در آن پتانسیل برهمکنشی با $V(r) = V_0 \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 e^{-\frac{r}{a}}$ تخمین زده می‌شود و $\vec{S}_1$ و $\vec{S}_2$ عملگرهای برداری اسپینی دو نوترون هستند و $V_0 > 0$ است. سطح مقطع‌های دیفرانسیلی در تقریب اول بورن را بیابید.

حل:

برای موج S (یعنی: $l=0$) تابع موج فضایی متقارن است پس، دو ذره در حالت یگانه‌ی اسپینی هستند. سطح مقطع دیفرانسیلی کل توسط رابطه‌ی زیر داده می‌شود:

$$\frac{d\sigma_s}{d\Omega} = |f(\theta) + f(\pi - \theta)|^2$$

که در اینجا:

$$f(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \left(\int_0^{+\infty} r' V_0 e^{-\frac{r'}{a}} \sin(qr') dr' \right) \langle \psi_0 | \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 | \psi_0 \rangle$$

که $|\psi_0\rangle$ همان حالت یگانه اسپینی است.

چون:

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{4} (S^2 - S_1^2 - S_2^2)$$

لذا:

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 | \psi_0 \rangle = \frac{1}{4} (S^2 - S_1^2 - S_2^2) | \psi_0 \rangle = \frac{\hbar^2}{4} \left[0(0+1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \right] | \psi_0 \rangle = -\frac{3}{4} \hbar^2 | \psi_0 \rangle$$

پس:

$$\langle \psi_0 | \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 | \psi_0 \rangle = -\frac{3}{4} \hbar^2 \langle \psi_0 | \psi_0 \rangle = -\frac{3}{4} \hbar^2$$

از طرفی:

$$\int_0^{+\infty} r' e^{-\frac{r'}{a}} \sin(qr') dr' = \text{Im} \left[\int_0^{+\infty} r' e^{-\frac{r'}{a} + iqr'} dr' \right] = -\frac{\frac{2q}{a}}{\left(q^2 + \frac{1}{a^2} \right)^2}$$

پس:

$$f(\theta) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \left[\frac{-\frac{3}{4} V_0 \hbar^2}{\left(q^2 + \frac{1}{a^2} \right)^2} \right] \left(-\frac{3}{4} \hbar^2 \right) = \frac{-3\mu q V_0}{2\pi a \left(q^2 + \frac{1}{a^2} \right)^2}$$

چون:

$$q = \sqrt{k} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

پس داریم:

$$f(\theta) = \frac{-\sqrt{k} \mu \left(\sqrt{k} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) V}{\sqrt{k} \pi a \left(\sqrt{k} \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + \frac{1}{a^2} \right)^{3/2}} = - \frac{\sqrt{k} \mu V a^2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\lambda \pi \left(\sqrt{k} a^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1 \right)^{3/2}}$$

و:

$$f(\pi - \theta) = - \frac{\sqrt{k} \mu V a^2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\lambda \pi \left(\sqrt{k} a^2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1 \right)^{3/2}}$$

لذا:

$$\frac{d\sigma_s}{d\Omega} = \left(\frac{\sqrt{k} \mu V a^2}{\lambda \pi} \right)^2 \left[\frac{\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\left(\sqrt{k} a^2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1 \right)^3} + \frac{\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\left(\sqrt{k} a^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + 1 \right)^3} \right]$$